CAROLI LINNÆI,

EQUITIS STELLAE POLARIS, ARCHIATRI REGII, PROF. MED. ET
REI HERB. IN UNIVERS. UPSAL.

# SYSTEMA
# VEGETABILIUM.

EDITIO DECIMA SEXTA

CURANTE

CURTIO SPRENGEL,

EQUITE STELLAE POLARIS ET AQUILAE RUBRAE, PROF. MED.
ET REI HERB. IN UNIVERS. HAL.

VOLUMINIS IV. PARS II.

CURAE POSTERIORES.

---

GOTTINGAE,

SUMTIBUS LIBRARIAE DIETERICHIANAE.

1827.

# CURAE POSTERIORES

IN

# SYSTEMA VEGETABILIUM.

AD

VOLUMEN I.

# CLASSIS I.

pag. 3.

n. 5. *Phrynium* W. Anthera lateralis in filamento petaloideo. Stigma incurvum.

pag. 4.

n. 18. *Ditmaria* *. Add. Stam. 3, 4 sterilia.
n. 21. *Cucullaria* Schreb. Caps. 3locularis. Sem. solitaria apice alata.
n. 22. *Qualea* Aubl. del. glandula. Petalum 1 obcordatum. Fructus 3locularis 3valvis, placenta columnari centrali libera.
Post n. 24. *Amphilochia* Mart. Cal. 5sepalus, sepalo summo breviter calcarato. Petalum 1 obcordatum unguiculatum. Anthera 4locularis. Capsula corticata 3locularis 3valvis, loculis sub-1spermis. Congruit quidem fructu cum Agardhia *, quam cuperem cum illa jungere, si modo calcar sepali et petalum unquam dispexissem, antherae etiam loculis binis, haud quaternis, adversantibus. Cum propter anthesin nondum in meis speciminibus evolutam rite contemplari perianthium nequeam, largior, sepalis subesse petalum unum vel alterum, ita ut character potius sit: Cal. 5sepalus. Petalum 1 vel 2. Et Vochisieis potius quam Terebinthaceis adnumeranda Agardhia. Quodsi forte olim cum Amphilochia conjungitur, prius tamen nomen meum est, etiamsi genus melius a Martio examinatum.

pag. 5.

n. 26. *Salomonia* Lour., Donio suadente ad Monadelphiam ablegator.
n. 37. *Callitriche*. Anthera 2locularis. Nux 4sperma.
n. 50. *Tristicha* Thuars. non Lour. melius Junceis adnumeratur.

pag. 7.

*Canna indica* Ait. *Indiam occidentalem* patriam habent.
Add. ad n. 10.
*orientalis* Rosc. 15. C. foliis oblongis glabris, floribus sessilibus, bracteis duplicibus, laciniis labii superioris erectis lanceolatis 2dentatis, labio inferiori revoluto 2fido. *Ind. or.* (C. chinensis W., indica Ro

*pedunculata* Rofc. fic melius definitur: C. foliis oblongo-lanceolatis, floribus racemofis geminis longe pedunculatis, calyce reflexo, laciniis corollae emarginatis. *Ind. occ.* Deleatur fynon. W.

*pallida* Rofc. 16. C. *foliis oblongis glaucis*, bracteis pubefcentibus, laciniis labii fuperioris erectis obtufiuscculis, corolla maculata. *Inf. Carib.*

Ad C. *patentem* Rofc. add. patriam *Inf. Helenae.*

Ad C. *latifoliam* Rofc. add. caule villofo.

Ad C. *luteam* Rofc. add. patriam *Amer. auftr.*

C. *fpeciofa* Rofc. habet flores pedunculatos, haud feffiles.

Add. ad n. 13.

*compacta* Rofc. 17. C. foliis ovato-oblongis late marginatis, fpica compacta, laciniis corollae fubemarginatis. *Patria?*

††† *Labium corollae fuperius* 0.

*denudata* Rofc. 18. C. caule fruticofo, foliis fubcoriaceis coftatis, floribus feffilibus, labio corollae infer. lanceolato acuto erecto. *Patria?*

*brafilienfis* Rofc. 19. C. caule herbaceo, foliis ovato-oblongis coftatis margine coloratis, floribus pedunculatis, labio corollae infer. fpathulato erecto. *Brafil.* (C. denudatae var. Rofc.)

pag. 8.

*Ad Calatheam* Meyer. accedunt:

*flavefcens* Lindl. 4. C. foliis radicalibus oblongis coftato-venofis fubtus glaucis, capitulo feffili multifloro, fepalis exterioribus acuminatis. *Brafil.* Bot. reg. 932.

*violacea* Lindl. 5. C. caule tereti foliofo, foliis ovali-oblongis acutis fubtus purpurafcentibus, capitulo multifloro, fepalis acutis. *Brafil.* Bot. reg. 961.

*Ad Marantam.*

*anguftifolia* Sims. 11. M. caule nodofo, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, panicula flexuofa, bracteis internis coloratis, calyce ovato. *Peru.* Bot. mag. 2398.

*bicolor* Ker. 12. M. acaulis, foliis ellipticis fupra maculatis fubtus purpurafcentibus, petiolis medio paniculigeris, paniculae articulatae ramulis fafciculatis bracteatis, bracteis lanceolatis cufpidatis. *Brafil.* Bot. reg. 786.

M. *Tonchat* Aubl. melius fic: M. caule fruticofo ramofo, ramis dichotomis pilofis, foliis ovatis glabris petiolatis, racemis terminalibus paucifloris. *Guiana.*

*furcata* Mart. 13. M. caule ftricto dichotomo, foliis oblongo-lanceolatis fubfeffilibus glaberrimis, pedunculis geminis 2floris, germinibus pubefcentibus. *Brafil.*

*criftata* Mart. 14. M. caule ramofo herbaceo, foliis longe petiolatis oblongis fubtus pubefcentibus, pedunculis criftato-paniculatis fecundis, pedicellis 2floris. *Brafil.*

*ſpicata* Aubl. 15. M. acaulis, foliis oblongis acuminatis glaberrimis, ſpica imbricata lanceolata. *Guiana. Braſil.*

M. *zebrina* Sims. a Roſcoeo Phryniis adnumeratur.

*Ad Phrynium.*

*grandiflorum* Roſc. 7. Phr. acaule, petiolis baſi incraſſatis medio floriferis, bracteis 1floris. *Braſil.*

Ad Phr. *dichotomum* Roxb. accedit ſynonymon Donax Arundaſtrum Lour.

*ovatum* Mart. 8. Phr. foliis radicalibus oblongo-lanceolatis acuminatis ſubtus pubeſcentibus, ſcapo 1folio, ſpica ovata. *Braſil.*

pag. 9.

*Ad Hedychium.*

*flaveſcens* Carey. 12. H. foliis lanceolatis elongatis ſubtus pubeſcentibus, ſpica imbricata, bracteis inferioribus obtuſiſſimis ciliatis, ſuperioribus cylindricis 2-3floris, filamento labellum bilobum ſubaequante. *Bengal.*

*maximum* Roſc. 13. H. foliis oblongis ſubtus pubeſcentibus, ſpica capitata, bracteis obtuſis ciliatis, calyce villoſo, labello amplo bilobo filamentum ſuperante. *Ind. orient.*

*aurantiacum* Roſc. 14. H. foliis diſtichis linearibus, coſta ſubtus villoſa, ſpica imbricata, bracteis cylindricis ſub-3floris, filamento labellum bilobum bis ſuperante. *Ind. or.* (H. anguſtifolium Bot. mag. 2078.)

*glaucum* Roſc. 15. H. foliis lanceolatis acuminatis undulatis ſubtus glaucis, ſpica gracili, bracteis 1floris, labelli 2partiti laciniis linearibus, filamento longiſſimo. *Ind. or.*

*acuminatum* Roſc. 16. H. foliis lanceolatis ſubtus villoſis, ſpica laxa, bracteis 1floris, labello acute 2partito filamentum incurvum ſuperante. *Nepal.*

*heteromallum* Ker. 17. H foliis oblongis ſubtus ſericeo-villoſis, ſpica laxe imbricata conica, bracteis ternis 1floris, labello 2partito, filamento longiſſimo. *Ind. orient.* Bot. reg. 767.

*Gardnerianum* Wall. 18. H. foliis oblongis acuminatis undulatis glabris, ſpica patula, bracteis 2floris, filamento labellum late ovatum 2fidum bis ſuperante. *Nepal.*

*carneum* Carey. 19. H. foliis diſtichis lanceolatis glabris, ſpica laxa, bracteis convolutis ciliatis 1floris, filamento labellum 2fidum ſuperante. *Bengal.* Bot. mag. 2637.

*longifolium* Roſc. 20. H. foliis lanceolatis elongatis glaucis, coſta media ſubtus hirſuta, ſpica patente elongata, bracteis 2floris, labello 2lobo, filamento longiſſimo. *Bengal.*

Ad H. *anguſtifolium* notandum Roxb. deſcr. non ic. Icon enim Roxburghii refert H. coccineum Sm. n. 8.

Ad H. *flavum* Roxb. — foliis lanceolatis marginatis ſubtus villoſis, filamento labellum aequante.

Ad H. *elatum* R. Br. — foliis oblongo-lanceolatis subtus villosis glaucis, spicis elatis multifloris, labello 2lobo.
Ad H. *spicatum* Sm. — foliis lanceolatis subtus pubescentibus, spica terminali laxa foliis breviore, labello 2fido filamentum superante.
Ad H. *thyrsiforme* Sm. — bracteis convolutis reflexis 2-3floris, labello 2partito, filamento longissimo.
Ad *Kämpferam rotundam* pertinet syn. K. longa Jacqu.

pag. 10.

*Ad Kämpferam.*

*marginata* Carey. 7. K. foliis subrotundo-ovatis marginatis subtus glaucis pubescentibus, filamento labelloque 2lobis, lobis emarginatis. *Ind. or.*
Ad K. *ovalifoliam* Roxb. — labello 2lobo, lobis mucronatis, filamento 3fido, lacinia media emarginata.
Ad K. *angustifoliam* lege Smith. non Rosc.

*Ad Curcumam.*

Post n. 9. *latifolia* Rosc. 18. C. tuberibus subrotundis pyriformibus, foliis lato-lanceolatis subtus pubescentibus, spica comosa, bracteis cucullatis flores superantibus, labello oblongo subintegro bistriato. *Ind. orient.*
Ad C. *Zedoariam* Rosc. — foliis utrinque ad costam purpureis, spica radicali. (Amomum Zerumbet König., Curcuma Zerumbet Roxb.)
Ad C. *aromaticam* Salisb. — foliis subtus sericeis, spica laterali. (C. Zedoaria Roxb.)
Ad C. *ferrugineam* Roxb. — scapo solo (non foliis subtus) ferrugineo, laciniis corollae lanceolatis erectis.
Ad C. *rubescentem* Roxb. nota, spicam subinde esse centralem.
Ad C. *elatam* Roxb. — foliis *subtus* villosis, spica comosa, bracteis cucullatis corollas subaequantibus.
Ad C. *Amadam* Roxb. — spica compacta comosa, coma rosea.

pag. 12.

*Ad Zingiber Gärtn.*

Post n. 6. *chrysanthum* Rosc. 15. Z. spica sessili imbricata, bracteis oblongis, superioribus acumine torto hirsuto terminatis, labello 3lobo, lobo medio porrecto 2fido. *Nepal.*
Ad Z. *officinale* Rosc. — spicis pedunculatis, bracteis obtusissimis, labelli 3lobi lobo medio latiori emarginato.
Ad Z. *rubens* Roxb. — labello oblongo obtuso 3lobo.

pag. 13.

Ad Z. *capitatum* Roxb. — bracteis interioribus oblongis obtusiusculis.

*Ad Costum.*

*Pisonis* Lindl. 13. C. foliis oblongis acuminatis carnosis glabris, capitulo terminali, bracteis obtusis, inferioribus foliaceis. *Brasil.* Bot. reg. 899.

*maculatus* Rofc. 14. C. caule hirfuto maculato, foliis lanceolatis fubtus villofis, fpica radicali imbricata, bracteis obtufis, labello obovato denticulato biftriato. *Afric. tropic.* (C. afer β. Ker. in bot. reg. 683.)

*nepalenfis* Rofc. 15. C. foliis lanceolatis fubtus villofis, vaginarum ore ciliato, fpica terminali capitata, bracteis ovatis coloratis, labello latiffimo undulato crenato hyalino. *Nepal.*

Ad C. *fpicatum* Sm. (non Sw.) — ftigmate 2lobo, lobis quadratis ciliatis, poftice proceffibus lanceolatis acutis.

## pag. 14.

### *Ad Helleniam* W.

Ad H. *coeruleam* R. Br. — racemo terminali inclinato, labello 3lobo bafi 2callofo, lobo medio emarginato.

### *Ad Alpiniam.*

*tubulata* Ker. 15. A. foliis remotis oblongis glabris, fcapo radicali ftricto villofo, bracteis fcariofis flores fubaequantibus, floribus tubulofis, labello inclufo, anthera feffili. *Ind. occid.?* Bot. reg. 777.

*auriculata* Rofc. 16. A. foliis lanceolatis cofta media utrinque ferrugineo-pilofa, racemo pendulo, labello fubrotundo crenato, bafi proceffibus auriculatis. *Inf. Molucc.*

*diffiffa* Rofc. 17. A. foliis lanceolatis marginatis, fpica pendula, labello panduriformi, filamento 2fido diandro. *China.* Rofc. fcitam. t. 5?

Ad A. *calcaratam* Rofc. — filamento 2fido, ramulo altero antherifero.

## pag. 15.

### *Ad Globbam.*

*Königiana* * 13. Gl. foliis ovato-oblongis glabris, racemi fpicati pedicellis 3floris, antherae proceffibus retufis fubcarnofis. *Ceilon.* (Hura Siamenfium Königapud Retz. obf. 3. p. 49.)

Ad Gl. *fubulatam* Roxb. — bracteis oblongis coloratis.

*cufpidata* Mart. 14. Gl. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, vaginis ciliatis, fpica feffili foliorum vaginis involuta. *Brafil.*

### *Ad Lopeziam* Cav.

*Lopeziae hirfutae* Jacqu. proxima L. pubefcens W.

## pag. 16.

### *Ad Ditmariam* *.

*floribunda* * 1. D. foliis obovatis, ramulis ftellato-pubefcentibus, pedunculis paniculae breviffimis incraffatis. *Guiana.*

*violacea* * 2. D. foliis fubcordato-oblongis acuminatis, ramis fubferrugineis, pedunculis paniculae elongatis

gracilibus. *Braſil.* (Eriſma violaceum Mart. nov. gen. t. 82., Qualea calcarata Link.)

*Ad Cucullariam.*

*rotundifolia* * 5. C. foliis verticillatis ſubſeſſilibus cordato-orbiculatis emarginatis coriaceis glaucis, racemis ſolitariis, germinibus glabris. *Braſil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 83.)

*elliptica* * 6. C. foliis verticillatis ſubſeſſilibus cordato-ellipticis emarginatis coriaceis glaucis, racemis ſolitariis, germinibus villoſis. *Braſil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 84.)

*Tucanorum* * 7. C. foliis verticillatis petiolatis ſpathulatis emarginatis glabris, racemis terminalibus, germinibus glabris. *Braſil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 85.)

*rufa* * 8. C. foliis verticillatis petiolatis oblongis obtuſis ſubtus parallele venoſis, junioribus, pedunculis calycibusque ferrugineo-tomentoſis, racemis longiſſimis ſparſifloris, calycibus obtuſiusculis, germinibus hirſutiſſimis. *Braſil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 86.) C. *tomentoſa* Meyer. praeter folia decuſſatim oppoſita acuminata calycibus etiam acutis differt.

*grandis* * 9. C. foliis verticillatis petiolatis ſpathulatis membranaceis utrinque glabris, racemis cylindricis elongatis aggregatis, germinibus glabris. *Braſil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 88.)

*Hänkeana* * 10. C. foliis verticillatis longe petiolatis oblongis emarginatis baſi attenuatis utrinque glabris, racemis terminalibus compoſitis aggregatis, germinibus tomentoſis. *Peru.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 89.)

*pyramidalis* * 11. C. foliis verticillatis oppoſitisque petiolatis ovato-oblongis acuminatis ſubtus pedunculisque villoſis, racemo terminali, germinibus glabris. *Braſil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 90.)

*floribunda* * 12. C. foliis verticillatis oppoſitisque petiolatis ovato-lanceolatis cuſpidatis ſubtus ſcabris, racemis aggregatis, germinibus glabris. *Braſil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 91.)

*ferruginea* * 13. C. foliis oppoſitis petiolatis oblongis cuſpidatis ſubtus reticulatis ramisque fuſco-tomentoſis, racemis ſtrictis elongatis, germinibus glabris. *Braſil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 92.)

*alpeſtris* * 14. C. foliis oppoſitis petiolatis oblongis obtuſis utrinque glabris, racemis elongatis, germinibus laevibus. *Braſil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 87.)

pag. 17.

*Ad Qualeam.*

*multiflora* Mart. 5. Qu. foliis oppoſitis ternisve oblongis acutis ſubtus ſubpubeſcentibus, racemis axillaribus cymoſis abbreviatis piloſis, calycibus hirſutiſſimis. *Braſil.*

*parviflora* Mart. 6. Qu. pulverulento-tomentoſa, foliis alternis oblongis obtuſiuſculis venoſis, racemis terminalibus ſubpaniculatis, calcare obtuſo. *Braſil.*

*ecalcarata* Mart. 7. Qu. foliis oblongis acuminatis ſubtus venoſo-reticulatis fulvo-pubeſcentibus, racemis lateralibus paucifloris, calyce ecalcarato, corolla 2petala 1andra vel 1petala 2andra. *Braſil.*

*grandiflora* Mart. 8. Qu. foliis breviter petiolatis ovato-lanceolatis acutis elongatis ſubtus reticulatis pubeſcentibus, floribus axillaribus ſubſolitariis, calycibus hirſutis, calcare elongato. *Braſil.*

*faſciculata* * 9. Qu. foliis ovato-oblongis obtuſis ſubtus villoſis, floribus axillaribus faſciculatis. *Braſil.* (Calliſthene Mart.)

*diſticha* * 10. Qu. ramis diſtichis patentiſſimis, foliis oppoſitis ſubſeſſilibus elliptico-oblongis utrinque glabris, floribus ſolitariis axillaribus. *Braſil.* (Calliſthene major Mart. nov. gen. t. 75.)

*minor* * 11. Qu. ramis patentibus, foliis diſtichis lineari-oblongis glabriuſculis glanduloſo-mucronatis, floribus axillaribus ſolitariis, calcare obtuſo. *Braſil.* (Calliſthene minor Mart. nov. gen. t. 76.)

## AMPHILOCHIA Mart.

*dichotoma* Mart. 1. A. ramis dichotomis divaricatis pubeſcentibus, foliis ſubcordato-oblongis obtuſis ſubtus villoſiuſculis, racemis terminalibus verticillatis, calcare breviſſimo. *Braſil.*

*cordata* Mart. 2. (Qualea cordata * n. 4.)

pag. 19.

*Ad Hippurin.*

*montana* Ledeb. 3. H. flaccida ſubramoſa, foliis ſenis linearibus acutis. *Ora occid. Amer. bor.*

pag. 22.

*Ad Blitum.*

*maritimum* Nutt. 4. Bl. glomerulis axillaribus ſpicatis, calycibus membranaceis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis inciſo-dentatis. *Nov. Caeſar.*

*Ad Triſticham* Thuar.

*hypnoides* * 3. Tr. caule breviſſimo ramoſo, foliis ſparſis [illegible]mis ovato-3angularibus, pedunculis terminalibus 2-ſpathaceis. *Braſil.* (Dufourea Hilar.)

# CLASSIS II.

## pag. 24.

Post n. 63. *Bolivaria* Schlechtend. Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis 5partita. Stam. tubo inserta. Stigma capitatum. Caps. didyma 2locularis circumscissa, loculis 2spermis. Sem. reticulato-arillata.

Post n. 66. *Labichea* Gaudich. Cand. Cal. 3partitus. Pet. 5 orbiculata. Antherae inaequales, altera apice producta. Stylus filiformis. Germen compressum 2ovulatum.

## pag. 25.

n. 70. *Henckelia* *. Add. ad characterem. Caps. siliquaeformis 2locularis 2valvis dorso dehiscens, placentis revolutis, ut speciem 4locularis faciat. Sem. nuda.

*Lysionotus* Don. Cal. 5partitus. Cor. campanulata, limbo 5lobo. Stam. 2 sterilia. Stigma subinfundibuliforme. Caps. Henckeliae. Sem. muricata utrinque comosa.

n. 73. *Sciuris* Schreb. deleatur, reducenda ad Galipeam Aubl. p. 518. n. 856.

## pag. 27.

Post n. 102. *Aidelus* *. Cal. 4partitus. Pet. 4 calyce multo breviora. Stam. brevissima. Stigma sessile. Caps. compressa 1locularis 2valvis, placenta libera centralis. *Caryophylleae?*

*Hemianthus* Nutt. Cal. tubulosus 4dentatus inferne fissus. Cor. lab. sup. obsoletum, inf. 3partitum, lacinia media ligulata. Filamenta 2fida, ramulo altero antherifero. Caps. 1locularis 2valvis polysperma. *Primuleae.*

*Oncoma* *. (Oxera Labill.) Cal. 4partitus scariosus. Cor. tubulosa, fauce dilatata, limbo 4lobo inaequali. Stam. fertilia exserta, 2 sterilia. Stigma 2fidum. Germen 4lobum polyspermum disco 4lobo impositum. *Bignonieae.*

## pag. 29.

n. 132. *Lacistema* Sw. habet potius Capsulam 3valvem 1spermam.

## pag. 30.

Ad n. 10. *Jasminum trinerve* Vahl. Cor. limbus 6-8partitus. Laciniae corollae lanceolatae tubo multo breviores.

*stenopetalum* Lindl. 46. J. scandens laeve, foliis ovato-lanceolatis acuminatis 3nerviis, laciniis calycis subulatis, corollae filiformibus tubo multo longioribus. *Ind. or.* (J. trinerve Roxb.)

pag. 31.

Ad n. 13. (Mogorium myrtifolium Lam.)

Poſt n. 14. *nepalenſe* * 47. J. foliis oppoſitis ellipticis acuminatis integerrimis glabris lucidis, pedunculis trichotomis 3floris, laciniis calycis ſubulatis abbreviatis, corollae linearibus obtuſis. *Nepal.* (J. dichotomum Don.)

Ad n. 15. *J. bracteatum* Roxb. eſt volubile, foliis ellipticis obtuſiusculis.

Ad n. 17. (Nyctanthes grandiflora Lour.)

pag. 32.

Poſt n. 39. *heterophyllum* Roxb. 48. J. foliolis ſubrotundo-ovatis acuminatis glabris, paniculis corymboſis pubeſcentibus, dentibus calycis obſoletis. *Nepal.*

pag. 33.

Poſt n. 44. *pubigerum* Don. 49. J. foliolis ſeſſilibus pubeſcentibus ovato-oblongis acutis, pedunculis 1floris elongatis, ramis angulatis hirtis. *Nepal.*

*aureum* Don. 50. J. foliolis ovatis acutis glabris 3nerviis, paniculis lateralibus paucifloris, ramis 5angulis glabris. *Nepal.*

*Ad Liguſtrum.*

n. 2. L. *japonicum* Thunb. — paniculae pedicellis glabris.

*bracteolatum* Don. 5. L. foliis ovato-lanceolatis acutis utrinque ramulisque glabris, paniculae ramis brachiatis piloſiſſimis bracteatis. *Nepal.*

Ad L. *nepalenſe* Wall. (L. ſpicatum Don.)

pag. 35.

*Ad Notelaeam* Vent.

*Poſua* Don. 6. N. foliis oppoſitis oblongis acuminatis, pedunculis axillaribus 1floris cernuis aggregatis, laciniis calycis aequalibus. *Nepal.*

*Ad Linocieram* Sw.

Ad n. 3. (Chionanthus ceilanica L.)

pag. 36.

*Poſt Fontaneſiam:*

BOLIVARIA Schlechtend.

*integrifolia* Schlechtend. 1. B. foliis lanceolatis integerrimis. *Braſil.*

*trifida* Schlechtend. 2. B. foliis linearibus pinnatifidis ſcabris. *Braſil.*

pag. 37.

Ad n. 12. (Piſonia mexicana W.)

*Poſt Codariam:*

LABICHEA Gaudich.

*diſſoides* Gaud. *Nov. Holl. occ.* Frutex foliis pinnatis, floribus racemoſis luteis.

pag. 38.

*Ad Schwenckiam.*

Post n. 4. *mollissima* Mart. 5. Schw. foliis cordato-ovatis obtusis mollissime villosis, racemis terminalibus compositis, floribus subsessilibus secundis. *Brasil.*

*pubescens* Mart. 6. Schw. foliis ovatis acuminatis pubescentibus, pedunculis filiformibus. *Brasil.*

*Hilariana* Cand. 7. Schw. caule gracili foliisque lanceolatis glabris, pedunculis laxe paniculatis filiformibus. *Brasil.* Cand. hort. genev. t. 10.

## HENCKELIA

* *Caulescentes.*

*barbata* * 1. H. fruticosa erecta, foliis oppositis ovatis acuminatis integerrimis hirsutis, pedunculis axillaribus paucifloris, staminibus apice barbatis. *Sumatra.* (Didymocarpus barbata Jack. Syst. veg. 2. p. 837.)

*frutescens* * 2. H. suffruticosa erecta, foliis oppositis longe petiolatis ovato-lanceolatis subserratis subtus incanis, pedunculis axillaribus aggregatis paucifloris. *Ins. Pulo-Pinang in freto Malaccae.* (Didymocarpus frutescens Jack. Syst. veg. l. c.)

*corniculata* * 3. H. suffruticosa erectiuscula, foliis alternis obovatis acutis serratis villosis, pedunculis axillaribus elongatis, floribus fasciculatis secundis. *Sumatra.* (Didymocarpus corniculata Jack. Syst. veg. l. c.)

*aromatica* * 4. H. herbacea pubescens, foliis petiolatis oppositis subrotundo-ovalibus obtusis crenatis supra sericeis, supremis sessilibus subcordatis, pedunculis terminalibus paucifloris calycibusque glanduloso-pilosis. *Nepal.* (Didymocarpus aromatica Wallich. Don.)

*crinita* * 5. H. herbacea erecta, foliis alternis spathulatis acutis serratis pilosis subtus rubris, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris petiolo adnatis. *Ins. Pulo-Pinang in freto Malacc.* (Didymocarpus crinita Jack. Syst. veg. l. c.)

*racemosa* * 6. H. herbacea erecta, foliis oppositis lanceolatis duplicato-serratis supra glabris subtus pilosis, pedunculis axillaribus 2fidis racemosis. *Sumatra.* (Didymocarpus racemosa Jack. Syst. veg. l. c.)

*elongata* * 7. H. herbacea erectiuscula, foliis oppositis ovatis utrinque attenuatis serratis papilloso-pilosis, racemis axillaribus secundis, pedicellis binatis remotis, corolla elongata. *Ins. ad oram Sumatrae.* (Didymocarpus elongata Jack. Syst. veg. l. c.)

*villosa* * 8. H. herbacea villosissima, foliis petiolatis ovalibus duplicato-crenatis, pedunculis solitariis multifloris, calycibus laevibus. *Nepal.* (Didymocarpus villosa Don.)

*oblonga* * 9. H. herbacea lanata, foliis breviter petiolatis elliptico-oblongis acutis duplicato-serratis rugosis subvillosis, pedunculis geminis paucifloris

calycibus glabris. *Nepal.* (Didymocarpus oblonga Wallich. Don.)

*primulaefolia* * 10. H. herbacea pubescens, foliis petiolatis cordato-ovalibus bicrenatis utrinque rugosis sericeis, pedunculis geminis multifloris calycibusque pilosis. *Nepal.* (Didymocarpus primulaefolia Don.)

*reptans* * 11. H. herbacea reptans, foliis ellipticis crenulatis villosis, pedunculis axillaribus subaggregatis 1floris. *Inf. Pulo-Pinang in freto Malacc.* (Didymocarpus reptans Jack. Syst. veg. l. c.)

** *Acaules, scapo subumbellifero.*

*incana* * 12. H. foliis radicalibus longe petiolatis ovatis obtusis inciso-crenatis rugosis denso lanatis, scapo elongato multifloro glabro, involucris calycibusque villosis. *Ind. or.* (Gratiola montana Rottl., Röttlera incana Vahl.)

*plicata* * 13. H. foliis radicalibus subsessilibus cordato-orbiculatis carnosis margine revolutis rugoso-plicatis candido-sericeis, scapo elato pubescente multifloro. *Nepal.* (Didymocarpus plicata Don.)

*macrophylla* * 14. H. foliis radicalibus cordato-ovalibus dentato-crenatis supra villosis subtus nudiusculis, scapo foliis breviori glabro, involucris calycibusque rotundatis. *Nepal.* (Didymocarpus macrophylla Wallich. Don.)

*cinerea* * 15. H. foliis radicalibus petiolatis cordato-ovalibus inaequaliter crenatis supra cinereo-tomentosis, scapo foliis breviori farinoso paucifloro, involucris subdentatis tomentosis. *Nepal.* (Didymocarpus cinerea Don.)

Henckeliae genus constitui 1817, Vahlius jam 1804 Röttleram, falso scriptam, cum Rottlera alia a Roxburghio 1795 jam optime constituta fuisset. Tandem 1822 Jackius Henckeliam Didymycarpi haud apto nomine insignivit.

## LYSIONOTUS Don.

*serratus* Don. *Nepal.* Herba perennis erecta glabra, foliis ternis lanceolatis coriaceis serratis, floribus umbellatis roseis.

*Ad Schizanthum.*

*pinnatus* R. et P. 1. Sch. glanduloso-pubescens, foliis pinnatifidis, laciniis oblongo-linearibus obtusis dentatis, pedunculis erectis subracemosis. *Chili.*

*porrigens* Hook. 2. Sch. glanduloso-pilosus, foliis 2pinnatifidis, laciniis oblongo-linearibus obtusiusculis crenatis, pedunculis paniculatis divaricatis. *Chili.* Hook. exot. fl. t. 86.

*Sciuris omnino* p. 38. 39. deleatur.

## pag. 39.

*Ad Cyrtandram* Forst.

Tres species enumeratae frutescunt, corollaque gaudent ringente. His accedunt novae:

*frutescens* Jack. 4. C. suffrutescens, foliis lanceolatis serratis glabris, pedunculis axillaribus 3floris. *Sumatra.*

*rubiginosa* Jack. 5. C. frutescens erecta, foliis obovato-lanceolatis serratis glabris, pedunculis axillaribus 1floris fasciculatis calycibusque viscoso-pilosis. *Sumatra.*

Ab his recedunt *Herbaceae*, foliorum altero minori, floribus saepe capitatis involucratis, corolla subirregulari.

*macrophylla* Jack. 6. C. suberecta, foliis amplissimis subrotundo-ovatis acutis serratis glabris, altero stipulaeformi, pedunculis petiolo brevioribus, involucro 1phyllo. *Sumatra.*

*maculata* Jack. 7. C. humilis, foliis cordato-subrotundis acutis serratis supra glabris subtus villosiusculis, corollis maculatis. *Sumatra.*

*bicolor* Jack. 8. C. erectiuscula, foliis cordato-lanceolatis margine revolutis supra glabris subtus villosis purpureis, pedunculis petiolo brevioribus. *Sumatra.*

*hirsuta* Jack. 9. C. ascendens pilosa, foliis cordato-ovatis obtusiusculis crenatis, capitulis paucifloris hirsutis, involucro 2partito. *Sumatra.*

*glabra* Jack. 10. C. foliis late ovatis serratis glabris, pedunculis abbreviatis, involucro 1phyllo. *Sumatra.*

*incomta* Jack. 11. C. erecta hirsuta, foliis ovato-ellipticis serratis, pedunculis abbreviatis, involucro 2phyllo. *Sumatra.*

*peltata* Jack. 12. C. ascendens, foliis longe petiolatis peltatis ovatis acuminatis obtuse serratis glabris, pedunculis abbreviatis. *Sumatra.*

*carnosa* Jack. 13. C. scandens, foliis inaequalibus carnosis integerrimis subtus tomentosis, altero oblique oblongo-lanceolato, altero minimo cordato acuminato, pedunculis abbreviatis, involucro 2phyllo. *Sumatra.*

*aurea* Jack. 14. C. elata, folio utroque perfecto subrotundo ovato acuminato serrato sericeo, capitulis densis subsessilibus. *Sumatra.*

*Ad Gratiolam.*

*missuriana* Beck. 29. Gr. caule tereti simplici, foliis lineari-lanceolatis apice dentatis, pedunculis axillaribus 1floris folia superantibus, bracteis calyce longioribus. *Ad fl. Missuri.*

pag. 41.

*Ad Bonnayam* Link.

*pumila* * 15. B. erectiuscula, foliis inaequalibus obtusiusculis serratis subtus rubris, pedunculis 2floris folia aequantibus 2bracteatis. *Nepal.* (Chirita pumila Don.)

*bifolia* * 16. B. caule erecto gracili pubescente 2phyllo, folio altero minimo petiolato, altero maximo cordato sessili, pedunculo terminali 1floro. *Nepal.* (Didymocarpus Wallich., Chirita Don.)

Ad B. *grandifloram* * (Chirita urticaefolia Don.)

pag. 43.

*Ad Wulffeniam* Sm.

† *obliqua* Don. 2. W. caulefcens pubefcens, foliis petiolatis femicordatis ovatis acutis integerrimis, floribus remotis, labio corollae fuperiori duplo breviori, fauce nuda. *Nepal.*

pag. 50.

n. 24. Ad *Urceolariam capenfem* * (Linaria aphylla * Syft. veg. 2. 797.)

pag. 51.

Poft n. 47. U. *confervaefolia* Jackf. Don. 65. U. foliis multifido-capillaceis, veficulis 0, fcapo paucifloro, calcari breviffimo conico, labio fuper. indivifo inferius 2lobum fuperante. *Nepal.*

pag. 53.

*Ad Stachytarphetam* Vahl.

Poft n. 7. *quadrangula* Mart. 16. St. fruticofa, foliis ovatis acutis crenato-ferratis fubtus fcabris, fpicis laxis, bracteis fubulatis calyce brevioribus, caule tetraquetro. *Brafil.*

*trifpicata* Mart. 17. St. fruticofa, ramis compreffis, foliis oblongis utrinque attenuatis crenato-ferratis glabris fubtus venofo-reticulatis fcabris, fpicis ternis, bracteis calyce brevioribus. *Brafil.*

*elatior* Schrad. 18. St. herbacea, foliis lineari-lanceolatis remote ferratis fubtus ad coftam petiolisque pubefcentibus, bracteis acuminatis calycem fuperantibus. *Brafil.*

Ad St. *ftrigofam* Vahl. (St. hifpida Mart.)

pag. 54.

Ad *Cunilam Buchanani* * n. 6. (C. nepalenfis Don.)

pag. 55.

*Ad Monardam.*

*Ruffeliana* Nutt. 15. M. caule laevi, foliis fubfeffilibus lanceolati ferratis glabris, floribus capitatis, calycibus pubefcentibus, tubo corollae longiffimo, labio inf undulato. *Ditio Arcanfae Amer. bor.*

*Bradburiana* Beck. 16. M. caule glabro, foliis ovato-lanceolatis fubfeffilibus dentatis pilofis, involucro colorato calycis hirfuti dentibus divaricatis. *Ad fl. Miffuri.*

*fcabra* Beck. 17. M. caule glabriusculo, foliis ovato-lanceolatis ferratis punctato-fcabris, calycis hirfuti dentibus erectis. *Ad fl. Miffuri.*

pag. 66.

*Ad Salviam.*

Poſt n. 143. *rubra* * 188. S. caule elato ramoſo hiſpido, foliis omnibus amplexicaulibus oblongis bullato-rugoſis dentatis ſubtus villoſis, verticillis 6floris, calycibus pubeſcentibus, galea glanduloſa ſtamina ſuperante. *Patria?* Hort. hal.

pag. 67.

Ad n. 160. S. *ſylveſtris* et in *Sibiria* obvia. (S. deſertorum Schangin)

pag. 68.

Poſt n. 170. *Simſiana* Schult. 189. S. caule herbaceo villoſo, foliis cordatis acutis repando-crenatis rugoſis, bracteis cordatis longe mucronatis coloratis, calycibus ſimpliciter dentatis, ſtaminibus galeam anguſtam aequantibus. *Ruſſia.* Bot. reg. 1003.

pag. 73.

*Ad Veronicam.*

Poſt n. 40. *himalenſis* Don. 91. V. caule erecto piloſo, foliis ſeſſilibus oblongis inciſo-crenatis utrinque hirſutis, racemis longe pedunculatis, bracteis lanceolatis pedicellos ſuperantibus. *Emodi montes.*

Poſt n. 45. *deltoidea* * 92. V. erecta glaberrima, foliis deltoideo-ovatis acutis baſi cuneatis inaequaliter dentatis, racemis laxis, bracteis foliaceis obtuſiuſculis. *Nov. Holl.* Sieber n. 483.

Poſt n. 48. *punctata* Don. 93. V. caule repente glabro, foliis inferioribus petiolatis ovalibus, ſuperioribus amplexicaulibus lanceolatis acutis crenulatis, racemis tenuifloris, bracteis laciniisque calycis acutis. *Ad ſcaturigines Nepal.*

pag. 77.

*Ante Oligarrhenam:*

AÏDELUS *.

*micranthus* * *Nepal.* Herba procumbens ramoſa glabra, foliis oppoſitis oblongis ſubſpathulatis dentatis, floribus axillaribus ſolitariis minutis breviſſime pedunculatis albidis. Hort. hal. 1825.

HEMIANTHUS Nutt.

*micranthemoides* Nutt. *Jamaica. Amer. bor.* Herba repens glabra, foliis ſubrotundo-ellipticis integerrimis ſtriatis, floribus axillaribus breviter petiolatis albidis. (Herpeſtes micrantha Purſh. Syſt. veg. 2. p. 801., Gratiola repens Sw. ?)

ONCOMA *.

*pulchellum* * *Nov. Caled.* Frutex orgyalis, ramis verrucofis, foliis oblongis obtufis glabris, floribus lateralibus corymbofis. (Oxera pulchella Labill. nov. Caled. t. 28.)

pag. 78.

*Ad Jufticiam.*

Poft n. 8. *gonyftachya* Mart. 127. J. fpica terminali quadrifariam imbricata, calyce 5fido fubulato, labio cor. fuperiore 2fido, bracteis minutis fubulatis, foliis oblongo-lanceolatis crenatis glaberrimis. *Brafil.*

*humiliflora* Mart. 128. J. fpicis terminalibus geminis imbricatis villofis, bracteis fubrotundis ariftatis, foliis ovatis utrinque attenuatis ciliatis. *Brafil.*

Poft n. 15. *calycotricha* Link. 129. J. panicula terminali compacta, calycis 5partiti laciniis lineari-fetaceis flexuofis corollam fubaequantibus, labio cor. infer. 3fido recurvato, foliis fubcordato-oblongis acutis repandis undulatis glabris. *Brafil.*

pag. 79.

Poft n. 28. *fimplex* Don. 130. J. caule fimplici foliisque ovatis obtufis venofis pilofis, fpica terminali denfa abbreviata, calyce 4partito. *Nepal.*

Poft n. 33. *fpathulata* Mart. 131. J. fpicis axillaribus oppofitis bifidis fecundis, bracteis fpathulatis, foliis oblongis utrinque attenuatis pubefcentibus. *Brafil.*

*oblongata* Link. 132. J. caule fruticofo ramofo, foliis lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis, racemulis axillaribus folio brevioribus paucifloris, involucro 5phyllo, calycibus 5partitis. *Brafil.*

pag. 80.

Poft n. 41. *racemulofa* Wikftr. 133. J. racemulis axillaribus bracteatis, calycibus corollisque 4fidis, foliis fubcordato-ovatis obtufis pubefcentibus, caule fruticofo angulato. *Inf. Carib.*

pag. 81.

Poft n. 61. *genuflexa* Mart. 134. J. fpicis terminalibus pedunculatis, bracteis calycisque 5partiti laciniis linearibus ciliatis, labio cor. fuperiore integro, foliis ovatis cauleque repente hirfutis. *Brafil.*

pag. 82.

Poft n. 79. *geniculata* Sims. 135. J. panicula terminali laxa nutante, bracteis fubulatis, labio cor. fuper. integerrimo, foliis ovato-lanceolatis glabris. *Inf. Carib.* Bot. mag. 2487.

pag. 84.

Poſt n. 108. *cuneifolia* Mart. 186. J. ſpicis axillaribus compoſitis, bracteis orbiculatis mucronatis ciliatis, foliis obovatis crenatis glabris. *Braſil.*

Poſt n. 115. *antirrhina* Mart. 187. J. ſpicis axillaribus cymoſis folio brevioribus, floribus ſubſecundis baſi gibbis, foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris. *Braſil.*

pag. 85.

*Ad Dicliptera* Juſſ.

Poſt n. 2. *recurvata* * 26. D. ſpicis axillaribus terminalibusque dichotomis recurvatis, bracteis ſubulatis calycibusque villoſis, corolla pubeſcente, foliis breviter petiolatis ovatis hirſutis. *Braſil.* (D. braſilienſis Mart.)

pag. 87.

Poſt n. 25. *ſpecioſa* Mart. 27. D. pedunculis axillaribus 1floris, bracteis exterioribus ovatis venoſis, foliis ovato-oblongis ſubcrenatis ſubtus ſcabris, caule fruticoſo. *Braſil.*

pag. 89.

*Ad Eranthemum.*

*crenulatum* Wallich. 17. E. ſuffruticoſum erectum glaberrimum, foliis ovato-oblongis acuminatis obſolete crenatis, ſpicis verticillatis ebracteatis. *Ind. orient.* Bot. reg. 879.

*modeſtum* Mart. 18. E. racemis axillaribus terminalibusque, floribus verticillatis, bracteis ſetaceis, foliis ovato-oblongis ſeſſilibus ſupra hirſutis. *Braſil.*

*detruncatum* Mart. 19. E. ſpicis terminalibus trichotomis, bracteis ſubulatis ſerrulato-ciliatis, foliis ovato-oblongis in petiolum attenuatis pubeſcentibus, pulvillis (verrucisve) infra folium truncatis. *Braſil.*

*verbenaceum* Mart. 20. E. ſpica terminali ſimplici, floribus oppoſitis, bracteis ovatis cuſpidatis, foliis oblongis in petiolum decurrentibus glaberrimis. *Braſil.*

Ad *Campylanthum ſalſoloidem* Rott. (Teucrium filiforme Poir. enc. ſuppl. 2. p. 769.)

pag. 90.

*Ad Acaenam.*

Poſt n. 4. *ſarmentoſa* Carmich. 16. A. foliolis oblongis argute inciſo-ſerratis ſupra glabris venoſis ſubtus ſericeis, ſtipulis indiviſis, caule repente. *Inſ. Acunnae.* (Anciſtrum Thuars.)

Poſt n. 10. *agrimonioides* Kunth. 17. A. foliolis oblongis utrinque attenuatis groſſe ſerratis glabris, ſtipulis integerrimis, ſpicis axillaribus longiſſime pedunculatis, floribus inferioribus remotis bracteatis. *Mexico.*

pag. 104.

*Ad Salicem.*

Post n. 79. *rostrata* Richards. 116. S. foliis oblongis acutis integerrimis pubescentibus subtus glaucis, germinibus longe pedicellatis ovato-subulatis tomentosis, stigmate sessili 4fido. *Amer. arctic.*

pag. 105.

Post n. 88. *arctica* R. Br. 117. S. ramis decumbentibus glabriusculis, foliis obovatis obtusis subtus villosiusculis, squamis amenti obovato-orbiculatis, germinibus subsessilibus tomentosis, stigmate 4fido stylum aequante. *Ins. Meloille.*

Post n. 91. *disperma* Roxb. 118. S. foliis ellipticis mucronatis integerrimis utrinque ramulisque sericeo-villosis, squamis amenti ♂ 8andris ovalibus obtusis, germinibus ventricosis sericeis stylo coronatis. *Ind. orient.*

pag. 106.

Post n. 97. *desertorum* Richards. 119. S. foliis ovalibus integerrimis venosis subtus glaucis, germinibus sessilibus tomentosis, stigmate sessili 2fido. *Amer. arctic.*

pag. 109.

*Ad Piper.*

Post n. 38. *juliflorum* Nees. 230. P. foliis oblongis obtusis basi inaequalibus eglandulosis glabris, spicis oppositifoliis densis cernuis brevibus subechinatis. *Brasil.*

pag. 112.

Post n. 78. 79. *Suipigua* Hamilt. 231. P. foliis ovatis 5nerviis glabris, spicis filiformibus solitariis folio brevioribus, caule volubili. *Nepal.*

*Mullesua* Hamilt. 232. P. foliis oblongis utrinque attenuatis 3nerviis glabris, capitulis globosis solitariis pedunculatis petiolo longioribus. *Nepal.*

*Guigual* Hamilt. 233. P. foliis ovatis acuminatis 5nerviis glabris, capitulis globosis solitariis petiolos aequantibus. *Nepal.*

pag. 118.

Post n. 174. *Guildingianum* * 234. P. pubescens, caule repente ramosissimo, foliis petiolatis orbiculato-cordatis obtusis 3nerviis, spicis pedunculatis oppositifoliis erectis. *Ins. Carib.* (Peperomia reniformis Hook. exot. fl. t. 164.)

pag. 120.

Post n. 205. *rubellum* Haw. 235. P. pubescens, caule ramosissimo, foliis subquaternis ellipticis subtus convexis ru-

bris 3nerviis venoſo-reticulatis, ſpicis axillaribus terminalibusque ſubſolitariis. *Ind. occid.*

pag. 121.

Ad n. 221. P. *obverſum* Vahl. (Peperomia ovalifolia Hook. exot. fl. t. 165.)

pag. 122.

*Ad Cladium.*

Ad n. 3. Cl. *ſchoenoides* R. Br. (Cl. teretifolium Nees in Sieber agroſt. n. 6.)

Poſt n. 4. *dubium* Nees. 15. Cl. panicula racemoſa, ſquamis late ovatis acuminatis, bracteis baſi ciliatis, culmo tereti 1nodi baſi foliato, foliis compreſſis anguſtiſſimis glabris culmum ſubaequantibus. *Nov. Holl.* Sieber agroſt. n. 5.

pag. 123.

Ad Cl. *decompoſitum* R. Br. (Cl. Filum Nees in Sieber agroſt. n. 11.)

pag. 124.

*Ad Laciſtema.*

*myricoides* Sw. 1. L. foliis lanceolatis integerrimis ſubeveniis reſinoſo-punctatis, amentis ſolitariis, ſtigmatibus 2 ſeſſilibus. *Jamaica.*

*oblongum* * 2. L. foliis oblongis integerrimis venoſis, amentis ſubſolitariis, ſtylo ſimplici, ſtigmatibus 2, 3. *Braſil.*

*pubeſcens* Mart. 3. L. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſubintegerrimis ſubtus villoſis, amentis denſe aggregatis, ſtylo ſimplici, ſtigmatibus 2, 3. *Braſil.* (Mart. nov. gen. t. 94.)

*Berterianum* Mart. 4. L. foliis oblongis obtuſiuſculis baſi attenuatis reſinoſo-punctatis ſerratis venoſis, ſtylis 2 filiformibus. *Cuba. Hiſpaniola.* (L. alterum *.)

*ſerrulatum* Mart. 5. L. foliis ovato-oblongis acuminatis ſerrulatis utrinque glaberrimis, amentis aggregatis, ſtylo ſimplici, ſtigmatibus 3. *Braſil.* (Mart. nov. gen. t. 95.)

# CLASSIS III.

pag. 125.

n. 143. *Sonerila* Roxb. Cor. 1petala rotata 3partita. *Ericeis affinis.*

pag. 127.

Post n. 180. *Gilliesia* Lindl. Perianthium duplex: exter. e 5 bracteis sepaloideis patentibus compositum, internum carnosum labelliforme. Stamina 3 perfecta basi in urceolum connata. Stam. 3 sterilia dentiformia postica. Stigma capitatum 3angulare (interdum abortiens 3fidum). Caps. 3locularis 3valvis, valvis medio septiferis. *Familia?*

pag. 128.

Post n. 187. *Pseudanthus* Sieb. Flores monoeci: ♂ glomerati terminales. Cal. 6partitus, laciniis 2 concretis. Antherae subglobosae sessiles in fundo calycis. Flores ♀ axillares solitarii. Cal. foliaceus 6fidus persistens. Nux 6costata 1sperma. *Santaleae?*

pag. 131.

Post n. 246. *Talasium* *. Flores spicati. Cal. bracteatus 2valvis lanatus. Cor. glaberrima subcartilaginea persistens mutica.

pag. 132.

*Centrophorum* Trin. n. 258. deleatur. Est enim Andropogon acicularis Retz.

*Caryochloa* *. Flores paniculati. Cal. 2valvis aristatus. Cor. 2valvis cum semine concrescens. Caryopsis grandis dura tuberculosa, arista laterali torta elongata.

pag. 133.

Post n. 269. *Pleuropogon* R. Br. Flores racemosi. Cal. 1florus muticus, valvis inaequalibus. Cor. valva inf. obtusa mutica, super. nervo utroque lateraliter biseto. Caryopsis libera.

Post n. 280. *Pleuraphis* Torr. Flores spicati. Flosculi terni basi involucro villoso, laterales ♂. Cal. centralis 1florus 2valvis 5setus. Cor. valva inferior 1seta. Calyces laterales 2flori, valva inf. dorso setigera.

pag. 141.

Ad *Valerianam saxatilem* L. n. 27. (V. trinervis Viv. flor. corsic.)

pag. 142.

Poſt n. 50. *elata* Don. 69. V. caule ramoſo tereti laevi, foliolis lanceolatis integerrimis pubeſcentibus, floribus corymboſo-paniculatis, fructibus ſulcatis villoſis. *Nepal.*

pag. 143.

*Ad Fediam* Mönch.

Poſt n. 3. *truncata* Reichenb. 23. F. fructu antice 2coſtato globoſo, appendicula apicis oblique truncata elongata integerrima. *Creta.*

*microcarpa* Reichenb. 24. F. fructu antice 2coſtato ovato-globoſo, appendicula apicis minima ovata integerrima. *Agr monspel.* (Valerianella Loiſ.)

F. *carinata* R. et Sch (non *Loiſ.*) habitat et in *Thuringia.* (Valerianella Loiſ.)

pag. 144.

Poſt n. 12. *rotata* Reichenb. 25. F. fructu pubeſcente, dentibus ſenis late ovatis patentibus uncinulatis. *Patria?*

F. *diſcoidea* Vahl. dentes fructus etiam uncinulatos habet: habitat in *Luſitania.* (Valeriana diſcoidea Brot.)

F. *uncinata* M. B. habet dentes ſubulatos.

Ad F. *minutam* Vahl. dele ſyn. Loiſeleurii.

F. *eriocarpa* Desv. occurrit et in *Germania Italiaque.*

F. *pumila* Vahl. habet dentes fructus ternos obtuſos patentes.

pag. 145.

*Ad Sonerilam* Roxb.

*ſquarroſa* Roxb. 4. S. foliis obovatis integerrimis utrinque cauleque hiſpidulis, pedunculis terminalibus ſolitariis, floribus umbellatis 4fidis. *Nepal.*

*Ad Burmanniam.*

Ante n. 1. *uniflora* Rottl. 10. B. caule filiformi 1floro, calyce 3carinato, capſula 3alata, alis oblongis, foliis lanceolato-linearibus acutis. *Ind. or.*

Poſt n. 4. *coeleſtis* Don. 11. B. caule filiformi ſub-3floro, alis capſulae oblongis apice rotundatis, foliis radicalibus lanceolatis cuſpidatis breviſſimis. *Nepal.*

B. *diſticha* L. habitat et in *Nepalia* et in *nova Hollandia.* (B. diſtachya R. Br.)

pag. 146.

*Croci lutei* Lam. varietas videtur Cr. *lagenaeflorus* Saliſb.

pag. 151.

Ad *Gladiolum gracilem* Jacqu. (Glad. debilis Bot mag. 2585.)

pag. 153.

lin. 3. dele ſyn. Gl. *campanulati* Audr.

pag. 181.

*Ad Willichiam* Mut.

*callitrichoides* * 2. W. erectiuscula glabra, foliis oppositis ellipticis obtusis integerrimis nervosis, pedunculis 1floris, corolla sub-3loba. *In cataractis Orinoc.* (Hydranthelium Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 646.)

pag. 185.

*Ad Restionem.*

Ad R. *tropicum* R. Br. (R. lateriflorus Nees in Sieber agrost. n. 42.)

pag. 188.

*Ad Lyginiam* R. Br.

† *montevidensis* * 3. L. floribus androgynis, vaginis bracteisque imberbibus, fasciculis multifloris, fructibus longe pedicellatis. *Monte Video.* Sello.

pag. 193.

Ad *Lepidosperma filiforme* Labill. (L. tetragonum Nees in Sieber agrost. n. 49.)

pag. 195.

*Ad Rhynchosporam* Vahl.

Post n. 5. *pilulifera* Bertol. 39. Rh. spicis axillaribus compositis pedunculatis folio brevioribus, spiculis globulosis, caryopse glabra, culmo angulato foliolo, foliis linearibus. *Brasil.*

Post n. 12. *tenerrima* Nees. 40. Rh. spicis subaggregatis involucratis, squamis mucronato-aristatis glabris, caryopse rugosa sub-3dentata, culmo foliato foliisque setaceis laevibus. *Nov. Holl.* Sieber agrost. n. 116.

pag. 197.

*Ad Caustin* R. Br.

*recurvata* * 4. C. spicis solitariis terminalibus sub-3floris, squamis glabris acutis, ramis hinc canaliculatis, ramulis fasciculatis falcato-recurvis. *Nov. Holl.* (Restio uncinatus Nees in Sieber agrost. n. 35.)

C. *pentandra* R. Br., ramis canaliculatis strictis, ramulis triquetris, vaginis longe aristatis.

pag. 200.

*Ad Fimbristylin* Vahl.

Ad F. *elatam* R. Br. (F. marginata Labill. nov. Caledon. t. 16.)

Post n. 38. *striata* Labill. 62. F. umbella composita involucrum superante, spiculis ovatis, squamis mucronatis 3andris, caryopse cancellata, culmo tereti basi

foliato, foliis obtusis ciliatis, vaginis pubescentibus. *Nov. Caledon. Nov. Holland.* (F. obtusifolia Nees in Sieber agrost. n. 117.)

pag. 203.

*Ad Scirpum.*

Post n. 9. *congestus* Hamilt. 159. Sc. spica elliptica, glumis obtusissimis scariosis, stigmatibus 3, culmis caespitosis teretibus sulcatis. *Nepal.* (Eleocharis Don.)

pag. 204.

Ad Sc. *Brownii* * (Eleocharis riparia Nees in Sieber agrost. n. 20.)

pag. 205.

Ad Sc. *retroflexum* Poir. var. Eleocharis recurvata Nees in Sieber agrost. n. 24. *Nov. Holl.*

pag. 206.

Post n. 55. *muticus* Don. 160. Sc. spiculis lateralibus sessilibus glomeratis, squamis concavis mucronulatis, stigmatibus 3, culmo triquetro aphyllo apice obtuso. *Nepal.*

pag. 207.

Post n. 68. *Wallichianus* * 161. Sc. culmo basi 2phyllo vaginato foliisque setaceis striatis, vaginis apice barbatis, spicis ternis oblongis, squamis mucronatis carina scabris. *Nepal.* (Isolepis capillaris Don.)

pag. 208.

Post n. 82. *globosus* * 162. Sc. capitulo globoso dense multifloro, spiculis glabris sub-3floris, squamis obtusis basi lanatis, culmo tereti aphyllo. *Nov. Holl.* Sieber agrost. n. 29.

*Thuarsii* * 163. Sc. capitulo globoso multifloro, spiculis ovatis, squamis late ovatis nervosis margine scariosis apice callosis, culmo hinc sulcato. *Ins. Acunnae.* (Sc. sulcatus Thuars., Isolepis Carmich.)

Sequitur sectio:

** *Corymbis aut umbellis lateralibus.*

*anceps* Poir. 164. Sc. corymbis axillaribus paucifloris, spicis parvis sessilibus 3-4floris, squamis ovatis acutis nitidis patulis, culmo ancipiti foliato, foliis ensiformibus culmum superantibus. *Madagascar.*

*iridifolius* Poir. 165. Sc. corymbis axillaribus fastigiatis, spicis conicis obtusis, culmo compresso altissimo, foliis ensiformibus angustis. *Madagascar.*

*latifolius* Bertol. 166. Sc. corymbis compositis axillaribus, spicis solitariis ovatis acuminatis, squamis mucronatis, culmo angulato sulcato, foliis ensiformibus striatis. *Brasil.*

*bromeliaefolius* 167. Sc. corymbo fupradecompofito, fpicis teretibus acuminatis, fquamis obtufis coloratis, culmo elato 3quetro, foliis lanceolatis carinatis. *Guiana.*
Rudg.

*corymbofus* Roth. n. 83.

pag. 210.

Poft n. 103. *elongatus* Don. 168. Sc. umbella compofita prolifera, fpicis oblongis teretibus, fquamis mucronatis glabris, involucro polyphyllo umbellam ter fuperante, foliis carinatis fcabris culmum fuperantibus. *Nepal.*

Poft n. 110. *Donianus* * 169. Sc. umbella compofita prolifera, fpicis ovatis paucifloris, fquamis mucronulatis, involucro 5phyllo umbellam fuperante, culmo 4gono inferne vaginato, foliis carinatis fcabris. *Nepal.* (Sc. quadrangulus Don.)

pag. 212.

Sc. fulcatus Elliott. nomen mutet in Sc. *Elliottii* *, cum Sc. fulcatus Roth. n. 50. jam adfit.

pag. 213.

Poft n. 141. *bicolor* * 170. Sc. fpicis capitatis ovatis teretibus, fquamis margine coloratis, involucro 2phyllo hinc erecto illinc deflexo, culmo angulato filiformi, foliis canaliculatis anguftiffimis. *Inf. Acunnae.* (Ifolepis Carmich.)

*fquarrofus* * 171. Sc. capitulo globofo, fpiculis ovatis, fquamis margine concoloribus, involucro aphyllo, folio altero deflexo, culmo angulato filiformi bafi foliato, foliis canaliculatis anguftiffimis. *Inf. Acunnae.* (Ifolepis Carmich.)

n. 150. legatur *Humboldtii* *.

pag. 214.

Ad Sc. *denfum* Wall. (Ifolepis tenuiffima Don.)

pag. 216.

*Ad Cyperum.*

Ad C. *articulatum* L. adde patriam: *nov. Holl.*

Poft n. 22. *fetifolius* Don. 238. C. umbella 4-6radiata, involucro fub-5phyllo umbellam multo fuperante, fpiculis fquarrofis, fquamis obtufis infra apicem recurvo-mucronatis. *Nepal.*

pag. 221.

Poft n. 95. *Wallichianus* * 239. C. fpicis fubquinis linearibus, fquamis ovalibus obtufis ftriatis, involucro fub-5phyllo umbellam excedente foliisque linearibus carinatis afperis. *Nepal.* (C. pulcher Don.)

*trisulcus* Don. 240. C. spicis subquinis ovali-oblongis obtusis, squamis appressis repando-crispatis, foliis linearibus scabris culmo trisulco brevioribus. *Nepal.*

*nervosus* Bertol. 241. C. spicis linearibus remotiusculis erecto-patulis, squamis obovatis obtusis multinerviis, involucro pentaphyllo, radice tuberifera. *Brasil.* Opusc. scientif. 3. p. 407.

pag. 222.

Post n. 103. *caricinus* Don. 242. C. spicis racemosis tenuifloris linearibus remote alternis, bracteis lineari-setaceis scabris spicas superantibus, squamis mucronatis, foliis culmo 3quetro longioribus. *Nepal.*

pag. 225.

Ad C. *pilosum* Vahl. (C. paniculatus Don.)

pag. 227.

Post n. 171. *Sieberianus* * 243. C. spicis ovato-oblongis compressis sub-20floris fulvis, squamis obtusiusculis appressis, involucro sub-3phyllo longissimo, culmo 3quetro scaberrimo folia linearia superante. *Nov. Holland.* (C. microcephalus Nees in Sieber agrost. n. 103.)

pag. 233.

*Mariscus parviflorus* Nees in Sieb. agrost. n. 101. ad exemplar, quod vidi, nondum adultus, varietas esse M. *laevigati* R. et Sch. videtur, qui igitur et in *nova Holl.* provenit.

Ad patriam M. *panicei* Vahl. adde *Ind. or.*

pag. 234.

Post n. 8. *rigidus* * 28. M. spicis numerosis cylindricis subpedicellatis, spiculis oblongis 1floris erecto-patulis striatis bracteas setaceas superantibus, involucro polyphyllo longissimo, culmo 3quetro glabro. *Nov. Holl.* (Carex Sieberi Nees in Sieber. agrost. n. 104.) M. paniceus proximis differt culmo gracili, involucro 4phyllo, spiculis 3floris.

pag. 238.

*Ad Olyram.*

*brasiliensis* * 8. O. floribus femineis pluribus inferioribus, spicis paniculatis, foliis ovato-oblongis obtusis striatis scabris. *Brasil.* (Raddia brasiliensis Bertolon. opusc. scient. vol. 3. p. 410.)

pag. 239.

Poſt *Oropetium* Trin.:

THALASIUM *.

*montevidenſe* * *Monte Video.* Gramen pedale erectum baſi radicans, culmo ramoſo geniculato, vaginis retrorſum villoſis, foliis convoluto-filiformibus. Sello

pag. 241.

Ad *Alopecurum anguſtifolium* Sibth. (A. Pallaſii Trin.)

pag. 243.

*Ad Polypogona.*

*ſimplex* * 16. P. racemo ſtricto, calycibus rigidis ſcabris ſub baſi barbatis, corolla breviter ariſtata, foliis convolutis culmoque glabris, ligula nulla. *Nov Holl.* (Podoſaemon n. ſp. Nees in Sieb. agroſt. n. 94.)

pag. 245.

*Ad Paſpalum.*

Poſt n. 20. *lanatum* * 81. P. ſpicis binatis alternis, rhachi anguſta, floſculis 4ſerialibus ovatis acutis 1nerviis lanatis, foliis latiuſculis undulatis glabris. *Rio grande.* Sello.

pag. 250.

deleatur *Centrophorum chinenſe Trin.*

pag. 252.

Ante Oryzopſin:

CARYOCHLOA *.

*montevidenſis* * *Monte Video.* Gramen cubitale glabrum, foliis filiformibus, panicula viridi. Sello.

pag. 254.

*Ad Deyeuxiam* Clarion.

Poſt n. 8. *megapotamica* * 12. D. paniculae effuſae ramis racemoſis, calycibus corolla brevioribus longiſſime lanatis, ariſta elongata geniculata, rudimento articulato calycem ſuperante, foliis planis glabris. *Rio grande.* Sello.

pag. 256.

*Ad Stipam.*

Poſt n. 31. *verticillata* Nees. 37. St. paniculae effuſae ramis inferioribus verticillato-faſciculatis, calycibus an-

gustissimis acuminatis, arista longissima flexuosa basi pubescente, foliis planiusculis, ligula nulla. *Nov. Holl.* Sieb. agrost. n. 64.

*rudis* * 88. St. panicula contracta pauciflora, calycibus elongatis linearibus acuminatis glabris nervosis, arista valida torta longissima, foliis convoluto-filiformibus. *Nov. Holl.* (St. pubescens Nees in Sieb. agrost. n. 66.)

pag. 258.

*Ad Agrostin.*

Ad A. *asperam* Mx. (A. cryptandra Torr.)

Post n. 18. *paradoxa* R. Br. 86. A. panicula coarctata lanceolata fusco-purpurea, corollae subpedicellatae valvis nervosis, foliis planis, ligula denticulata. *Inf. Melville.* (Colpodium latifolium R. Br.)

*airoides* Torr. 87. A. panicula pyramidata glabra, calycibus corolla brevioribus, valva altera acuta, obtusa altera, foliis linearibus glabris, vaginis ore barbatis. *Ad montes scopulosos Amer. bor.*

pag. 263.

Post n. 76. *caespitosa* Torr. 88. A. paniculae contractae pedicellis superne incrassatis, calycibus cuspidatis corollam superantibus glaberrimis coloratis, corollae scabrae arista elongata, culmo caespitoso, foliis distichis rigidis convolutis. *Ad fl. Missuri.*

pag. 265.

Post *Crysin*:

PLEUROPOGON R. Br.

*Sabinii* R. Br. *Inf. Melvill.* Gramen glabrum, floribus racemoso-spicatis.

Ad Spartinam strictam Roth. adde patriam et *Amer. bor.*

pag. 266.

*Ad Aristidam.*

Post n. 6. *megapotamica* * 35. A. paniculae strictae elongatae ramis subsecundis, calycibus longissimis aristatis glabris, arista corollae longissima patula scabra. *Rio grande.* Sello.

pag. 267.

Post n. 12. † *fasciculata* Torr. 36. A. paniculae elongatae spiciformis ramulis fasciculatis, calycibus corollam subaequantibus, aristis elongatis patulis, foliis lineari-filiformibus glabris, ligula barbata. *Canada.*

pag. 268.

Ad n. 24. *pilosa* Labill. 37. A. paniculae racemosae strictae ramis erectis, valvis calycinis inaequalibus aristatis corollam subaequantibus, aristis corollae in-

pag. 316.

*Ad Panicum.*

Post n. 118. *loliaceum* Bertol. 203. P. paniculae racemosae ramis strictis, flosculis oblongis hirsutis nervosis, foliis lanceolato-linearibus supra pubescentibus, culmo vaginisque hirtis. *Brasil.*

pag. 317.

Post n. 132. *megapotamicum* * 204. P. paniculae ramis patentibus, flosculis brevissime pedicellatis glabris acutis nervosis, corollis lucidis, culmo angulato foliisque convolutis glabris. *Rio grande.* Sello.

pag. 320.

Post n. 174. *polygonatum* Schrad. 205. P. paniculae erectae ramis strictis, axillis pilosis, flosculis breviter pedicellatis lanceolatis acutis nervosis glabris, vaginis pilosis, nodis culmi barbatis. *Nov. Holl.* Sieb. agrost. n. 121.

*condensatum* Bertol. 206. P. panicula racemosa condensata strictissima, flosculis lanceolatis acuminatis nervosis, foliis cordato-lanceolatis culmoque decumbente glaberrimis. *Brasil.*

pag. 327.

*Elymus mollis* R. Br. in Franklin. itin. p. 732. videtur idem ac E. *villosus* Mühlenb. n. 7.

pag. 328.

*Ad Pappophorum* Schreb.

*elongatum* * 8. P. panicula cylindrica elongata lobata, calycibus glabris, aristis subvicenis, foliis convolutis longissimis. *Monte Video.* Sello.

pag. 329.

Post n. 7. *megapotamicum* * 9. P. racemo spicato paucifloro, pedunculis abbreviatis villosis, calycibus subternis glabris nervosis, aristis subduodenis longissimis patentibus, culmo simplici, foliis ciliatis. *Rio grande.* Sello.

*Ad Sesleriam* Scop.

Post n. 10. *Pumilio* * 13. S. panicula coarctata abbreviata, calyce 3floro, flosculo infimo perfecto, reliquis neutris 1valvibus. *Afric. med.* (Triraphis Pumilio R. Brown ad Denham et Clapperton. iter, p. 245.)

pag. 332.

*Ad Danthoniam* Cand.

*paradoxa* R. Br. 13. D. panicula stricta, calycibus glabris 4floris, flosculis breviter villosis, arista dorsali basi dilatata torta calycibus breviore, culmo foliisque

filiformibus glabris. *Nov. Holl.* (Stipa, fphalmate fcribae forte, Nees in Sieber agroft. n. 84.)

*Ad Köleram* Perf.

*macilenta* Cand. 9. K. panicula fpicata cylindrica laxiuscula, flosculis glabris, calycibus 3floris cufpidatis, arifta breviffima, culmo fimplici foliisque anguftiffimis glabriusculis. *Gallia provinc.*

pag. 333.

*Ad Avenam.*

Poft n. 10. *villofa* Bertol. 54. A. panicula ftricta, corollis bafi barbatis calycem aequantibus, valva corollae exter. 2feta, arifta dorfali geniculata, culmo paniculaeque ramis villofis, foliis anguftiffimis vaginisque glabris. *Italia med.*

pag. 335.

A. *Forskolei* Vahl. et *arundinaceam* Delil. eamdem habet fpeciem R. Brown ad Denham. it. p. 244.

pag. 338.

*Ad Poam.*

Poft n. 21. *Sieberiana* * 135. P. *paniculae nutantis ramis flexuofis* fcabris, fpiculis coloratis, flosculis liberis remotiusculis 5nerviis acutiusculis carina fcabris, foliis filiformibus angulatis, ligula nulla. *Nov. Holl.* (P. auftralis Nees in Sieber. agroft. n. 77.)

pag. 339.

Poft n. 22. *arctica* R. Br. 136. P. panicula effufa, ramis paucifloris capillaribus laevibus fpiculisque coloratis ovatis 3-4floris, corollae *valva inferiore* fubfericea bafi lanata, foliis linearibus, ligula fubquadrata erofa. *Grönland. Amer. arctic.*

Poft n. 31. *anguftata* R. Br. 137. P. panicula fimplici coarctata lineari-lanceolata, fpiculis oblongis coloratis glabris fub-4floris, valvis corollae erofis denticulatis 5nerviis, foliis angufte linearibus, ligula fubquadrata. *Amer. arctic.*

*abbreviata* R. Br. 138. P. panicula fimpliciffima abbreviata coarctata, fpiculis coloratis 4-5floris, valvis calycis acutiffimis fubaequalibus flosculos bafi lanatos pubefcentes aequantibus, foliis convoluto-fetaceis. *Inf. Melville.*

pag. 342.

Poft n. 63. *megapotamica* * 139. P. paniculae ramofiffimae laxae ramulis capillaribus elongatis 1floris fpiculisque linearibus glabris coloratis, flosculis acutis trinerviis, culmo elato, foliis convolutis. *Rio grande.* Sello.

culi rectis flosculos subaequantibus. *Emodi montes.* (D. inermis β. Wallich.)

Ad D. *pilosum* pertinet D. inermis α. Wallich. D. strictus Don.

*Ad Scabiosam* Vaill.

Post n. 6. *reversa* Ledeb. 13. Sc. foliis lanceolatis indivisis pinnatifidisque amplexicaulibus supra nitidis, laciniis lanceolatis subintegerrimis, caule hirsuto, involucro ciliato, pappo setaceo. *Sibir.*

*Hornemanni* * 14. Sc. foliis pubescentibus, radicalibus lyratis, caulinis pinnatifidis amplexicaulibus, caule ramosissimo aspero, ramis patentibus, corollulis radiantibus. *Patria?* (Sc. pyrenaica Hornem. in lit.)

pag. 379.

Ad Succisam *leucantham* * (Scabiosa mediterranea Viv. app. ad fl. cors.)

pag. 381.

*Ad Asterocephalum* Vaill.

Post n. 16. *diffusus* *. 48. A. foliis radicalibus lyratis acutiusculis serratis glabriusculis, caulinis pinnatifidis, laciniis linearibus integerrimis, corollulis radiantibus involucrum duplo superantibus, setis pappi testaceis. *Teneriffa.* (Scabiosa diffusa Reichenb. hort. t. 16.)

pag. 382.

In varietatibus A. *Columbariae* * dele Scabiosam setiferam Lam. adde Scab. unisetam Sav., Savianam Reichenb.

pag. 383.

Ad A. *gramuntium* * (Scabiosa mollis W. suppl.)

Ad A. *agrestem* * add. setis pappi brevissimis.

pag. 385.

*Ad Patriniam* Juss.

*nudiuscula* Fisch. 5. P. foliis omnibus 2pinnatifidis glabris, laciniis lanceolatis obtusiusculis, floribus corymboso-paniculatis. *Imaus.*

*coronata* Fisch 5. P. foliis radicalibus oblongis integerrimis pinnatifidisque carnosis glabris, scapo stricto, corymbis compactis. *Davuria.*

pag. 386.

Post *Declieuxiam* Humb.:

PSYLLOCARPUS Mart.

*ericoides* Mart. 1. Ps. simpliciusculus superne divisus, foliis verticillatis subulatis internodio brevioribus, floribus terminalibus aggregatis. *Brasil.*

*asparagoides* Mart. 2. Pf. ramofus glaber, *ramis gracilibus virgatis*, foliis verticillatis filiformi-fetaceis, floribus capitatis. *Brasil.*

*laricinus* * 3. Pf. ramofiffimus glaber, foliis fafciculato-verticillatis fetaceis, floribus terminalibus fubfpicatis. *Brasil.* (Pf. laricoides Mart.)

*thymbroides* Mart. 4. Pf. ramofiffimus pubefcens, *ramis fquarrofis*, foliis fafciculatis, floribus terminalibus fubfpicatis. *Brasil.*

pag. 387.

*Ad Galium.*

Poft n. 19. *atherodes* * 111. G. foliis lineari-filiformibus longe ariftatis patentiffimis glabris, pedunculis axillaribus 1floris 2phyllis folio brevioribus, petalis obtufis 1nerviis. *Rio grande.* Sello.

pag. 388.

Ante n. 26. *corsicum* * 112. G. foliis fubfenis ovato-oblongis acutis pubefcentibus, caule debili villofo, pedunculis divaricatis 3fidis paucifloris. *Corsica.*

Ad G. *asperifolium* Wall. videtur G. *parviflorum* Don. proxime accedere.

pag. 390.

Poft n. 66. *megapotamicum* * 113. G. foliis rigidis lanceolatis acutis fpinulofo-ciliatis fubtus pallidis glabris, fructibus grandibus feffilibus granulatis, caule fimplici erecto. *Rio grande.* Sello.

pag. 391.

Poft n. 78. *Hamiltonii* * 114. G. foliis oblongis acutis utrinque pilofiusculis, pedunculis terminalibus trichotomis laxifloris, caule erecto ramofo pilofo. *Nepal.* (G. latifolium Hamilt. Don.)

*vestitum* Don. 115. G. foliis ovali-oblongis obtufis utrinque cauleque fimplici hirfutiffimis, pedunculis axillaribus trichotomis, floribus glomeratis, fructibus denfe hifpido-tomentofis. *Nepal.*

Ad G. *elegans* Wall. (G. ciliatum Hamilt. Don.)

pag. 396.

In phrafi *Asperulae galioidis* M. B. lege lacinulis corollae *uncinulatis* loco unguiculatis.

pag. 397.

Ad *Rubiam cordifoliam* L. pertinere et *alatam* Wall. n. 6. et *Munjistam* Roxb. n. 20. Don.

Poft n. 9. *noxia* Hilar. 23. R. caule decumbente ramofo hirfutiusculo, foliis quaternis ellipticis mucronatis 3nerviis pellucido-punctatis hifpidiusculis, pedunculis axillaribus 1floris, baccis albis. *Bra-*

pag. 403.

*Ad Spermacocen.*

*megapotamica* * 62. Sp. caule fuffruticofo ramofo hirto, foliis lanceolatis cufpidatis utrinque ftrigofis, ftipularum ciliis elongatis ftrictis, capitulis denfifloris, calycibus ariftatis corollam fubaequantibus. *Rio grande.* Sello.

pag. 406.

*Ad Ernodeam* Sw.

*nepalenfis* * 3. E. caule herbaceo tomentofo, foliis oppofitis oblongo-lanceolatis nervofis pubefcentibus, ftipulis 3partitis fetaceis, cymis terminalibus trichotomis multifloris. *Nepal.* (Cuncea trifida Hamilt. Don.)

pag. 411.

*Ad Hedyotin.*

Ad H. *ulmifoliam* Roxb. pertinere H. *lineatam* Ej. n. 37. Hamilton. apud Don. fl. nepal. p. 134.

pag. 412.

Ad H. *ftrictam* Wall. (H. fufca Hamilt. Don.)

pag. 413.

Poft n. 33. *ciliolata* Torr. 44. H. foliis fpathulatis feffilibus ciliatis, pedunculis trichotomis, caule ramofo. *Ad cataractas Niagarae.*

pag. 414.

Poft n. 39. *laxa* Don. 45. H. foliis ovatis acutis utrinque pilofiusculis, pedunculis axillaribus dichotomis, floribus fubternis, caule ramofo debili laevi. *Nepal.*

pag. 415.

*Ad Manettiam* Mutis.

Poft n. 6. *cordifolia* Mart. 9. M. herbacea volubilis, foliis cordato-ovatis acutis glabriusculis, pedunculis axillaribus 1-3floris, calycibus 4fidis. *Brafil.*

M. *uniflora* Humb. habet calyces 8partitos.

pag. 415.

Ad *Catesbaeam fpinofam.* (C. latifolia Lindl. in bot. reg. 858.)

pag. 418.

*Ad Gardneriam* Wall.

*glabra* Wall. 2. G. foliis ovato-oblongis acuminatis, pedunculi fimplicibus 1floris. *Nepal.*

G. *ovata* Wall. habet folia oblonga utrinque attenuata.

pag. 420.

*Ad Callicarpam.*

Post n. 4. *rubella* Lindl. 22. C. foliis cordato-oblongis antrorsum dilatatis acuminatis crenato-dentatis utrinque ramisque villoso-tomentosis, cymis pedunculatis 2partitis multifloris. *China.* Bot. reg. 883.

C. *longifolia* Lam. melius habet folia lanceolata acuminata elongata, corymbos axillares abbreviatos. Cf. Hook. exot. fl. 133.

pag. 421.

Ad *Walleniam laurifoliam* Sw. var. angustifolia (W. angustifolia Mart. in nov. act. nat. cur. 11. p. 87.).

pag. 425.

*Ad Exacum.*

Post n. 9. *erubescens* * 15. E. caule simplici tereti, foliis lanceolatis acutis 3nerviis amplexicaulibus, floribus paniculatis, laciniis corollae rotundatis. *Brasil.* (Dejanira erubescens Schlechtend.)

*pallescens* * 16. E. caule simplici teretiusculo, foliis late ovatis acutis obscure 3nerviis coriaceis amplexicaulibus, floribus dense congestis, laciniis corollae rotundatis. *Brasil.* (Dejanira pallescens Schlechtend.)

*nervosum* * 17. E. foliis sessilibus oblongis acuminatis 5nerviis pellucido-marginatis, floribus dense congestis, laciniis corollae oblongis. *Brasil.* (Dejanira nervosa Schlechtend.) E. *tetragonum* Roxb. proximum differt praeter patriam, calycibus 4alatis.

pag. 426.

*Ad Sebaeam* R. Br.

Inter n. 2. et 3. *sulfurea* Schlechtend. 9. S. caule subtetragono ramoso, foliis sessilibus late ovatis acutis, calyce anguste alato, floribus 5fidis, staminibus exsertis. *C. B. S.*

*crassulaefolia* Schlechtend. 10. S. caule tetragono ramoso, foliis amplexicaulibus cordato-subrotundis acutis subcoriaceis nervosis, floribus corymbosis 5fidis, calycibus argute carinatis. *Afric. austr.*

*capitata* Schlechtend. 11. S. caule simplici folioso, foliis confertis ovatis 3nerviis, panicula coarctata terminali, floribus 4fidis, staminibus exsertis. *C. B. S.*

pag. 427.

*Ad Houstoniam.*

Post n. 2. *minima* Beck. 9. H. caule erecto simplici scabriusculo, foliis spathulatis ciliatis, pedunculis terminalibus 1floris, laciniis calycis late ovatis acutis erectis. *Ad fl. Missuri.* H. *patens* Ell. proxima

differt caule ramoso, laciniis calycis linearibus. Cf. Silliman's journ. vol. 10. p. 262. Elliott. Carolin. austr. p. 191.

pag. 428.

*Ad Labatiam* Sw.

*macrocarpa* Mart. 3. L. arborea, foliis oblongo-lanceolatis glabriusculis, floribus pedunculatis aggregatis. *Brasil.* Mart. nov. gen. 2. t. 160. 161.

pag. 430.

Ad *Buddleam Neemda* Roxb. (B. subserrata Hamilt. Don.)

pag. 434.

*Ad Plantaginem.*

Post n. 12. *macrocarpa* Chamiss. 92. Pl. foliis lanceolatis integerrimis erectis glabriusculis, scapo subangulato, spica cylindrica densiflora, capsula maxima 2loculari 2sperma (non circumscissa). *Ins. Aleut.*

*truncata* Chamiss. 93. Pl. hirsutissimo-tomentosa, foliis lanceolatis basi attenuatis, spicis clavatis elongatis basi laxis, capsula 2loculari 2sperma. *Chili.*

Ad Pl. *lanceolatam* n. 15. pertinere Pl. *attenuatam* Wallich. n. 23. Don.

Ad Pl. *xorullensem* Humb. (Pl. mexicana Link., graminea W. herb.)

pag. 438.

Post n. 68. *tumida* Chamiss. 94. Pl. subcaulescens, foliis linearibus obtusiusculis integerrimis cinereo-sericeis, scapo laevi tereti, spica ovali, staminibus corolla brevioribus, capsula 2loculari 2sperma. *Chili.*

*brasiliensis* Sims. 95. Pl. subcaulescens, foliis lineari-lanceolatis integerrimis ciliatis nervosis, spica cylindrica elongata glabra, stylis longissimis. *Brasil.* Sello. Bot. mag. 2616.

pag. 440.

Post n. 83. *princeps* Chamiss. 96. Pl. fruticosa elata ramosa, foliis amplexicaulibus lineari-lanceolatis glaberrimis, spica elongata sparsiflora laxa, capsula 1loculari 2sperma. *Ins. Sandwich.*

*coriacea* Schlechtend. 97. Pl. suffruticosa, foliis lineari-lanceolatis coriaceis integerrimis glabriusculis, spicis crassis cylindricis elongatis, antheris grandibus longe exsertis, capsula 2sperma. *Rio grande.* Sello.

Post *Plantaginem:*

## PHELLINE Labill.

*comosa* Labill. *Nov. Caled.* Frutex foliis fastigiatis subspathulato-oblongis dentatis glabris, floribus paniculatis, gemmis lanuginosis.

pag. 441.

*Ad Bruceam* Herit.

*trifoliata* * 4. Br. foliis ternatis oblongis obtusis glabris, corymbis axillaribus dichotomis, floribus ☿. *Nov. Caledon.* (Evodia drupacea Labill. nov. Caled. t. 74.)

PHILAGONIA Blum.

*procera* Blum. *Java.* Arbor procera, foliis pinnatis lanceolatis integerrimis glabris, cymis terminalibus 3partitis.

pag. 443.

*Ad Ammanniam.*

† *Floribus axillaribus solitariis.*

*rubra* Hamilt. 19. A. foliis oblongis obtusis sessilibus, ramulis floriferis axillaribus oppositis folia subaequantibus, floribus sessilibus, caule simplici 4gono erecto. *Nepal.*

pag. 444.

Post n. 13. *arenaria* Kunth. 20. A. foliis cordato-linearibus semiamplexicaulibus, pedunculis sub-3floris, floribus 4andris. *Caracas.*

pag. 447.

*Ad Cissum.*

Ad C. *adnatam* Roxb. (C. aristata Blum.)
Ad C. *rotundifoliam* Vahl. add., ramis scandentibus pruinosis, geniculis inflatis. Patria: *Java.*
Ad C. *latifoliam* Lam. (C. compressa Blum.)
Post n. 12. *discolor* Blum. 67. C. foliis cordato-oblongis acuminatis setaceo-serratis discoloribus ramulisque angulatis glabris, cymis oppositifoliis sub-5fidis folio brevioribus. *Java.*
*nodosa* Blum. 68. C. foliis subcordato-oblongis cuspidatis setaceo-serrulatis glabris, corymbis oppositifoliis dichotomis, pedicellis umbellatis, caule tereti herbaceo nodoso. *Java.*

pag. 448.

Ad C. *cineream* Lam. (C. pubinervis Blum.)

pag. 449.

Post n. 36. *emarginella* Sw. 69. C. foliolis obovatis emarginatis remote crenatis glabris, ramis petiolisque 4gonis. *Inf. Carib.* Act. holm. 1825. p. 427.
Post n. 43. *papillosa* Blum. 70. C. foliolis ovato-oblongis acuminatis grosse argutéque serratis glabris coriaceis, corymbis axillaribus divaricatis, caule lignoso papilloso ramosissimo. *Java.*

*geniculata* Blum. 71. C. foliolis oblongis acuminatis obtuſe denticulatis membranaceis ad coſtam utrinque pubeſcentibus, lateralibus ſemicordatis, corymbis dichotomis geniculatis, caule ſuffruticoſo tereti uſculo. *Java.*

*rhodocarpa* Blum. 72. C. foliolis ovato-ellipticis acuminatis membranaceis glabris groſſe inaequaliter dentatis, lateralibus ſemicordatis, corymbis dichotomis petiolo brevioribus, caule ſub-4gono. *Java.*

*hirtella* Blum. 73. C. foliolis ovato-oblongis membranaceis inaequaliter ſerratis ſubtus petiolisque tomentoſis, corymbis dichotomis axillaribus. *Java.*

Ad C. *crenatam* Vahl. add. foliolis villoſiuſculis.

Ad C. *carnoſam* Lam. (C. pergamacea Blum.)

pag. 450.

Poſt n. 54. *dichotoma* Blum. 74. C. foliis coriaceis glabris, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis glanduloſo-ſerratis, corymbis dichotomis folio brevioribus. *Java.*

*thyrſiflora* Blum. 75. C. foliolis ovato-oblongis acutis ſerrulatis ſubtus ramisque rubiginoſo-tomentoſis, thyrſis cirrifloris. *Java.*

*quinquefolia* Soland. 76. C. foliolis oblongis utrinque attenuatis ſerratis glabris, ramis teretibus nodoſis laevibus, paniculae oppoſitifoliae ramis divaricatis. *Braſil.* Bot. mag. 2443.

Ad C. *heterophyllam* Poir. (C. leucocarpa Blum.)

Ad C. *ſerrulatam* Roxb. (C. glabrata Blum.)

*tuberculata* Blum. 77. C. foliolis oblongis acuminatis ſerratis glabris coriaceis, corymbis petiolo brevioribus, caule compreſſo tuberculato. *Java.*

*mutabilis* Blum. 78. C. foliolis oblongis acuminatis, lateralibus obtuſiuſculis remote ſerratis, ſerraturis ſcarioſis, cymis axillaribus, caule fruticoſo, baccis 3-4-ſpermis. *Java.*

*ſcarioſa* Blum. 79. C. foliolis ovalibus obtuſiuſculis coriaceis apice groſſe ſerratis, ſerraturis apice ſcarioſis, caule rimoſo. *Inſ. Javae ab auſtro vicina.*

*laevigata* Blum. 80. C. foliolis ovatis acutis glanduloſo-ſerratis laevibus coriaceis, corymbis axillaribus, caule tereti verrucoſo. *Java.*

*involucrata* * 81. C. foliolis oblongis acuminatis repando-dentatis, floribus polygamis faſciculatis involucratis, marginalibus ♂ pedicellatis, centralibus ☿ ſeſſilibus. *Java.* (Pterisanthes ciſſoides Blum.)

pag. 451.

*Ad Cornum.*

Poſt n. 13. *macrophylla* Wallich. 17. C. foliis petiolatis ſubrotundo-ovatis acutis integerrimis ſubtus glaucis, cymis terminalibus pedunculatis patentibus. *Nepala.*

pag. 453.

*Ad Rivinam.*

*finis* Mart. 7. R. glabra, foliis ovatis acuminatis obſolete crenulatis margine nudis, racemis aequalibus, calyce 2labiato. *Braſil.*

pag. 454.

*Ad Alchemillam.*

*ctinata* Kunth. 11. A. ſarmentoſa filiformis dichotoma, foliis ſubtus argenteo-ſericeis pectinato-ſerratis, radicalibus longiſſime petiolatis reniformibus multilobis, caulinis ſub-3lobis, ſtipulis 3-5fidis, floribus terminalibus diandris. *Nov. Granat.*

*baidiaefolia* Kunth. 12. A. caule aſcendente ſuperne ramoſo villoſo, foliis ternato-3partitis ſericeis, laciniis obovatis inciſo-ſerratis, ſtipulis 2-4fidis, corymbis compactis, floribus diandris digynis. *Mexico.*

*ſuta* Kunth. 13. A. caule erecto ramoſo foliisque 3partitis hirſutis, laciniis flabellato-multifidis, ſtipulis 2-3fidis, floribus terminalibus faſciculatis diandris. *Amer. auſtr.?*

*alis* Kunth. 14. A. caule erecto ſubdiviſo denſe folioſo radicante, foliis imbricatis amplexicauli-vaginantibus multifidis externe ſericeo-hirſutis, floribus terminalibus ſubternis ſeſſilibus diandris. *Alp. ſumm. Quito.*

A. *Aphanen* Leers. (A. rupeſtris Kunth. quae A. tripartita R. et P.)

pag. 472.

*Ad Perſooniam* Sm.

ſt n. 2. *gnidioides* Sieb. 23. P. foliis filiformibus canaliculatis pungentibus glabris divaricatis, pedunculis breviſſimis ſubſolitariis axillaribus, calycibus ſubſericeis. *Nov. Holl.*

P. *juniperinam* Labill. (P. aceroſa Sieb.)

ſt n. 6. *arida* Sieb. 24. P. foliis linearibus utrinque attenuatis hirſutis, pedunculis ſolitariis breviſſimis, germinibus villoſis, ſtylis elongatis. *Nov. Holl.*

pag. 473.

ſt n. 14. *oxycoccoides* Sieb. 25. P. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis eveniis ſubcoriaceis glabris, ramis diffuſis procumbentibus, pedunculis 1floris. *Nov. Holl.*

*oluta* Sieb. 26. P. foliis oblongis obtuſis coriaceis margine revolutis ſubtus pallide ſericeis, fructibus ſtylo obliquo coronatis. *Nov. Holl.*

*ucefcens* Sieb. 27. P. foliis ſpathulato-lanceolatis mucronatis venuloſis glabris glaucis, ſtylis longiſſimis. *Nov. Holl.*

pag. 474.

*Ad Symphyonema* R. Br.

*abrotanoides* Sieb. 3. S. foliis multipartitis, laciniis linearibus g bris 3dentatis, rhachi bracteisque glaberrim *Nov. Holl.*

*Ad Conofpermum* Sm.

Poft n. 2. *imbricatum* Sieb. 10. C. foliis imbricatis verticalib ovatis mucronatis reticulatis bafi contractis i mulisque pubefcentibus, pedunculis terminalib aggregatis. *Nov. Holl.*

pag. 475.

*Ad Grevilleam* R. Br.

Poft n. 1. *laurifolia* Sieb. 38. Gr. foliis oblongis acuminatis ven fis fubtus ftrigillofis, racemis multifloris fpicat germinibus villofis. *Nov. Holl.*

pag. 476.

Poft n. 12. *acifolia* Sieb. 39. Gr. foliis lineari-filiformibus ri dis patentibus fupra canaliculatis glabris, ra mis abbreviatis, ftylo longiffimo glabro. *N Holl.*

Poft n. 16. *diffufa* Sieb. 40. Gr. foliis lineari-lanceolatis muc natis fubtus fericeis, capitulis terminalibus p dunculatis. *Nov. Holl.*

*pubefcens* Hook. 41. Gr. foliis fpathulato-oblongis mucronatis utri que pubefcentibus, racemis corymbofis, pedicel calycibusque glabris. *Nov. Holl.* Hook. exot. t. 216.

*ferruginea* Sieb. 42. Gr. foliis oblongo-lanceolatis mucronatis v nofis fubtus ferrugineo-tomentofis, ramis hirf tis, fructibus villofis. *Nov. Holl.*

Ad Gr. *Baueri* R. Br. (Gr. daphnoides Sieb.)

Ad Gr. *occidentalem* R. Br. (Gr. oleoides Sieb.)

pag. 477.

Poft n. 20. *myrtacea* Sieb. 43. Gr. foliis elliptico-oblongis utri que attenuatis ramulisque hirfutiusculis, racem paucifloris. *Nov. Holl.*

Poft n. 25. *acanthifolia* Sieb. 44. Gr. foliis pinnatifidis coriac glaberrimis, laciniis lanceolatis 3fidis fpinof fpicis ftrobiliformibus, calycibus villofis, fty glaberrimo. *Nov. Holl.*

pag. 478.

*Ad Hakeam* Schrad.

Poft n. 1. *pachyphylla* Sieb. 35. H. foliis teretibus craffis velu nis mucronatis patentibus, calycibus aggregat abbreviatis glabriusculis. *Nov. Holl.*

pag. 485.

*Ad Banksiam.*

ft n. 12. *Cunninghamii* Sieb. 28. B. foliis linearibus integerrimis truncatis mucronatis subtus tomentosis eveniis, ramulis villosis. *Nov. Holl.*

pag. 487.

*Ad Viscum.*

ft n. 1. *nepalense* * 26. V. ramulis compressis striatis dichotomis, articulis sub-3floris. *Nepal.* (V. dichotomum Don.)

pag. 488.

V. *orientale* W. (V. stellatum Don.)

ft n. 23. *platyphyllum* * 27. V. ramulis alternis angulatis glabris, foliis alternis obovatis subtus nervosis petiolatis, umbellis sub-4floris pedunculatis sparsis, involucellis 6fidis persistentibus. *Nepal.* (V. latifolium Hamilt. Don.)

*Ad Elaeagnum.*

ft n. 1. *argentea* Pursh. 10. E. foliis oblongis utrinque attenuatis supra lepidotis subtus argenteis, pedunculis nutantibus. *Ad fl. Missuri.* Colla hort. ripul. t. 28.

pag. 489.

*triflorum* Roxb. ad El. *latifolium* L. pertinere Don. et Rich.

ft n. 4. *ferruginea* Rich. 11. E. foliis elliptico-oblongis acuminatis subcoriaceis subtus ferrugineo-lepidotis, pedunculis subternis axillaribus. *Java.*

*conferta* Roxb. — stylo stellatim piloso.

*arborea* Roxb. — foliis acuminatis, stylo glabro.

*umbellata* Thunb. — stylo glabro. *Nepal.*

pag. 491.

*Ad Hamamelida.*

*nensis* R. Br. 2. H. foliis subovatis integerrimis subtus reticulatis stellato-pubescentibus, capitulis pedunculatis. *China.* (Arbuscula sinensis Pluken. t. 368. f. 2. Abel. it. chin. p. 375.)

*Dicorypha Thuars.*

*ulacea* Thuars.

pag. 493.

*Ad Myricam.*

ft n. 5. *esculenta* Hamilt. 17. M. foliis spathulatis integerrimis coriaceis nitidis, amentis ♂ axillaribus racemosis, caule arboreo. *Nepal.*

† *octandra* Hamilt. 18. M. foliis oblongis apice attenuatis subintegerrimis glabris, amentis ♂ solitariis petiolo longioribus, floribus 8andris. *Nepal.*

pag. 495.

*Ad Ilicem.*

Post n. 12. *elliptica* Kunth. 30. I. foliis ellipticis apice serrulatis coriaceis glaberrimis supra nitidis, pedunculis 1floris ramulisque villosis, corollis 5-6petalis. *Peru.*

*Scopulorum* Kunth. 31. I. foliis obovatis rotundatis obsolete crenatis coriaceis glabris supra nitidis, pedunculis 5-7floris viscoso-pubescentibus, corollis 4-5petalis. *Peru.*

*rupicola* Kunth. 32. I. foliis subrotundo-ellipticis obtusis crenato serratis coriaceis glaberrimis nitidis, pedunculis sub-3floris glabris, corollis 4petalis. *Peru.*

*odorata* Don. 33. I. foliis oblongis crenulatis, umbellis sessilibus glomeratis petiolos aequantibus. *Nepal.*

*paraguaiensis* Hilar. 34. I. foliis spathulato-oblongis obtusiusculis remote serratis glaberrimis, pedunculis axillaribus multipartitis, stigmate 4lobo. *Brasil. Paraguay* (Caffine Gongonha Mart. Syst. 1. 939.)

*myricoides* Kunth. 35. I. foliis oblongis utrinque attenuatis serrulatis laevibus, pedunculis 3floris glabris, corolla 4petala. *Nov. Granat.*

pag. 496.

Post n. 25. *nepalensis* * 36. I. foliis subellipticis utrinque attenuatis integerrimis, umbellis globosis pedunculatis pubescentibus petiolo brevioribus. *Nepal.* (I. elliptica Don.)

I. *rotunda* Thunb. — floribus 5andris. *Nepal.*

*bumelioides* Kunth. 37. I. foliis obovatis mucronatis subintegerrimis glabris, pedunculis 1floris aggregatis. *Quito.*

pag. 497.

*Ad Goniocarpum* Thunb.

*salsoloides* Reichenb. 3. G. foliis linearibus glabris, floribus terminalibus aggregatis. *Nov. Holl.*

pag. 498.

*Ad Bulliardam* Cand.

*Sieberii* * 4. B. caule erecto ramoso, foliis linearibus ciliatis pedunculis brevissimis axillaribus aggregatis *Nov. Holl.* (Tillaea pedunculata Sieb.)

pag. 499.

*Ad Potamogetona.*

Post n. 8. *indicus* Roxb. 24. P. gracilis, foliis longe petiolatis lanceolatis acutis coriaceis, superioribus oppositis

tis, ſpicis pedunculatis remote verticillatis, pedunculis aequalibus. *Ind. or.*

oſt n. 19. *crenulatus* Don. 25. P. foliis lineari-lingulatis obtuſis crenulatis membranaceis 3nerviis ſeſſilibus, ſummis oppoſitis. *Nepal.*

pag. 500.

*Ad Ruppiam.*

. *maritima*, — vaginis latioribus, pedunculis 4floris, antherarum loculis oblongis, nuculis erecto-obliquis.

*ſtellata* Koch. 4. R. vaginis anguſtiſſimis, antherarum loculis ſubgloboſis, nuculis transverſe obliquis roſtellatis. *Ad oras maris baltici.* Reichenb. ic. t. 174.

*idyma* Sw. 5. R. vaginis ſupremis ampliatis, pedunculis incraſſatis ſubbifloris, nuculis roſtratis baſi connatis. *Inſ. Bartholom. e Carib.* Act. holm. 1825. p. 427.

---

# CLASSIS V.

pag. 505.

'oſt n. 631. *Aſpidoſperma* Mart. Cal. 5partitus. Cor. 5fida. Stam. tubo adnata breviſſima. Stylus clavatus. Folliculus compreſſus glaber.

*ouma* Aubl. Cal. 5fidus. Cor. infundibuliformis, laciniis anguſtis primum tortis. Stam. breviſſima, antheris ſagittatis. Diſcus hypogynus. Stigma 2fidum. Drupa 3-5pyrena. *Contortae.*

'oſt n. 634. *Mitreola* Rich. Cal. 5partitus perſiſtens. Cor. urceolata. Stam. incluſa. Stigma indiviſum. Capſ. 2locularis, loculis polyſpermis, placentis internis. *Gentianeae.* *Ophiorrhiza* melius collocatur p. 514. poſt n. 778.

pag. 506.

*ubiana* R. et P. Cal. 5fidus, dele *tubum cor. longiſſimum.*

'oſt n. 653. **Sibthorpia.* Cal. turbinatus 5fidus. Cor. ſubrotata. Antherae 2loculares. Stigma peltatum. Capſ. compreſſa 2locularis, placenta centrali. *Scrofularinae.*

pag. 508.

'oſt n. 683. *Beaumontia* Wallich. Cal. 5ſepalus. Cor. ventricoſa campanulata, limbo 5lobo. Antherae ſagittatae. Squamae hypogynae 0. Germen ſimplex.

pag. 523.

Poſt n. 927. *Guillemiñea* Kunth. Cal. campanulatus 5fidus 3bracteatus. Stam. 5 brevia tubo inſerta. Antherae 1loculares. Stigma emarginatum. Capſ. 1ſperma, calyce tecta.

Poſt n. 931. *Pfaffia* Mart. Char. Gomphrenae, praeter ſtigma ſimplex capitatum ſeſſile.

*Mogiphanes* Mart. Cal. 5ſepalus 2bracteatus, ſtipitatus baſi 5glandulosus, ſtipitulo demum articulato. Tubus cylindricus antheras 1loculares, interjectis ſquamulis, gerens. Styl. 1. Stigma capitatum. *Utriculus evalvis 1ſpermus.*

*Hoplotheca* Nutt. Cal. 1phyllus 5fidus 2bracteatus demum dureſcens. Tubus cylindricus ſtaminifer. Antherae 1loculares. Stigma penicillatum capitatum. Utriculus 1ſpermus calyce indurato clauſus.

Poſt n. 934. *Bouſſingaultia* Humb. Cal. membranaceus perſiſtens, limbo duplici, ext. 2-, inter. 5partito. Stam. baſi calycis inſerta. Antherae 2loculares poſticae. Stylus 1. Stigma 3lobum. Utriculus 1ſpermus ſtylo coronatus.

Poſt n. 939. *Licania* Aubl. Cal. turbinatus 5fidus baſi 2bracteatus. Stam. annulo calycis interno inſidentia ejusque laciniis oppoſita. Stylus incurvus, ſtigmate ſimplici. Drupa 1ſperma. *Roſaceae?*

pag. 525.

n. 968. *Heurniam* ſcribo, non Huerniam, cum Juſti Heurnii, collectoris Batavi in Africa auſtrali, *nomen gerat.* Juſtus Heurnius, paſtor ac medicus, pictor plantarum capenſium, frater Othonis, prof. Leidenſis, et filius Joannis, celeberrimi auctoris. Inclitum nomen, quod inſcitia ſola deformare poteſt! Stapel. ad Theophr. p. 333. Hermann. hort. lugd. bat. p. 54.

pag. 526.

Poſt n. 990. *Ditaſſa* R. Br. Cor. ſubrotata 5partita. Corona duplex, ext. 5partita, inter 5phylla exteriori oppoſita. Antherae membrana terminatae.

pag. 527.

n. 996. *Oxypetalum* R. Br. add. Retinacula maſſarum pollinis ſurſum in appendiculam et dentes ſubulatos abeuntia.

Poſt n. 999. *Phyſianthus* Mart. Cor. campanulata baſi ventricoſa. Corona 5phylla ſublibera carnoſa, foliolis extrorſum apice cucullatis. Stigmata apiculata exſerta.

n. 1001. *Gentiana*, leg. *Cal.* campanulatus.

Poſt n. 1005. *Neuropeltis* Wallich. Cal. 5ſepalus perſiſtens. Cor. infundibuliformis 5fida. Stigmata reniformia. Capſ. 1ſperma bractea dilatata ſuffulta. *Convolvuleae.*

pag. 528.

n. 1014. deleatur *Banffya* Baumg. Est enim Gypsophilae species, vol. 2. p. 373.

Post n. 1018. *Meniscosta* Blum. Flores polygami. Cal. 4-5fidus. Pet. 4, 5 biserialia. Stam. lata petalis opposita. Discus 5dentatus perigynus. Stigm. 2. Baccae didymae 1spermae. *Menispermeis affinis.*

Post n. 1023. *Dulongia* Kunth. Cal. 5dentatus. Pet. 5. Discus orbicularis germen obtegens. Stam. cum petalis alterna, cum iisdem sub ambitu disci inserta. Antherae 2loculares. *Stylus* 0. *Stigmata* 2. Bacca semibilocularis, calyce petalis staminibusque coronata, loculis 2-3spermis. *Rhamneae.*

pag. 533.

Post n. 1117. *Merckia* Fisch. Cal. 5sepalus. Pet. integra. Stam. basi libera. Caps. inflata umbilicata sulcata basi 3locularis 3valvis. Semina pyriformia. *Caryophylleae.*

pag. 534.

Post n. 1140. *Eurycoma* Jack. Flores polygami. Cal. 5partitus. Pet. 5 glanduloso-pilosa. Glandulae 10 geminae inter stamina. Fructus 5 1spermi basi coaliti. *Terebinthaceae.*

Post n. 1141. *Galipea* Aubl. Cal. 5fidus. Pet. 5 linearia villosa conglutinata. Stam. 5, quorum 2-4 saepe abortiunt. Antherae basi 2lobae. Styli 5 subcoaliti. Cocci 5 2valves. *Rutaceae.*

---

pag. 536.

*Ad Tricratum* Herit.

*arenarius* * 3. Tr. foliis cordatis orbicularibus carnosis, involucro persistente, staminibus inclusis, lobis limbi repando-undulatis. *California.* (Abronia Hook. exot. fl. t. 193.)

pag. 538.

*Ad Cerinthen.*

*alpina* Kit. 6. C. caule ramoso, foliis cordato-ovatis integerrimis glabris, corollis 5dentatis, dentibus revolutis, antheris filamenta longitudine superantibus. *Ad Danubium. Hungar.* (C. 5-maculata Wahlenb. carpath., suevica Martens.)

pag. 539.

*Heliotropium viridiflorum* Lehm. deleatur, rediturum sub Tournefortia.

Ad H. *linifolium* Lehm. (H. compactum Don., brevifolium Wall.)

pag. 572.

*Ad Lyſimachiam.*

Poſt n. 17. *alternifolia* Wallich. 25. L. caule erecto 4gono foliisque alternis petiolatis oblongis utrinque attenuatis pubeſcentibus, pedunculis capillaribus elongatis, calycibus corollam ſuperantibus. *Nepal.* (L. evalvis Wall., tetragona Don.)

*pyramidalis* Wallich. 26. L. caule erecto tereti, foliis oppoſitis, inferioribus ovato-lanceolatis ſuperioribus linearibus, pedunculis axillaribus abbreviatis, calycibus corollam ſuperantibus. *Nepal.* (L. heterophylla Don.)

Ad L. *japonicam* Thunb. (L. debilis Wallich.) *Nepal.*

pag. 573.

*Ad Dodecatheon.*

*frigidum* Chamiſſ. Ledeb. 3. D. foliis ſubſpathulatis repando-dentatis, umbellis paucifloris, pedunculis divaricatis glandulofis, bracteis ſubulatis, antheris ſubſeſſilibus. *Ora occid. Amer. arctic.*

pag. 574.

*Ad Primulam.*

Pr. *denticulata* Sm. patriam habet *Nepalam* Don. fl. nepal. p. 79., non Africam.

pag. 575.

Poſt n. 24. *altiſſima* Don. 52. Pr. foliis cordato-oblongis obtuſis inaequaliter dentatis rugoſis, petiolis longiſſimis ſimplicibus, umbella multiflora, foliolis involucri dentatis, lobis corollae obcordatis. *Emod montes.* (Pr. reticulata Wallich.)

*ſpecioſa* Don. 53. Pr. foliis ſubcordato-oblongis obtuſis eroſo-dentatis reticulato-venoſis, petiolis praelongis dilatatis, umbella multiflora, foliolis involucr lanceolatis integerrimis, laciniis calycis ellipticis, corollae oblongis 2fidis. *Emodi montes.*

Poſt n. 27. *rotundifolia* Wallich. 54. Pr. foliis cordato-ſubrotundis groſſe ſerratis ſubtus farinoſis, petiolis longiſſimis aequalibus, umbella pauciflora, lobis corollae rotundatis integerrimis. *Emodi montes.*

*macrophylla* Don. 55. Pr. foliis oblongis argute ſerrulatis mucronatis ſupra glabris ſubtus farinoſis, umbella pauciflora lobis corollae obcordatis. *Emodi montes.*

*Stuartii* Wallich. 56. Pr. foliis lanceolatis acutis ſerratis glabris ſubtus ſubtiliter farinoſis, umbella pauciflora, lobis corollae 4dentatis. *Emodi montes.*

*longifolia* Curt. n. 32. Pr. foliis oblongis obtuſis denticulatis glaberrimis, umbella erecta multiflora, involucri polyphyllis ſubulatis reflexis, laciniis calycis linearibus tubum corollae aequantibus. *Caucaſ.*

*nivalis* Pall. 57. Pr. foliis ſpathulato-lanceolatis repando-dentatis glabris, umbella multiflora erecta, folioli

involucri lanceolatis basi subconnatis, laciniis calycis lanceolatis tubo corollae brevioribus. *Sibir.*

pag. 576.

Ad Pr. *sibiricam* Jacqu. (Pr. intermedia Ledeb.)

Post n. 45. *angustifolia* Torr. 58. Pr. foliis subspathulato-oblongis integerrimis membranaceis glabris eveniis, scapo 1floro, laciniis calycis subulatis, lobis corollae rotundatis integerrimis. *Montes scopulosi Amer. bor.* Ann. of the Lyc. of New-York, 1. t. 3. f. 3.

pag. 577.

Post n. 49. *tridentata* Don. 59. Pr. foliis radicalibus obovatis longe petiolatis eroso-dentatis glabris reticulato-rugosis, scapo 1floro foliis breviori, laciniis corollae acute 3dentatis. *Nepal.* (Pr. petiolaris et nana Wallich.)

*Ad Androsacen.*

Post n. 1. *primulina* * 27. A. foliis lanceolatis acutis pinnatifido-serratis utrinque scapoque pubescentibus, umbella 3flora, laciniis calycis obtusis, fauce corollae barbata, lobis 2fidis. *Nepal.* (A. primuloides Don., pusilla Wallich.)

pag. 578.

Post n. 14. *carinata* Torr. 28. A. foliis congestis ovato-lanceolatis acutis carinatis ciliatis, scapo villoso, umbella pauciflora, calycibus obtusis corolla brevioribus. *Montes scopulosi Amer. bor.* Ann. of the Lyc. of New-York, 1. t. 3. f. 1.

Post n. 16. *sarmentosa* Wallich. 29. A. sarmentis elongatis radicantibus, foliis aggregatis spathulatis mucronatis integerrimis villosissimis, umbella multiflora, lobis corollae integerrimis. *Emodi montes.* (A. lanuginosa Wallich.)

Ad A. *rotundifoliam* Sm. (A. incisa Wallich.)

Post n. 20. *arctica* Chamiss. 30. A. foliis oblongis rigidis margine revolutis supra dense furcato-pubescentibus subtus glaberrimis, pedunculis folia aequantibus, calycibus glaberrimis. *Ora occid. Amer. arctic.*

pag. 579.

*Ad Erythraeam.*

deleantur E. *compressa* Heyn., *litoralis* Fries n. 3. et 5. quae pertinent ad E. *linarifoliam* Pers. n. 10., cujus melior character hic est: E. caule apice ramoso, foliis radicalibus spathulatis, caulinis linearibus, floribus terminalibus aggregatis. *German. Anglia. Gallia. Suecia.* (E. conferta Pers., uliginosa Kit., aggregata Thouin., litoralis Fries., compressa Hayn., angustifolia Wallr.)

pag. 589.

*Ad Chironiam.*

*centauroides* Roxb. 9. Ch. caule 4gono dichotomo, foliis oblongis 3nei viis, calycibus subsolitariis carinatis, stigmat 2lobo. *Bengal.*

*Ad Hippion* *.

*controversum* * 4. H. caule simplicissimo stricto tereti, foliis vei ticillatis sessilibus reflexis ovato-oblongis acut: 3nerviis, floribus corymboso-paniculatis. *Bra fil.* Sello. (Sabbatia verticillata Syst. veg. 1 p. 580. Curtia gentianoides Schlechtend. Linnae p. 210.)

pag. 590.

*Ad Convolvulum.*

Ad C. *pentaphyllum.* (C. hirsutus Roxb.)
Ad C. *pendulum* * (C. pedatus Roxb.)

pag. 591.

Ad C. *tenuifolium* Vahl. (C. digitatus Roxb.)

pag. 594.

Ad C. *acuminatum* Vahl. varietas: C. *pudibundus* Lindl. in Bot. reg 999.

Post n. 60. *bignonioides* * 336. C. radice tuberosa, foliis 3lobi dentatis, lobis posticis sibi incumbentibus, pe dunculis sub-3floris pendulis petiolo brevioribus laciniis calycis subaequalibus obtusiusculis, limb corollae infundibuliformis crispato. *Cayenna* (Ipomoea Bot. mag. 2645.)

pag. 596.

Post n. 92. *gangeticus* Roxb. 337. C. foliis cordato-subrotundi obtusis subtus villosis punctatis parallele venosis pedunculis axillaribus petiolo brevioribus, laci niis calycis reniformibus demum auctis, germi nibus 4locularibus. *Ind. or.*

pag. 597.

Ad C. *latiflorum* Desr. (Ipomoea noctiluca Herb. ad Bot. reg 917.)

pag. 598.

Post n. 117. *semidigynus* Roxb. 338. C. foliis cordato-ovatis acutis villosis, pedunculis petiolo brevioribus, corolla extus pubescente. *Ind. orient.*

Post n. 119. *Hardwickii* * 339. C. foliis cordatis acutis subpubescentibus, pedunculis 2-3floris demum nutantibus, laciniis calycis exterioribus sagittatis ciliatis tubum gibbum corollae aequantibus. *Ind. or.* (C. calycinus Roxb.)

pag. 599.

Ad C. *coccineum* * (Ipomoea phoenicea Roxb.)

pag. 600.

Post n. 139. *Hamiltonii* * 340. C. foliis cordatis cuspidatis pubescentibus, pedunculis multifloris folia superantibus, laciniis calycis acutis pilosis. *Nepal.* (Ipomoea cuspidata Don.)
Post n. 145. *pileatus* * 341. C. foliis profunde cordatis villosis, involucro 4angulari peltato 4-6floro. *China.* (Ipomoea pileata Roxb.)
Ad C. *hispidum* Vahl. (C. pilosus Roxb.)

pag. 601.

Ad C. *repandum* Desr. (C. blandus Roxb.)

pag. 603.

Post n. 191. *davuricus* Sims. 342. C. foliis sagittato-cordatis oblongis subtus pedunculisque 1floris tomentosis, bracteis late ovatis acutis (floribus roseis). *Sibir.* Bot. mag. 2609.

pag. 604.

Post n. 206. *Malcolmii* Roxb. 343. C. foliis sagittatis glabris, auriculis angulato-dentatis, pedunculis petiolos superantibus clavatis, laciniis calycis ovatis. *Persia.*

pag. 605.

Post n. 221. *sphaerocephalus* Roxb. 344. C. foliis sagittato-cordatis oblongis utrinque villosis, capitulis axillaribus sessilibus (floribus parvis purpureis). *Ind. or. Nepal.* (C. atropurpureus Wall., Ipomoea sphaerocephala Don.)

pag. 606.

Ad C. *Kleinii* * (C. laurifolius Roxb. fl. ind. 2. p. 50.)
Post n. 233. *Rottleri* * 345. C. foliis ovatis acutis longe petiolatis parallele venosis subpubescentibus, pedunculis multifloris, bracteis lanceolatis calyces superantibus. *Ind. or.*

pag. 608.

Post n. 255. *stipulaceus* Roxb. 346. C. foliis cordato-sagittatis mucronatis glabris, auriculis repandis, pedunculis multifloris petiolos aequantibus, calycibus glabris, lobis corollae obcordatis. *Ind. or.*
*pentagonus* Roxb. 347. C. ramis 5gonis, foliis cordato-sagittatis villosis, auriculis subangulatis, pedunculis umbelliferis rigidis, calycibus glabris. *Ins. Molucc.*
Post n. 257. *Wallichianus* * 348. C. caule prostrato, foliis hastato-trilobis obtusis utrinque glabris, auriculis

emarginatis, pedunculis 1floris elongatis, brac teis cordatis calyces superantibus. *Nepal.* (Calystegia hederacea Wallich.)

*Clappertonii* * 349. C. caule repente, foliis sagittatis glaberrimis auriculis acutiusculis integerrimis, pedunculis 1floris. *Afric. med.* (Ipomoea R. Br. ad Denham. it. p. 240.)

Ad C. *Beladambu* * (C. flagelliformis Roxb. fl. ind. 2. p. 68.).

pag. 609.

Ad C. *ebracteatum* Desr. adde patriam: *Rio grande do Sul Amer. austr.* Sello.

Ad C. *rugosum* W. (C. reniformis Roxb.)

Ad C. *Pedem Caprae.* (C. bilobatus Roxb.)

pag. 610.

Post n. 285. *Rheedii* Wallich. 350. C. foliis oblongo-lanceolatis acutiusculis, pedunculis sub-3floris folia aequantibus, laciniis calycis exterioribus cordatis scariosis interiores occultantibus. *Nepal. Ind. or.* (Ben-tiru-tali Rheed. mal. 2. t. 54.)

*caespitosus* Roxb. 351. C. foliis lineari-lanceolatis glabris, pedunculis petiolos superantibus bracteatis 1-4floris calycibus glabris margine callosis. *Ind. or.*

pag. 614.

Ad *Poranam racemosam* Jacqu. adde patriam: *Ind. or. Nepal.*

*grandiflora* Wall. 5. P. volubilis pilosa, foliis cordato-ovatis acuminatis 7nerviis, racemis axillaribus paucifloris corolla calycem multo superante. *Nepal.*

pag. 615.

Ad *Nierembergiam pubescentem* * (N. viscidula Kunth., graveolens Hilar.)

*Ad Fabianam* R. et P.

*thymifolia* Hilar. 2. F. suffruticosa glanduloso-pubescens, foliis sparsis linearibus obtusiusculis enerviis, floribus axillaribus solitariis pedunculatis nutantibus. *Rio grande Amer. austr.*

pag. 616.

*Ad Nicotianam.*

Post n. 7. *plumbaginifolia* W. 18. N. caule herbaceo diffuse ramoso tuberculato-aspero, foliis sessilibus, inferioribus obovatis, superioribus semiamplexicaulibus lanceolatis undulatis, corollae tubo longissimo, limbo acutiusculo. *Rio grande.* (N. acutifolia Hilar.)

pag. 617.

Post n. 18. *nana* Lindl. 19. N. acaulis humillima, foliis lanceolatis integerrimis pilosis, pedunculis solitarii

axillaribus 1floris abbreviatis, calyce inflato viſcidulo tubum corollae aequante, limbo corollae obſolete 5lobo, lobis acutiusculis. *Montes ſcopuloſi Amer. bor.* Bot. reg. 883.

Poſt *Lehmanniam*:

SIBTHORPIA.

*retuſa* Kunth. 1. S. foliis cordato-reniformibus lobatis, lobis retuſis, floribus 5andris. *Nov. Hiſpania.* Syſt. 2. p. 815.

*europaea* 2. S. foliis peltatis cordato-reniformibus lobato-crenatis, floribus 4andris. *Anglia. Luſitania.* Syſt. 2. p. 815.

*pichinchenſis* Kunth. 3. S. foliis cordatis ſub-7lobis, floribus 5andris. *Alp. Quito.* Syſt. 2. p. 815.

*peregrina* 4. S. foliis reniformibus orbiculatis crenatis, floribus 7andris. *Mauritania. Madera.* (Disandra proſtrata L. Syſt. 2. p. 166.)

pag. 618.

*Ad Verbaſcum.*

V. *thapſiforme* et *cuſpidatum* Schrad. ſpecie congruunt. Sed V. *nemoroſum* et *auſtrale* Schrad. potius varr. *phlomoidis* L.

Poſt n. 5. *candidiſſimum* Cand. 49. V. foliis oblongis utrinque attenuatis crenatis denſiſſime candide flocoſo-tomentoſis, inferioribus petiolatis, ſuperioribus decurrentibus, floribus remote verticillato-ſpicatis. *Ager monspel.*

pag. 619.

Ad V. *Lychnitidem*, V. *Weldenii* Morett. var.

pag. 621.

De V. *cisalpino* Birol., var. V. *phoenicei*, cf. Colla in act. acad. taurin. vol. 26. p. 507.

pag. 623.

*Ad Cryptandram* Sm.

*auſtralis* Sm. 2. Cr. foliis faſciculatis petiolatis lineari-filiformibus ramisque ſcabris, floribus capitatis extus ſetoſo-plumoſis. *Nov. Holl.* Sieb. n. 66.

*amara* Sm. 3. Cr. foliis confertis alternis minutis ſpathulato-ellipticis ſubſeſſilibus, floribus faſciculatis extus incanis. *Nov. Holl.* Sieb. n. 67.

*obovata* Sieb. 4. Cr. foliis ſparſis obovato-ſpathulatis petiolatis glabriusculis, ramis ſetoſo-ramentoſis, floribus aggregatis glabris. *Nov. Holl.* Sieb. n. 129.

*spineſcens* Sieb. 5. Cr. foliis confertis obovatis glabris, ramulis ſetoſis ſpineſcentibus, floribus ſubſolitariis incano-pubeſcentibus. *Nov. Holl.* Sieb. n. 68.

pag. 625.

*Ad Cantuam* Juss.

*megapotamica* *8. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glaberrimis integerrimis supra nitidis, paniculis axillaribus. *Rio grande.* Sello.

pag. 626.

*Ad Cobaeam* Cav.

*lutea* Don. 2. C. foliolis oblongis acutis, laciniis calycis lineari-lanceolatis mucronatis, staminibus longe exsertis. *Guayaquil.*

pag. 629.

*Ad Epacrin* Forst.

*ruscifolia* R. Br. 22. E. foliis subcordato-ovatis acuminatis petiolatis, ramulis hirsutis, floribus sparsis pendulis, tubo corollae calycem bis superante. *Nov. Holl.*

*sparsa* R. Br. 23. E. foliis oblongo-lanceolatis mucronatis petiolatis eveniis, floribus sparsis nutantibus, tubo corollae calycem acutum subaequante. *Nov. Holl.*

*rivularis* Sieb. 24. E. foliis subsessilibus ovatis acuminatis reflexo-patentibus, calycibus acutis corollam subaequantibus. *Nov. Holl.*

*rigida* Sieb. 25. E. foliis ovato-oblongis obtusiusculis subsessilibus cartilagineis subtus carinatis patulis, calycibus obtusis tubum corollae aequantibus. *Nov. Holl.*

pag. 630.

*Ad Lysinema* R. Br.

L. *pungens* R. Br. habet folia amplexicaulia. Proximum est:

*ruscifolium* Sieb. 6. L. foliis semiamplexicaulibus ovato-oblongis cuspidatis ciliatis laevibus, calyce subulato tubum corollae aequante. *Nov. Holl.*

L. *pentapetalum* R. Br. habet folia 3gona obtusa glabra.

pag. 631.

*Ad Echitem.*

E. *longiflora* Desf. habet caulem erectum, non sarmentosum. Proximae sunt *suffruticosae erectae, corollae longissimae tomentosae limbo crispato:*

*petraea* Hilar. 53. E. foliis cordato-linearibus acutis undulatis revolutis subtus incano-tomentosis, pedunculis axillaribus. *Ad fl. Platam.*

*Velame* Hilar. 54. E. foliis ovato-oblongis cuspidatis lanatis. *Brasil.* (E. guaranitica Hilar.)

*virescens* Hilar. 55. E. hirsuta, foliis ovato-oblongis acutis subtus tomentosis. *Brasil.*

*pinifolia* Hilar. 56. E. hispida, foliis quaternis linearibus revolutis subtus incano-tomentosis. *Brasil.*

pag. 633.

Post n. 39. *nutans* Anders. 57. E. foliis oblongis utrinque attenuatis subtus rubro-venosis villosis, pedunculis nutantibus, corollae laciniis obtusis crispatis. *Ins. Carib.* Bot. mag. 2473.

pag. 634.

Deleatur E. *grandiflora* Roxb.

pag. 635.

*Ad Vallarim* R. Br.

† *controversa* * 3. V. caule volubili, foliis cordatis acuminatis 5nerviis, corymbis axillaribus subcapitatis. *Ind. or.* (Convolvulus binectariferus Wallich. in Roxb. fl. ind. 2. p. 47.)

Post *Ichnocarpum* R. Br.:

BEAUMONTIA Wallich.

*grandiflora* Wall. *Ind. or.* Frutex scandens, ramulis pubescentibus, foliis elliptico-oblongis mucronatis coriaceis glabris, floribus corymbosis amplis albis. (Echites grandiflora Roxb.) Bot. reg. 911.

pag. 636.

*Ad Thenardiam* Kunth.

*scabra* * 3. Th. foliis ovato-ellipticis undulatis subtus glaucescentibus, cymis pedunculatis axillaribus 3fidis, corolla extus scabro-pubescente. *Nov. Caledon.* (Echites scabra Labill. nov. Caled. t. 31.)

*Ad Alstoniam* R. Br.

Ad A. *scholarem* R. Br. (A. plumosa Labill. nov. Caled. t. 32.)

*neriifolia* Wallich. 5. A. foliis verticillatis lanceolatis acuminatis parallele venosis subtus villosis, cymis terminalibus sessilibus pubescentibus, fauce villosa, limbi laciniis acutis tubo brevioribus. *Nepal.*

*lucida* Don. 6. A. foliis oppositis oblongis acuminatis glabris lucidis reticulatis, cymis terminalibus pedunculatis trichotomis, fauce barbata, limbi laciniis obtusis tubum aequantibus. *Nepal.*

pag. 638.

*Wrightia tinctoria* R. Br. habet folia glaberrima. (Nerium tinctorium Roxb. non Rottl.)

Ad *Vincam majorem* L. V. media Delil., foliis laciniisque calycis haud ciliatis, ceterum non diversa.

Ad *Tabernaemontanam macrophyllam* Poir. T. cestrifolia Nees. Mart. var.

pag. 642.

Ad *Cerberam Odallam* Hamilt. (Ochrosia elliptica Labill. nov. Caled. t. 80.)

pag. 645.

*Ad Tournefortiam.*

Post n. 27. *megapotamica* * 55. T. foliis oblongis obtusis glabris medio dentatis subtus flavicantibus, spicis axillaribus elongatis, calycibus verticillatis hirsutis. *Rio grande.* Sello.

*viridiflora* Wall. 56. T. foliis petiolatis ovatis acutis integerrimis subtus villosis, spicis compositis dichotomis recurvis. *Ind. orient.* (Heliotropium viridiflorum Lehm., Lithospermum Roxb.)

pag. 647.

*Ad Beureriam* Jacqu.

*cestroides* * 4. B. foliis oppositis lineari-lanceolatis integerrimis glabris, racemis paniculatis. *Amer. austr.* (Freylinia cestroides Coll.)

*Ad Ehretiam.*

Post n. 4. *pyrifolia* Don. 23. E. foliis ovatis acutis serratis glabris, floralibus oblongis, panicula terminali, floribus confertis. *Nepal.* (E. serrata Roxb.)

*umbellulata* Wallich. 24. E. arborea, foliis ovatis subretusis undulatis glaberrimis, umbellis sparsis pubescentibus, corolla subrotata, laciniis recurvis. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 648.

Post n. 18. *macrophylla* Wallich. 25. E. arborea, ramis verrucosis, foliis ovato-oblongis argute serratis supra hispidulis subtus pubescentibus, panicula terminali. *Nepal.*

*setosa* Roxb. 26. E. foliis cordato-ovatis setoso-hispidis, spicis secundis recurvis dichotomis paniculatis. *Ins. ad Ind. orient.*

*uniflora* Roxb. 27. E. fruticosa, foliis subsessilibus oblongis integerrimis pilosis, floribus solitariis subsessilibus. *Ins. Molucc.*

pag. 650.

*Ad Cordiam.*

Post n. 16. *Muñeco* Kunth. 73. C. foliis cordato-elliptico-oblongis obtusiusculis remote dentatis supra strigillosis subtus fusco-villoso-tomentosis, cymis subaxillaribus subdichotomis divaricatis, floribus spicato-glomeratis, calycibus fusco-tomentosis. *Ad fl. Magdalen.*

Post n. 20. *acuminata* Wallich. 74. C. arborea glaberrima, foliis ovato-oblongis acutis coriaceis integerrimis, co-

rymbis dichotomis fubpubefcentibus, laciniis calycis lanceolatis ciliatis tubo corollae brevioribus. *Ind. or.*

pag. 655.

*Styphelia triandra* Andr. habet folia ftriata cufpidata.
St. *amplexicaulis* Rudg. — folia longe ciliata.

pag. 657.

Ad *Styphcliam obovatam* Labill. (Cyathodes Tameiameiae Chamiff.) *Inf. Sandwich.*

Poft n. 43. *Cymbula* * 72. St. foliis petiolatis congeftis lanceolatis concavis rufis, fpicis axillaribus confertis erectis, bracteis ciliatis. *Nov. Caledon.* (Leucopogon Cymbulae Labill. nov. Caled. t. 39.)

pag. 658.

Poft n. 46. *glaucefcens* Sieb. 73. St. foliis lanceolatis mucronatis integerrimis laevibus fubtiliter ftriatis glaucis, pedunculis abbreviatis 1floris. *Nov. Holl.*

*faftigiata* * 74. St. foliis lanceolatis cufpidatis apice ferrulatis erectis ftriatis, calycibus axillaribus fubfolitariis glaberrimis. *Nov. Holl.* (Leucopogon faftigiatus Sieb.)

*malaica* * 75. St. foliis lanceolatis acutis integerrimis fubtus glaucis punctatis, ftipulis axillaribus erectis. *Peninfula Malacc.* (Leucopogon malayanus. Malayan mifcell. 1.)

Poft n. 59. *denudata* * 76. St. foliis linearibus acutis erectis glabris integerrimis, floribus terminalibus aggregatis. *Nov. Holl.* (Leucopogon denudatus Sieb.)

pag. 660.

*Ad Nolanam.*

*paradoxa* Lindl. 6. N. caule proftrato foliisque ovatis obtufis petiolatis hirfutis, limbo corollae 10lobo, nuculis cumulatis 1fpermis. *Chili.* Bot. reg. 862.

pag. 662.

*Ad Ardifiam* Sw.

A. *revoluta* Bonpl. (A. multiflora W. herb.)

Poft n. 14. *propinqua* Kunth. 25. A. ramulis teretiusculis verrucofis, foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis integerrimis membranaceis glabris obfolete glandulofo-punctatis, racemis terminalibus folitariis fimplicibus, fructibus pedicellatis. *Ad Orinocum.*

*ceftrifolia* Kunth. 26. A. ramis fubangulatis, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis membranaceis glabris epunctatis, paniculis axillaribus terminalibusque feffilibus, floribus racemofis 4-5andris. *Alp. nov. Granat.*

*durifolia* Kunth. 27. A. ramis teretibus, foliis obovato-oblongis obtusis integerrimis coriaceis glabris subtus corymbisque terminalibus lepidotis, floribus 5andris. *Alp. nov. Granat.*

*glandulosa* Roxb. 28. A. foliis lanceolatis margine coloratis glandulosis glabris, umbellis terminalibus globosis longe pedunculatis. *Silhet, prov. Ind. or.*

*pauciflora* Heyn. 29. A. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis glabris, pedunculis lateralibus filiformibus 2-3floris. *Ind. or.*

*anceps* Wallich. 30. A. ramis scandentibus ancipitibus, foliis lanceolatis acuminatis integerrimis coriaceis subtus reticulato-venosis, paniculis terminalibus, pedunculis complanatis glabris. *Silhet, provinc. Ind. or.*

*complanata* Wallich. 31. A. ramis subscandentibus teretibus, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis subtus reticulato-venosis, paniculae ramis flexuoso-divaricatis complanatis villosis. *Ins. freti Malacc.*

*tuberculata* Wallich. 32. A. ramis compressis, foliis obovato-oblongis integerrimis coriaceis nitidis glanduloso-punctatis, racemis paniculatis foliosis, ramis teretibus tuberculosis. *Ind. or.*

Post n. 18. *punctata* Lindl. 33. A. foliis lanceolatis basi attenuatis coriaceis glanduloso-subcrenatis glabris, umbellis pedunculatis axillaribus pubescentibus, floribus cernuis punctatis. *China. Nepal.* Bot. reg. 827. (A. macrocarpa Wallich.) A. pedunculosa Wall. var.

*villosa* Roxb. 34. A. foliis lanceolatis crenulatis subtus ramisque villosis, umbellis terminalibus compositis villosissimis. *Ins. freti Malacc.*

*hymenandra* Wallich. 35. A. foliis obovatis acutis grosse crenatis glabris subtus reticulato-venosis, corymbis lateralibus foliatis, laciniis corollae acuminatis elongatis, antheris alatis apice caudatis in tubum coalitis. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 663.

*Ad Myrsinem.*

†*Potama* Don. 27. M. foliis ellipticis mucronulatis serrulatis glabris nitidis; petiolis ramulisque pubescentibus, umbellis sessilibus, floribus 4fidis dioecis. *Nepal.* (M. bifaria Wallich.)

†*sessilis* Don. 28. M. foliis oblongis acuminatis nitidis apice denticulatis, umbellis sessilibus, floribus ☿ 4fidis, stigmate 2lobo. *Nepal.*

†*subspinosa* Don. 29. M. foliis lanceolatis acuminatis rigidis glabris spinuloso-serrulatis, umbellis sessilibus pubescentibus, floribus dioecis. *Nepal.*

*semiserrata* Wallich. 30. M. arborea, foliis confertis lanceolatis attenuatis antice argute serratis resinoso-punctatis, fasciculis pedunculatis, stigmate dimidiato laciniato-fimbriato. *Nepal.*

*capitellata* Wallich. 31. M. arborea, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis coriaceis, capitulis axillaribus ſeſſilibus, ſtigmate ſubintegro. *Nepal.*

*pachyandra* Wallich. 32. M. arborea, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis laevibus, faſciculis axillaribus aggregatis glanduloſis, antheris triangularibus craſſis. *Inſ. freti Malacc.*

*aurantiaca* Wallich. 33. M. fruticoſa ſcandens glabra, foliis ovato-lanceolatis acutis integerrimis coriaceis ſupra nitidis, racemis axillaribus petiolos aequantibus, filamentis longiſſimis. *Ind. or.*

pag. 664.

Poſt *Myrſinem*:

## EMBELIA Burm. Don.

*floribunda* Wallich. 1. E. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, racemis compoſitis, corollis revolutis glanduloſo-pubeſcentibus. *Nepal.* (E. eſculenta Don.)

*Naguſhia* Don. 2. E foliis ellipticis crenulatis, racemis ſimplicibus, corollis concavis glabris. *Nepal.* (Myrſine undulata Wallich.?)

*Ribes* Burm. 3. E, fruticoſa ſcandens, foliis alternis petiolatis oblongis obtuſis, racemis paniculatis terminalibus hirſutis, corollis concavis piloſis. *Ind. or.* N. L. Burm. fl. ind. t. 23.

*robuſta* Roxb. 4. E. arborea, foliis ovali-oblongis integerrimis glabris, racemis axillaribus ſolitariis, corollis patulo-reflexis villoſis. *Ind. or.*

*veſtita* Roxb. 5. E. fruticoſa ſcandens, foliis oblongo-lanceolatis ſubſerrulatis, racemis axillaribus. *Ind. orient.*

*villoſa* Wallich. 6. E. fruticoſa ſcandens, ramis calloſo-maculatis villoſis, foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis ſubtus piloſiuſculis, racemis axillaribus faſciculatis. *Ind. or.*

*nutans* Wallich. 7. E. fruticoſa, ramis pendulis, foliis ſubbifariam approximatis lanceolatis acuminatis undulatis nitidis, racemis axillaribus abbreviatis faſciculatis. *Silhet, prov. Ind. or.*

*caneſcens* Jack. 8. E. fruticoſa ſcandens villoſa, foliis ſubcordato-oblongis acuminatis ſubtus piloſiuſculis, petiolis ſulcatis margine glanduloſo-criſpatis, racemis paniculatis hirſutis, corollis villoſis. *Inſ. freti Malacc.*

pag. 665.

Poſt *Bumeliam*:

## HUNTERIA Roxb.

*corymboſa* Roxb. *Inſ. freti Malacc.* Arbor, foliis oppoſitis oblongis integerrimis glabris, corymbis terminalibus, floribus albis.

pag. 666.

*Ad Sideroxylon.*

Poſt n. 9. *grandifolium* Wallich. 10. S. foliis obovato-ellipticis coriaceis glabris integerrimis, pedunculis axillaribus confertis pubeſcentibus baſi ſquamatis, laciniis corollae obtuſis. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 667.

*Ad Chryſophyllum.*

Poſt n. 14. *acuminatum* Roxb. 15. Chr. foliis lanceolatis acuminatis glaberrimis, pedunculis axillaribus 1floris recurvis. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 669.

*Ad Paederiam.*

*recurva* Roxb. 6. P. erecta, foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, corymbis terminalibus recurvis brachiatis villoſis. *Ind. or.*

*Roxburghii* * 7. P. erecta, foliis ſubſeſſilibus oblongis integerrimis glabris parallele venoſis, paniculis e dichotomia erectis. *Silhet, prov. Ind. or.* (P. erecta Roxb.)

*ternata* Wallich. 8. P. erecta, ramis trichotomis, foliis ternatis oblongo-lanceolatis integerrimis ſupra nitidis, pedunculis corymbiferis ramulisque triangularibus. *Ind. or.*

pag. 670.

*Ad Leeam.*

*robuſta* Roxb. Blum. 6. L. caule tereti 1ſulcato glabro, foliis bipinnatis acuminatis inaequaliter ſerratis ſubtus ſcabris, foliolis infimis ternatis. *Java. Ind. or.*

*rubra* Blum. 7. L. caule tereti ſulcato, foliis 2pinnatis ad venas ſubtus aſperis, foliolis infimis ternatis ovato-lanceolatis obtuſe ſerratis. *Java.*

*javanica* Blum. 8. L. caule tereti punctato ſcabro, foliis 2pinnatis glabris argute ſerratis. *Java.*

*aculeata* Blum. 9. L. caule teretiusculo ſulcato aculeato, foliis pinnatis glaberrimis groſſe ſerratis. *Java.*

*Staphylea* Roxb. 10. L. ramis teretibus, foliis ſupradecompoſitis glabris, foliolis lineari-oblongis acuminatis ſerrulatis. *Ind. or.* (Aquilicia Otillis Gärtn.)

*integrifolia* Roxb. 11. L. foliis ſupradecompoſitis ſubtus pubeſcentibus, foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis. *Ind. or.*

Ad L. *aequatam.* (L. hirſuta Blum.)

pag. 671.

*Ad Cariſſam.*

C. *ovata* R. Br. (C. diffuſa Roxb.)

C. *hirſuta* Roth. (C. villoſa Roxb.)

*axillaris* Roxb. 10. C. ſpinis oppoſitis recurvis, foliis oblongis, corymbis multifloris. *Inſ. Molucc.*

pag. 672.

*Ad Willughbeiam* Scop.

Poſt n. 2. *volubilis* * 5. W. caule ſcandente, foliis obovatis acutis petiolatis, racemis terminalibus laxis compoſitis. *Sumatra.* (Fagraea volubilis Wallich. in Roxb. fl. ind. 2. p. 36.)

*racemoſa* * 6. W. caule (?) erecto, foliis breviter petiolatis ovalibus utrinque rotundatis, racemis terminalibus, floribus faſciculatis. *Inſ. freti Malacc.* (Fagraea racemoſa Jack. in Roxb. fl. ind. 2. p. 38.)

*auriculata* * 7. W. caule (?) arboreo, foliis confertis elliptico-oblongis utrinque attenuatis coriaceis glabris, ſtipulis 2lobis, floribus axillaribus pedunculatis. *Sumatra.* (Fagraea auriculata Jack. in Roxb. fl. ind. 2. p. 34.)

*obovata* * 8. W. caule arboreo, foliis petiolatis obovatis carnoſis, pedunculis terminalibus 3floris. *Silhet, prov. Ind. orient.* (Fagraea obovata Wallich. in Roxb. fl. ind. 2. p. 33.)

† *elliptica* * 9. W. foliis ellipticis glabris coriaceis, paniculis corymboſis terminalibus. *Inſ. Molucc.* (Fagraea elliptica Roxb. fl. ind. 2. p. 32.)

*fragrans* * 10. W. caule arboreo, foliis lanceolatis obtuſiuſculis glaberrimis, corymbis axillaribus, ſtaminibus aſcendentibus. *Inſ. freti Malacc.* (Fagraea fragrans Roxb. l. c.)

*Ad Strychnon.*

*bicirroſa* Leſchen. 12. Str. caule ſcandente, cirris 2fidis oppoſitifoliis, foliis oblongis cuſpidatis triplinerviis, fructibus 1ſpermis. *Ind. or.* Roxb. fl. ind. 2. p. 267.

pag. 675.

*Ad Ceſtrum.*

Poſt n. 35. *pendulinum* Jacqu. 39. C. ramis pendulis, foliis ovato-oblongis acuminatis membranaceis reticulato-venoſis ſubtus pubeſcentibus, floribus terminalibus ſeſſilibus aggregatis, laciniis corollae obtuſis inflexis. *Nov. Granat.*

pag. 679.

*Ad Solanum.*

Poſt n. 35. *Gilo* Tin. 275. S. foliis ovato-oblongis baſi cuneatis angulato-dentatis utrinque floccoſo-tomentoſis, pedunculis geminis 1floris. *Patria?*

pag. 681.

Poſt n. 56. *Pſeudochina* Hilar. 276. S. arboreum, foliis lanceolatis acutis ſupra glabris, axillis venarum ſubtus

pag. 714.

*Ad Lobeliam.*

Poſt n. 75. *trialata* Hamilt. 155. L. caule erecto exacte triquetro glabro, foliis ſubrotundis repando-dentatis ſubpetiolatis, pedunculis 1floris *folio longioribus*, capſula obovata. *Nepal.* (L. micrantha Hook.)

pag. 715.

Ad L. *ſtipularem* Roth. (L. trigona Roxb.)

pag. 716.

Ad *Lobeliam irriguam* R. Br. forte *Pratia repens* Gaudich. ex *Inſ. Falkland.*

pag. 717.

Poſt n. 115. *roſea* Wallich. 156. L. caule erecto villoſo glanceſcente, foliis lanceolato-enſiformibus acuminatis *denticulatis*, *racemis terminalibus paniculatis*, pedicellis nutantibus ſecundis bracteatis. *Nepal.*

Deleatur L. *micrantha* Hook.

pag. 719.

Ad *Lyſipoma reniforme* Kunth. (Viola algida W. herb.)

pag. 720.

*Ad Goodeniam* Sm.

Poſt n. 5. *armerifolia* Sieb. 34. G. caule ſtricto glabro paucifolio, foliis linearibus abbreviatis integerrimis, calycibus breviter pedunculatis villoſis, corollis barbatis. *Nov. Holl.*

Poſt n. 11. †*pubeſcens* Sieb. 35. G. foliis obovatis inciſo-dentatis glabriuſculis, ramulis pubeſcentibus, floribus ſubſeſſilibus. *Nov. Holl.*

pag. 724.

*Ad Phyteuma.*

Ad Ph. *Sieberii* * (Ph. ſerratum Viv.) *Corſica.*

Poſt n. 17. *begoniſolium* Roxb. 25. Ph. caule repente dichotomo villoſo, foliis alternis petiolatis ſemicordatis ſpinuloſo-ſerratis ſubtus villoſiuſculis, racemis axillaribus *ſecundis ſubſpicatis.* *Inſ. freti Malacc.* Jack in Malayan miſcell. 1, 5.

pag. 725.

*Ad Campanulam.*

Poſt n. 6. *ariſtata* Wallich. 172. C. caule filiformi ſimpliciſſimo, foliis ſeſſilibus linearibus glanduloſo-denticulatis, flore ſolitario erecto, laciniis calycis ſubulatis corollam ſuperantibus. *Ind. or.*

pag. 726.

*Campanulae Scheuchzeri* Vill. var. C. carnica Schied., linifolia Scop.

Post n. 15. *lancifolia* Roxb. 173. C. caule simplici sub-3floro, foliis petiolatis lanceolatis serratis, floribus nutantibus, laciniis calycis lanceolatis incisis. *Ind. or.*

pag. 729.

Post n. 53. *Morettiana* Reichenb. 174. C. foliis cordato-ovatis crenatis, caule filiformi, flore erecto. *Italia super.* (C. filiformis Morett.)

Post n. 58. *integerrima* Hamilt. 175. C. caule erecto ramoso foliisque sessilibus linearibus acutis elongatis integerrimis hispidis, laciniis calycis linearibus rectis corollam subaequantibus. *Nepal.* C. agrestis Wallich. var.

pag. 730.

Ad C. *rapunculoidem.* (C. infundibuliformis Bot. mag. 2632.)

Post n. 68. *ramulosa* Wallich. 176. C. caule ramoso, foliis lanceolatis sinuato-dentatis utrinque hirsutis, pedunculis nutantibus paniculatis bracteatis, laciniis calycis 3angularibus dentatis corolla brevioribus. *Nepal.*

*cana* Wallich. 177. C. caule ramoso foliisque confertis lanceolatis dentatis utrinque incano-villoso-tomentosis, floribus racemosis, laciniis calycis lanceolatis dentatis corolla brevioribus. *Nepal.*

*colorata* Wallich. 178. C. caule erecto foliisque lanceolatis acutis crenato-repandis incano-villosis, pedunculis elongatis, laciniis calycis 3angularibus integerrimis corolla brevioribus. *Ind. or.*

pag. 732.

Post n. 86. *fulgens* Wallich. 179. C. caule simplici foliisque breviter petiolatis lanceolatis acutis cuspidato-serratis utrinque hirsutis, floribus fasciculato-racemosis bracteatis, laciniis calycis linearibus corollam aequantibus. *Nepal.*

pag. 734.

Post n. 118. *isophylla* Morett. 180. C. foliis cordato-reniformibus dentatis glabris, floribus corymbosis, corolla subrotata. *Italia super.*

pag. 735.

Post n. 136. *Fischeriana* * 181. C. foliis radicalibus cordatis serratis, caulinis lanceolato-linearibus subintegerrimis, floribus paniculatis pendulis, laciniis calycis reflexis integerrimis. *Sibir.* (Adenophora coronopifolia Fisch.)

*thalictrifolia* *. 182. C. caule basi surculosa foliisque parvis orbiculatis integerrimis pilosis, pedunculis 1floris glan-

dulofo-pilofis cernuis, capfula 5loculari. *Emodi montes.* (Codonopfis? thalictrifolia Wallich., Glofocomia tenera Don.)

Poft n. 141. *ovata* * 183. C. caule erecto ramofo glabro, foliis petiolatis ovatis acutis repando-dentatis pubefcentibus, pedunculis axillaribus erectis, laciniis calycis lanceolatis acutis. *Nepal.* (Wahlenbergia ovata Don.)

pag. 736.

Poft n. 145. *viridis* * 184. C. caule fcandente ramofo, foliis cordato-oblongis acuminatis obfolete crenatis fubtus glaucis villofis, pedunculis nutantibus, laciniis calycis linearibus denticulatis recurvis, corolla virefcente intus purpureo-maculata. *Nepal.* (Codonopfis viridis Wallich. in Roxb. fl. ind. 2. p. 103.)

*purpurea* * 185. C. caule erecto ramofo foliisque oppofitis ovato-oblongis fubintegerrimis fubtus glaucis glaberrimis, floribus erectis, laciniis calycis 3angularibus patulis. *Nepal.* (Codonopfis purpurea Wallich. l. c. p. 105.)

pag. 737.

Poft n. 160. *carnofa* Wallich. 186. C. caule procumbente, foliis ovatis argute ferratis pellucido-punctatis carnofis glaberrimis, pedunculis axillaribus capillaribus, corolla fubbilabiata, filamentis planiusculis bafi aequalibus. *Nepal.*

pag. 738.

Ad *Schöpfiam* Schreb.

*fragrans* Wallich. 2. Sch. foliis alternis ellipticis integerrimis glabris, racemis axilliaribus multifloris. *Nepal.*

pag. 741.

Ad *Pfychotriam.*

Poft n. 12. *noxia* Hilar. 96. Pf. fruticofa, ramis bifariam pubefcentibus, foliis breviffime petiolatis lanceolatis acuminatis glaberrimis, ftipulis 2partitis, floribus fafciculatis terminalibus. *Brafil.*

pag. 742.

Poft n. 88. *fphaerocarpa* Wallich. 97. Pf. foliis ovato-ellipticis acutis coriaceis glabris fubtus parallele venofis, ftipulis 2fidis, corymbis terminalibus compactis, fructibus fphaericis glabris eoftatis. *Silhet, prov. Ind. or.*

*truncata* Wallich. 98. Pf. foliis ovato-ellipticis utrinque attenuatis coriaceis glabris fubtus parallele venofis, corymbi terminalis ramulis carnofis bracteatis, calycibus truncatis. *Ind. or.*

*connata* Wallich. 99. Pſ. foliis ſubſeſſilibus lanceolatis acuminatis coriaceis glabris, ſtipulis ovatis acutis, corymbis terminalibus trichotomis, bracteis connatis infundibuliformibus ſublobatis, floribus ſeſſilibus ternatis, calycibus truncatis. *Ind. or.*

*adenophylla* Wallich. 100. Pſ. foliis lanceolatis acuminatis ſupra nitidis ſubtus parallele venoſis, axillis venarum glandulosis, ſtipulis ovatis obtuſis, racemis terminalibus cylindricis. *Silhet*, *prov. Ind. or.*

*curviflora* Wallich. 101. Pſ. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis membranaceis longe petiolatis, ſtipulis ovatis obtuſis, racemis terminalibus compactis, limbo corollae incurvo. *Inſ. freti Malacc.*

*ophioxyloides* Wallich. 102. Pſ. caule fruticoſo ſcandente dichotomo, foliis lanceolatis acuminatis glaberrimis, ſtipulis ovatis acuminatis, corymbo terminali, limbo corollae incurvo. *Silhet*, *prov. Ind. or.*

## pag. 744.

Pſ. *hirſuta* Sw. Ad hanc ut varietas accedit: Pſ. *loniceroides* Sieb. *Nov. Holl.*

Pſ. *aſiatica*. (Pſ. collina Labill. nov. Caledon. t. 47.)

## pag. 745.

Poſt n. 66. *Wallichiana* * 103. Pſ. foliis ovatis acuminatis ſerrulatis nervoſis glabris, paniculis terminalibus glomeratis, dentibus calycibus rotundatis. *Nepal.* (Pſ. nervoſa Don.)

Poſt n. 70. *Marcgravii* * 104. Pſ. foliis ovato-oblongis acuminatis venoſis, ſtipulis 3fidis, cymis pedunculatis croceis, corolla baſi gibba papilloſo-tomentoſa. *Braſil.* (Palicourea Hilar., Galvania 2. Veloz.)

*ſtipulacea* Wallich. 105. Pſ. foliis ſubſeſſilibus oblongo-lanceolatis acuminatis nervoſis coriaceis glabris, ſtipulis triangularibus apice foliaceis, panicula terminali trichotoma, bracteis 3fidis. *Inſ. freti Malacc.*

*Reeveſii* Wallich. 106. Pſ. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis laevibus glaucis, ſtipulis obtuſis appreſſis, panicula terminali ſubſeſſili, calycibus truncatis. *China.*

*aurantiaca* Wallich. 107. Pſ. foliis lanceolatis acuminatis glabris ſupra lucidis ſubtus minute punctatis parallele venoſis, ſtipulis ovatis cuſpidatis, paniculae ramis verticillatis, floribus ternis, calycibus truncatis. *Inſ. freti Malacc.*

*denticulata* Wallich. 108. Pſ. caule ſuffruticoſo baſi repente aſcendente, foliis ovatis acutis coriaceis ſubtus reticulatis, ſtipulis ovatis argute dentatis, panicula terminali cymoſa, dentibus calycis ſubulatis. *Nepal.*

## pag. 747.

*Bartlingia ſcoparia* Reichenb. delenda reducitur ad *Plocamam pendulam* Ait. p. 760.

*verticillatum* Wallich. 2. A. caeſpitoſum erectum, foliis quaternis lineari-lanceolatis ſubfalcatis, pedunculis ſubgeminatis paucifloris, floribus 4-5andris. *Nepal.*

*roſtratum* Wallich. 3. A. erectum glabrum, foliis oppoſitis petiolatis lanceolatis glaberrimis, ſtipulis ovalibus recurvis, umbella terminali multiflora. *Silhet, prov Ind. or.*

*pictum* Wallich. 4. A. humile glabrum, foliis ſubcordato-ovatis acutis albo-reticulatis, umbella multiflora. *Inſ. freti Malacc.*

pag. 756.

Ad *Canthium* Lam.

*anguſtifolium* Roxb. 4. C. fruticoſum, ſpinis axillaribus, foliis ſubfaſciculatis lanceolatis acuminatis lucidis, ſtipulis enſiformibus, floribus axillaribus aggregatis. *Ind. or.*

*parvifolium* Roxb. 5. C. fruticoſum ſpinoſum piloſum, foliis ovalibus integerrimis, floribus axillaribus faſciculatis, tubo corollae globoſo. *Ind. or.*

pag. 757.

Poſt *Canthium* Lam.:

## GEOPHILA Don.

*reniformis* Don. *Ind. or.* Herba reptans, foliis reniformibus pubeſcentibus, ſtipulis integris, pedunculis 2floris folio brevioribus. (Pſychotria herbacea L. non Jacqu.)

Ad *Trioſteum.*

*hirſutum* Roxb. 4. Tr. fruticoſum hirſutum, foliis breviter petiolatis lanceolatis acuminatis, floribus axillaribus ſeſſilibus, bracteis numeroſis lanceolatis flores ſuperantibus. *Ind. or.*

*Emodorum* * 5. Tr. herbaceum villoſo-hirtum, foliis baſi connatis obovatis acutis, racemis terminalibus verticillatis. *Emodi montes.* (Tr. himaluyanum Wallich.)

pag. 758.

Ad *Loniceram.*

Poſt n. 14. *macrantha* * 31. L. ſcandens, ramulis teretibus petiolisque piloſis, foliis cordato-ovalibus cuſpidatis ſubtus tomentoſis, corollis piloſis. *Nepal.* (Caprifolium macranthum Don.)

pag. 759.

Poſt n. 18. *liguſtrina* Wallich. 32. L. foliis ellipticis integerrimis ciliatis, ſupremis lanceolatis, ramulis piloſis. *Nepal.*

Ad L. *Xyloſteum.* L. acuminata et diverſifolia Wallich. varr.

Poſt n. 24. *glabrata* Wallich. 33. L. ſcandens glabra, foliis ovato-oblongis acuminatis ſubtus glaucis, floribus geminatis in faſciculis axillaribus terminalibusque, bracteis ovatis, tubo corollae breviusculo, (baccis. nigris). *Ind. orient.* (L. nigra Thunb. japon)

*lanceolata* Wallich. 34. L. foliis lanceolatis acuminatis ſupra nitidis pubeſcentibus ſubtus glaucis piloſis, pedunculis axillaribus elongatis villoſis, (baccis nigris). *Nepal.*

*Leſchenaultii* Wallich. 35. L. foliis ſubcordato-ovatis acutis ſubtus villoſis, pedunculis abbreviatis 2floris faſciculatis, involucro 6phyllo. *Ind. or.*

*punicea* Sims. 36. L. foliis ſubcordato-ovatis glabris nitidis, corollae tubo gracili baſi ſubgibbo. *Patria?* Bot. mag. 2469.

Ad *Weberam.*

*auriculata* Wallich. 4. W. arboreſcens, foliis ſubſeſſilibus baſi 2lobis oblongis emarginatis, axillis venarum ſubtus glanduloſis, floribus paniculatis, ſtigmate 2lobo. *Inſ. freti Malacc.*

*denſiflora* Wallich. 5. W. ſubarboreſcens, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis glaberrimis, paniculis ſubſeſſilibus trichotomis, ſtigmate integro. *Inſ. freti Malacc.*

*oppoſitifolia* Roxb. 6. W. fruticoſa erecta, foliis oblongo-lanceolatis nitidis, ſpicis paniculatis oppoſitifoliis, ſtigmate clavato. *Ind. or.*

*odorata* Roxb. 7. W. fruticoſa erecta, foliis lanceolatis acuminatis integerrimis nitidis, corymbis terminalibus. *Ind. or.*

*macrophylla* Roxb. 8. W. fruticoſa erecta, foliis ovato-lanceolatis acuminatis, panicula terminali villoſa. *Inſ. freti Malacc.*

*ſcandens* Roxb. 9. W. ſcandens, foliis oblongis acuminatis ramulisque lucidis, cymis axillaribus, ſtigmate bilamellato. *Silhet, prov. Ind. or.*

*truncata* Wall. 10. W. volubilis, foliis ovatis acutis coriaceis ſupra nitidis, paniculae terminalis ramis complanatis, ſtigmate clavato bilobo. *Inſ. freti Malacc.*

pag. 760.

Ad *Vangueriam edulem* Vahl. V. *ſpinoſa* Roxb. fl. ind. 2. p. 172. eadem videtur. Spinarum enim praeſentia in ſpeciminibus ſiccis, quae Vahlius viderat, conſpici nequivit.

Ad *Baeobotryn* Forſt.

*lanceolata* * 4. B. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis utrinque ramulisque glabris, racemis ſubgeminis multifloris. *Nepal.* (Maeſa Don.)

*tomentoſa* Hamilt. 5. B. foliis oblongis acuminatis ſerratis utrinque ramulisque incano-tomentoſis, racemis multiflo-

ris paniculatis. *Nepal.* (B. macrophylla Wallich., Maesa tomentosa Don.)

Ad B. *indicam* Roxb. (Maesa Chisia Don.)

*ramentacea* Roxb. 6. B. foliis lanceolatis acutis integerrimis glabris, paniculis ramentosis. *Silhet*, *prov. Ind. or.*

*argentea* Wall. 7. B. foliis ovatis acuminatis argute sinuato-dentatis pubescentibus subtus argenteis, racemis axillaribus abbreviatis, floribus fasciculatis. *Ind. orient.*

pag. 761.

Ad *Gardeniam.*

Post n. 2. *propinqua* Lindl. 35. G. spinis infraxillaribus rectis quaternis, foliis cordato-ovatis acuminatis undulatis pubescentibus. floribus terminalibus fasciculatis. *Patria?* Bot. reg. 975.

pag. 762.

Ad *Gardeniam esculentam* * (Randia triflora Don.) *Nepal.*

Ad G. *spinosam* Thunb. (Posoqueria rigida Wallich.)

Ad G. *multifloram* W. (Posoqueria longiflora Roxb.)

*montana* Roxb. 36. G. arborea, spinis axillaribus oppositis abbreviatis, foliis oblongis obtusis supra nitidis subtus subpubescentibus, floribus aggregatis terminalibus, dentibus calycis abbreviatis. *Ind. or.*

*campanulata* Roxb. 37. G. fruticosa, spinis solitariis subterminalibus, foliis lato-lanceolatis utrinque laevibus, floribus fasciculatis, dentibus calycis abbreviatis, corolla campanulata. *Ind. or.*

*turgida* Roxb. 38. G. arborescens, cortice spongioso, spinis oppositis rectis, foliis obovatis glabris, floribus solitariis, dentibus calycis abbreviatis. *Butan.*

*densa* Wallich. 39. G. fruticosa, ramis decussatis 4gonis spinosis, foliis confertis obovatis mucronatis glabris, floribus solitariis, laciniis calycis subulatis. *Nepal.*

*nutans* * 40. G. fruticosa, ramis pendulis, spinis axillaribus oppositis horizontalibus, foliis fasciculatis obovatis glabris, floribus solitariis, laciniis calycis elongatis. *Ind. or.* (Posoqueria nutans Roxb.)

*longispina* * 41. G. arborea, ramis deflexis, spinis decussatis horizontalibus elongatis, foliis obovatis glabris, floribus solitariis, laciniis calycis cordato-ovatis persistentibus. *Ora Coromandel.* (Posoqueria longispina Roxb.)

*fasciculata* * 42. G. fruticosa, spinis axillaribus patentibus, foliis ovato-oblongis laevibus, floribus axillaribus fasciculatis, calycis hirsuti laciniis subulatis. *Silhet*, *prov. Ind. orient.* (Posoqueria fasciculata Roxb.)

*floribunda* * 43. G. arborescens, spinis axillaribus, foliis confertis obovatis glabris, floribus fasciculatis, laciniis calycis lanceolatis elongatis. *Ora Coromandel.* (Posoqueria floribunda Roxb.)

pag. 763.

Poſt n. 19. *rigida* Hamilt. 44. G. caule ramoſiſſimo, foliis cuneatis retuſis mucronulatis glabris, laciniis calycis ſubulatis, lobis corollae acutiuſculis. *Nepal.*

*lucida* Roxb. 45. G. arboreſcens, gemmis reſinoſis, foliis oblongis lucidis parallele venoſis, pedunculis ſolitariis clavatis, laciniis calycis ſubulatis. *Ind. or.*

*carinata* Wallich. 46. G. arboreſcens, gemmis reſinoſis, foliis obovatis ſubtus villoſis, floribus ſolitariis, calyce truncato carinato. *Inſ. freti Malacc.* (G. tubifera Wallich.)

*aniſophylla* Jack. 47. G. arboreſcens, foliis oblongis villoſis, altero minori, corymbis axillaribus, dentibus calycis abbreviatis. *Inſ. freti Malacc.*

* G. *grandiflora* Lour. (G. calyculata Roxb.)

G. *reſinifera* Roth. (G. coſtata Roxb.)

pag. 764.

Ad *Stylocorynam* Cav.

*corymboſa* Labill. 2. St. foliis obovato-oblongis coriaceis glabris ſubtus discoloribus, floribus corymboſis, baccis 4locularibus. *Nov. Caledon.* St. racemoſa Cav. habet baccas 2loculares.

Ad *Burchelliam* R. Br.

*parviflora* Lindl. 2. B. foliis ſubcordato-oblongis acutis glabriuſculis ſubtus ad venas pubeſcentibus, floribus capitatis flavis. *Afric. auſtr.* Bot. reg. 891.

pag. 765.

Ad *Schwenkfeldiam* Sw.

*malaccenſis* * 9. Schw. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſupra glabris ſubtus villoſis, ſtipulis petiolos ſuperantibus oblongis acutis, capitulis axillaribus pedunculatis. *Inſ. freti Malacc.* (Urophyllum villoſum Wallich.)

*glabra* * 10. Schw. foliis oblongo-lanceolatis acutis glabris, ſtipulis linearibus elongatis villoſis, capitulis axillaribus breviter pedunculatis. *Inſ. freti Malacc.* (Urophyllum Wallich.)

Poſt *Hameliam*:

## LEYCESTERIA Wallich.

*formoſa* Wall. *Emodi montes.* Frutex ramoſus, foliis oppoſitis cordato-lanceolatis acuminatis glabris ſubtus glaucis, racemis terminalibus, bracteis grandibus purpureis ciliatis venoſis, floribus albido-roſeis.

pag. 772.

Ad *Ceanothum.*

C. *paniculatus* Roth. (C. napalensis Wallich.)
*triqueter* Wall. 21. C. fruticosus, foliis ovato-oblongis acuminatis serrulatis subtus-pubescentibus, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris, fructibus 3quetris. *Nepal.*

pag. 773.

Ad *Hoveniam dulcem* Thunb. adde patriam: *Nepal.*

Ad *Celastrum.*

Post n. 7. *rufa* Wallich. 49. C. arborea glabra, aculeis axillaribus rectis, foliis lanceolatis acuminatis serrulatis glaberrimis, pedunculis corymbiferis capillaribus, capsula 3sperma. *Nepal.*
*rigida* Wallich. 50. C. fruticosa erecta, ramis flexuosis spinosis, foliis obovatis coriaceis argute serratis, spinis corymbiferis. *Ind. or.*

pag. 774.

Post n. 19. †*Hänkea* * 51. C. fruticosa, ramis flexuosis, foliis alternis petiolatis oblongo-lanceolatis undulatis integerrimis, racemis axillaribus folia superantibus, floribus bracteatis. *Peru.* (Hänkea flexuosa R. et P. fl. peruv. 3. t. 231. Etiamsi ibi corolla 1petala urceolata et drupa indicentur, auctores dein ipsi ad Celastrum ablegarunt.)
*verticillata* Roxb. 52. C arborea, foliis subverticillatis oblongo-lanceolatis undulatis integerrimis glabris, pedunculis umbelliferis terminalibus, capsulis oligospermis. *Nepal.*
*robusta* Roxb. 53. C. arborea, foliis alternis lanceolatis integerrimis nitidis, racemis axillaribus folia aequantibus, capsulis 2spermis. *Silhet, prov. Ind. or.*
*opposita* Wall. 54. C. fruticosa, ramulis 4gonis, foliis oppositis lanceolatis obtusis integerrimis, pedunculis axillaribus 3floris. *Ind. or.*
*bivalvis* Jacqu. 55. C. fruticosa, foliis oppositis lanceolatis acuminatis integerrimis glaberrimis, pedunculis lateralibus paucifloris, floribus apetalis, capsul 1sperma. *Ins. freti Malacc.*

pag. 775.

Post n. 27. *alnifolia* Don. 56. C. foliis ovatis acuminatis serrati nervosis glabris opacis, pedunculis axillaribu subsolitariis 1floris. *Nepal.*
*microcarpa* Don. 57. C. foliis ovatis crenatis utrinque ramulisque pubescentibus, pedunculis axillaribus solitariis 1floris. *Nepal.*
Post n. 40. *quadrangulata* Schrad. 58. C. ramulis quadranguli foliis alternis oblongis spinoso-dentatis nitidi pedunculis axillaribus confertis. *Brasil.* (Ilex acutangula Nees.)

*ilicifolia* Schrad. 59. C. foliis alternis oblongis truncatis subsinuato-spinosis supra lucidis subtus discoloribus, pedunculis axillaribus. *Brasil.* (Ilex truncata Nees.)

*ilicinus* Burch. 60. C. *foliis alternis ovato-subrhombeis grosse serratis subtus pallidis, pedunculis axillaribus 1floris infra medium articulatis. Afric. austr.*

*dependens* Wallich. 61. C. fruticosa scandens, foliis alternis pendulis oblongis acuminatis serratis glabris, paniculis terminalibus, glandulis nectariferis reniformibus stamina interstinguentibus, capsula 3sperma. *Nepal.* (C. multiflora Roxb.)

*nutans* Roxb. 62. C. fruticosa scandens, foliis alternis obovato-oblongis obtuse serratis glabris, paniculis racemosis terminalibus, capsulis oligospermis. *Ind. orient.*

*monosperma* Roxb. 63. C. fruticosa scandens, foliis obovato-oblongis serrulatis nitidis, paniculis axillaribus terminalibusque elongatis, capsulis 1spermis. *Ind. or.*

†*pauciflora* Wallich. 64. C. fruticosa erecta, *foliis lanceolatis acuminatis* subserratis glaberrimis, pedunculis 6-8floris, capsula 3valvi 6sperma. *Ins. freti Malacc.*

*stylosa* Wall. 65. C. fruticosa scandens, foliis ovato-lanceolatis acuminatis serrulatis, pedunculis racemosis paucifloris, capsula globosa stylo elongato coronata. *Nepal.*

pag. 776.

Ad C. *orbicularem* Humb. (Maytenus uliginosus Kunth. Humb. nov. gen. 7. p. 65.)

Ad *Pomaderrin* Labill.

Post n. 1. *phillyreoides* Sieb. 6. P. foliis elliptico-oblongis integerrimis coriaceis subtus albido-tomentosis, cymis corymbosis confertis, calycibus villosis. *Nov. Holl.*

Ad P. *lanigeram* Sims. (P. obscura, ferruginea et viridirufa Sieb.)

P. *acuminata* Link. potius dicenda P. *discolor* Vent. malmais. t. 58. prior. Ad hanc P. malifolia et discolor Sieb.

*intermedia* Sieb. 7. P. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis supra glabris subtus incano-villosis, cymis corymboso-paniculatis, calycibus villosis. *Nov. Holl.*

*aspera* Sieb. 8. P. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis inaequaliter serratis supra scabris subtus floccoso-tomentosis, paniculis axillaribus terminalibusque racemosis elongatis tomentosis, floribus apetalis. *Nov. Holl.*

*ligustrina* Sieb. 9. P. *foliis lanceolatis integerrimis supra glabris* subtus ferrugineo-villosis, paniculis terminalibus, calycibus *sericeo-villosis. Nov. Holl.*

pag. 777.

Ad *Vitem.*

Ad *Vitem indicam.* V. sylvestris Blum. var.

Post n. 8. *Purani* Hamilt. Don. 27. V. *foliis* cordatis dentato-serratis acuminatis coriaceis subtus petiolisque

villofis, thyrfis oppofitifoliis fpicatis brevibus. *Nepal.*

*truncata* Blum. 28. V. foliis bafi truncatis ovatis, acuminatis, obtufe glanduloſo-ferratis, venis fubtus pubefcentibus, paniculis oppofitifoliis. *Java.*

*cymofa* Blum. 29. V. foliis cordatis acuminatis fetofo-ferrulatis fubtus tomentofis, cymis pedunculatis 3fidis folio brevioribus. *Java.*

*glaberrima* Wallich. 30. V. caule carnofo 4gono, foliis fubcordato-oblongis obtufiusculis mucronato-dentatis 3nerviis laevibus, umbellis corymbofis. *Inf. freti Malacc.*

*gracilis* Wallich. 31. V. caule filiformi, foliis cordato-ovatis acuminatis argute dentatis fupra pubefcentibus fubtus ramulisque ferrugineo-villofis, fpicis filiformibus cirriferis. *Peninful. Malacc.*

pag. 778.

Ad V. *glabratam* Roth. (V. latifolia Roxb. Don.)
V. *heterophylla* Thunb. crefcit et in *Java.*
V. *triloba* Roth. (V. lanata Roxb.)
V. *capenfis* Thunb. (V. rugofa Wallich.)

Poft n. 14. *parvifolia* Roxb. 32. V. foliis cordatis fub-3lobis crenato-ferratis glabris, thyrfis oppofitifoliis. *Bengal.*

*barbata* Wall. 33. V. ramis cylindricis glandulofo-fetofis, foliis cordato-fubrotundis 3lobis finuato-dentatis 5nerviis glabriusculis, glomerulis cirriferis, floribus 4fidis. *Silhet, prov. Ind. or.*

*glandulofa* Wall. 34. V. ramis villofis, foliis cordato-ovatis 3lobis fubtus villofis, axillis venarum foveolatis, corymbis dichotomis. *Nepal.*

Poft n. 19. *javanica* * 35. V. foliis fimplicibus ternatisque cordatis crenato-ferratis glabris, corymbis dichotomis. *Java.* (Ampelopfis heterophylla Blum.)

V. *ternata* Roth. (V. cinnamomea Wallich.)

*femicordata* Wallich. 36. V. foliis ternatis fubtus villofis, foliolis acuminatis argute ferratis, lateralibus femicordatis, cymis oblongis. *Nepal.*

† *bracteolata* Wall. 37. V. foliis ternatis fubtus fubpubefcentibus, foliolis acuminatis argute ferrulatis, lateralibus femiovatis, cymis diffufis, bracteis oblongis deciduis, floribus 4andris. *Ind. or.*

† *molliffima* Wall. 38. V. foliis ternatis villofiffimis, foliolis acuminatis inaequaliter crenatis, cymis divaricatis, floribus 4andris *Inf. freti Malacc.*

Poft n. 22. *capreolata* Don. 39. V. foliis quinatis oblongis acuminatis fetaceo-dentatis coriaceis fubtus pubefcentibus, umbellis 4radiatis folio brevioribus. *Nepal.*

*rubifolia* Wall. 40. V. foliis pinnatis 5jugis fubtus glaucis pubefcentibus, foliolis fubcordato-oblongis acuminatis argute ferratis, ramis corymbisque villofis. *Bengal.*

pag. 779.

Ad *Scopoliam* Sm.

oſt n. 4. *megapotamica* * 6. Sc. foliolis lanceolatis abrupte acuminatis integerrimis opacis glabris, paniculis axillaribus divaricatis, floribus 5fidis. *Rio grande.* Sello.

:*noſa* * 7. Sc. foliolis ſpathulato-lanceolatis mucronatis glaberrimis ſupra lucidis ſubtus parallele venoſis, ramis verrucoſis, ramulis glabris, racemis axillaribus. *Rio grande.* Sello.

Poſt *Huerteam* R. et P.:

## ICACINA Adr. Juſſ.

:*negalenſis* Adr. Juſſ. *Senegambia.* Arbor foliis alternis ovato-oblongis integerrimis glabris, floribus paniculatis terminalibus.

Ad *Sabiam* Colebr.

*arviflora* Wallich. 2. S. foliis ovato-lanceolatis cuſpidatis margine membranaceis undulatis, ramulis pubeſcentibus, pedunculis axillaribus paucifloris, floribus digynis. *Nepal.*

*ımpanulata* Wallich. 3. S. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis margine membranaceis ciliatis, pedunculis axillaribus 1floris, petalis concavis. *Nepal.*

pag. 780.

*Bonplandia* W. mutetur in *Galipeam* Aubl.

'oſt n. 1. *aromatica* * 10. G. foliolis lanceolatis acutis glabris integerrimis pellucido-punctatis, racemis ſpicatis axillaribus, ſtaminibus 3 ſterilibus. *Guiana.* (Raputia Aubl., Sciuris Vahl. Syſt. veg. 1. p. 38.)

*orymboſa* * 11. G. foliolis lanceolatis acuminatis glabris, petiolo communi marginato, floribus corymboſis, ſtaminibus 4, 2 ſterilibus. *Guiana.* (Galipea trifoliata Aubl., Sciuris corymboſa Syſt. veg. 1. 38.)

pag. 781.

'oſt n. 8. *macrophylla* Hilar. 12. G. foliis oblongis, racemis extraxillaribus, ſtaminibus 3 ſterilibus. *Braſil.* (Conchocarpus macrophyllus Mik., Sciuris ſimplicifolia Syſt. veg. 1. 39.)

*Gaudichaudiana* Hilar. 13. G. foliis ſpathulatis mucronatis pellucido-punctatis, pedicellis pubeſcentibus, ſtaminibus 3-4 ſterilibus. *Braſil.*

*Martiana* Hilar. 14. G. foliis lanceolatis utrinque attenuatis glaberrimis, racemo ſimplici, ſtaminibus 3 ſterilibus *Braſil.*

Ad G. *cuneifoliam* Hilar. dele *Hortiam* Vandell.

Poſt *Melicytum* Forſt.:

## EUTHEMIS Jack.

*leucocarpa* Jack. 1. E. foliis petiolatis lanceolatis ſpinuloſo-ſerrati glaberrimis nitidis, racemis erectis ramoſis, (ra mis apice gemmiferis corniculatis)? *Peninſul. Ma lacc.*

*minor* Jack. 2. E. foliis anguſte lanceolatis obſolete ſerratis gla berrimis venoſo-ſtriatis, racemis ſimplicibus fructibus acuminatis angulatis. *Peninſul. Malacc*

† *elegantiſſima* Wallich. 3. E. foliis elliptico-lanceolatis acuminatis ſubti liſſime ſerrulatis, venis reticulatis ad marginen confluentibus. *Peninſ. Malacc.*

## SYNDESMIS Wallich.

*elegans* Wall. *Inſ. freti Malacc.* Arbuscula, foliis ſparſis lanceo latis coriaceis, corymbis terminalibus, calycibu coccineis, corolla candida.

## HARPULLIA Roxb.

*cupanioides* Roxb. *Ind. or.* Arbuscula, foliis abrupte pinnatis glabris foliolis 4-6jugis oblongis acutis integerrimis, pa niculis axillaribus, floribus ſulfureis.

pag. 788.

Ad *Evonymum*.

*micranthus* Don. 9. E. foliis oblongis acuminatis ſerrulatis glabris lucidis, pedunculis 3ſidis multifloris folio bre vioribus. *Nepal.* (E. glaber Roxb.)

*lacer* Don. 10. E. foliis obovatis ſerrulatis glabris, pedunculis axillaribus trichotomis folia ſuperantibus. *Ne-pal.* (E frigidus Wallich.)

*lucidus* Don. 11. E. foliis lanceolatis acuminatis argute ſerratis glabris lucidis, umbellis lateralibus oppoſitis pe-dunculatis. *Nepal.* (E. grandiflora Wallich.)

*tingens* Wall. 12. E. arboreus, foliis ſubdecuſſatis ovato-lanceo-latis ſerrulatis ſupra rugoſis coriaceis, pedunculis dichotomis, bracteis fimbriatis, capſula 5ſper-ma. *Ind. or.*

*fimbriatus* Wall. 13. E. foliis oppoſitis ovato-lanceolatis acuminatis argute ſerrulato-fimbriatis, pedunculis umbel-liferis, capſula late alata. *Peninſ. Malacc.*

† *groſſus* Wall. 14. E. foliis ſuboppoſitis longe petiolatis ovatis acu-tis ſerratis coriaceis nitidis, pedunculis filiformi-bus dichotomis. *Ind. or.*

*vagans* Wall. 15. E. fruticoſus ſcandens, foliis ovato-lanceolatis ſerratis, pedunculis filiformibus dichotomis, capſula globulari. *Nepal.*

*echinatus* Wall. 16. E. ſcandens radicans, foliis ovato-lanceolatis ſerratis glaberrimis, pedunculis filiformibus di-chotomis, capſula echinata. *Nepal.*

† *dichotomus* Heyn. 17. E. ramis dichotomis, foliis lineari-lanceolatis acuminatis integerrimis glabris, pedunculis faſ-ciculatis dichotomis, capſula clavata. *Ind. or.*

† *indicus* Heyn. 18. E. ramulis ſub-4angulis, foliis lanceolatis acuminatis integerrimis coriaceis ſupra nitidis, pedunculis ſub-8floris, capſula clavata apice 5alata. *Ind. or.*

† *garciniifolius* Roxb. 19. E. ramulis teretibus, foliis oppoſitis lanceolatis acuminatis integerrimis laevibus, pedunculis 8floris, capſula 2valvi 1ſperma. *Silhet, provinc. Ind. or.*

pag. 789.

Ad *Büttneram.*

Poſt n. 3. 4. *celtoides* Hilar. 19. B. foliis ſubcordato-oblongis acuminatis ſerratis ſupra aſperis ſubtus pubeſcentibus, paniculis axillaribus. *Braſil.*

*ſagittaefolia* Hilar. 20. B. ſuffruticoſa erecta, ramis angulatis breviſſime aculeatis, petiolis 3quetris, foliis ſagittatis apice dentatis, racemis ſpicatis, ligulis petalorum erectis elongatis ſubulatis. *Braſil.*

pag. 790.

Ad B. *tereticaulem* Lam. (B. auſtralis Hilar.) *Braſil.*
Ad B. *pannoſam* Cand. (B. auſtralis Sieb.)

Poſt n. 13. *aſpera* Colebr. 21. B. fruticoſa, ramis teretibus pubeſcentibus, foliis late cordatis obtuſiusculis integerrimis ſubtus piloſiusculis 5nerviis, umbellis axillaribus corymboſis, fructibus grandibus valide armatis. *Ind. or.*

*piloſa* Roxb. 22. B. fruticoſa volubilis, ramis ſulcatis, foliis 3-5angulis dentatis acutis ſubtus 7nerviis, glandula in medio nervo, umbellis axillaribus proliferis. *Ind. or.*

*Jackiana* Wall. 23. B. fruticoſa ſcandens, ramis teretibus ferrugineis, foliis oblongis acutis integerrimis ſtellato-piloſis ſubtus 5nerviis, corymbis axillaribus longe pedunculatis. *Inſ. freti Malacc.*

*melaſtomaefolia* Hilar. 24. B. foliis ovato-ellipticis glabris integerrimis triplinerviis, panicula ſpicata elongata. *Braſil.*

*Gayana* Hilar. 25. B. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis glabriusculis, umbellis axillaribus pedunculatis. *Braſil.*

*ſidaefolia* Hilar. 26. B. foliis cordatis acuminatis integerrimis ſubtus pubeſcentibus, corymbis ſublateralibus. *Braſil.*

pag. 792.

Ad *Hydnocarpum* Vahl.

*moluccanus* * 2. H. foliis alternis lanceolatis acutis integerrimis glabris, pedunculis axillaribus multifloris. *Inſ. Molucc.* (Vareca moluccana Roxb.)

*lanceolatus* * 3. H. foliis alternis lanceolatis glaberrimis parallele venoſis, floribus axillaribus corymboſo-faſciculatis. *Inſ. freti Malacc.* (Vareca lanceolata Roxb.)

*heteroclitus* * 4. H. foliis alternis lanceolatis crenatis glabris axillis venarum subtus glanduloso - foveolatis stipulis ensiformibus, floribus axillaribus glomeratis sessilibus. *Ind. or.* (Vareca heteroclita Roxb.)

## BREXIA Noronh.

*madagascarensis* Ker. 1. Br. foliis oblongis obtusis integerrimis, costa subtus purpurea, pedunculis umbelliferis. *Madagascar.* (Venana Lam.)

*spinosa* Lindl. 2. Br. foliis lanceolatis elongatis rigidis marginatis spinosis, pedunculis subumbelliferis. *Madagascar.* (Theophrasta serratifolia Hortul.)

pag. 793.

Ad *Escalloniam* Mutis.

Post n. 12. *megapotamica* * 15. E. foliis spathulatis longe mucronatis argute serratis subtus punctatis venulosis glutinosis, serraturis incurvis glandulosis, panicula corymbosa subfoliata. *Rio grande.* Sello.

*chlorophylla* Schlechtend. 16. E. foliis obovatis mucronatis integerrimis subtus caesio-pulverulentis, racemis terminalibus. *Brasil.*

pag. 794.

Ad *Iteam.*

*umbellata* Roxb. 2. I. foliis alternis oblongis integerrimis glabris, umbellis paniculatis. *Ins. Malaïc.*

*macrophylla* Wall. 3. I. foliis alternis elliptico-oblongis acuminatis uncinato-serrulatis coriaceis nitidis, racemis axillaribus fasciculatis. *Silhet, prov. Ind. or.*

Post *Calodendron* Thunb.:

## HORTIA Vandell.

*brasiliana* Vand. *Brasil.* Suffrutex glaberrimus, foliis alternis spathulatis punctato - pellucidis, floribus cymosis roseis. Hilar. pl. us. brasil. t. 17.

## METRODOREA Hilar.

*nigra* Hilar. *Brasil.* Frutex ramis divaricatis, foliis oblongis utrinque attenuatis repandis, floribus paniculatis atropurpureis.

## DICTYOLOMA Adr. Juss.

*Vandellianum* Adr. Juss. *Brasil.* Arbor foliis pinnatis margine glandulosis, corymbis lateralibus dichotomis, floribus tomentosis. Mém. du mus. 12. t. 24.

pag. 795.

Ad *Cedrelam* P. Br.

*febrifuga* Blum. 8. C. foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis acuminatis integerrimis, venis subtus concoloribus. *Java.*

pag. 796.

Sauvagesia.

*racemosa* Hilar. 1. S. suffruticosa, foliis ovato-oblongis crenatis parallele venosis, stipulis crispo-ciliatis, racemo simplici terminali, calycibus acutiusculis. *Brasil.* (S. ovata Mart.)

*Sprengelii* Hilar. 2. S. suffruticosa ramosa, foliis lanceolatis subserratis, stipulis plumoso-ciliatis, racemo terminali, calycibus obtusis. *Ind. or. Guiana. Brasil.* (S. serpyllifolia Mart., erecta *.)

*rubiginosa* Hilar. 3. S. suffruticosa ramosissima, foliis lineari-lanceolatis acutis serrulatis, stipulis confertissimis plumoso-ciliatis, racemis spicatis terminalibus bracteatis, calycibus acutis. *Brasil.* (S. laxa Mart.)

*erecta* 4. S. suffruticosa ascendens, foliis lanceolatis acutis serratis, stipulis ciliatis, pedunculis subgeminis axillaribus, calycibus acutis. *Ind. occid. Amer. austr.* (S. erecta et Adima Aubl., nutans Pers.)

*linearifolia* Hilar. 5. S. suffruticosa ramosa, foliis linearibus acutis obsolete serratis, stipulis 2fidis ciliatis, pedunculis axillaribus solitariis, calycibus acutis apice barbatis. *Brasil.* (S. fruticosa Mart.)

*tenella* Lam. 6. S. herbacea erecta, foliis confertis linearibus subintegerrimis, stipulis abbreviatis ciliatis, pedunculis axillaribus 1floris, calycibus acutis. *Guiana. Brasil.* (S. pusilla Mart.)

Ad *Lavradiam* Vandell.

*L. montana* Mart. (L. glandulosa Hilar.)

*L. alpestris* Mart. (L. ericoides Hilar.)

*elegantissima* Hilar. 3. L. suffruticosa simpliciuscula, foliis minutis imbricatis sessilibus ovatis obtusis glabris, stipulis pilosis, racemis terminalibus laxis. *Brasil.* (Sauvagesia elegantissima Hilar. mém. du mus. 9. syst. veg. 1. 796.)

*Vellozii* Hilar. 4. L. suffruticosa simpliciuscula, foliis alternis lanceolatis utrinque attenuatis mucronatis calloso-serratis, stipulis plumosis, floribus racemosis, calycibus acutis 5nerviis. *Brasil.*

*capillaris* Hilar. 5. L. suffruticosa ramosissima, foliis lanceolatis glanduloso-serratis venoso-lineatis, pedunculis terminalibus paucifloris capillaribus divaricatis. *Brasil.*

pag. 797.

Ad *Violam*.

Poſt n. 16. *palmaris* Hamilt. 96. V. foliis longe petiolatis cordatis acuminatis crenatis piloſiusculis, calycibus acutis, petalis barbatis, calcari ſaccato. *Nepal.*

pag. 798.

Poſt n. 31. *Sieberiana* * 97. V. foliis longe petiolatis obovato ſubrotundis, dentatis glabris, ſcapo gracili 2bracteato, flore nutante, calcari breviſſimo. *Nov. Holl.* (V. ſpathulata Sieb.)

*acuta* Bigel. 98. V. foliis ovato-lanceolatis obtuſiusculis obſolete crenulatis baſi ſubdecurrentibus, ſtipulis lineari-lanceolatis, petalis acutis imberbibus, calcari breviſſimo. *Maſſachuſetts Amer. bor.*

*caeſpitoſa* Don. 99. V. foliis oblongis utrinque rotundatis glabris crenulatis, petiolis marginatis, ſcapis folia ſuperantibus, calycibus acutis, petalis obovatis integris, lateralibus barbatis. *Nepal.* (V. Patrini γ. Cand.)

pag. 800.

Poſt n. 55. *Riviniana* Reichenb. 100. V. caule erecto ramoſo foliis profunde cordato-ovatis crenatis ſupra pubeſcentibus, ſtipulis linearibus fimbriatis, pedunculis elongatis, appendicibus calycis ſuperioribus angulatis perſiſtentibus, fructibus acutis. *In nemoribus Europ.* (V. canina auctorum variorum.) V. canina L. vel maxime differt ſtipulis dentato-ſerratis, foliis minus cordatis et fructibus obtuſis. V. ſylveſtris Kit. minus ad V. caninam L. quam ad Rivinianam pertinet. Cf. Reichenb. ic. t. 75. 94. 95.

Poſt n. 56. *gracillima* Hilar. 101. V. caule filiformi erecto glaberrimo, foliis late cordatis obſolete dentatis ſubtus farinoſis, ſtipulis parvis ſubulatis, calycibus acuminatis, petalis imberbibus. *Braſil.*

*ſubdimidiata* Hilar. 102. V. cauleſcens glaberrima, foliis cordato-ovatis dentatis, ſtipulis oblongo-lanceolatis inciſi ciliatis, pedunculis folio brevioribus, calycibus acuminatis, petalis imberbibus. *Braſil.*

*cerastifolia* Hilar. 103. V. cauleſcens glaberrima, foliis lanceolatis acutis dentatis, ſtipulis oblongo-lanceolatis inciſis ciliatis baſi auriculatis, pedunculis folio brevioribus, calycibus acuminatis. *Braſil.* V. conferta Hilar. var.?

*Hamiltoniana* Don. 104. V. repens glaberrima, foliis reniformibus crenulatis, ſtipulis lanceolatis acutis dentatis, pedunculis folia ſubaequantibus, calycibus acutis calcari abbreviato. *Nepal.* (V. glandulifera Wallich.)

*arcuata* Blum. 105. V. decumbens glabra, foliis reniformi-orbiculatis acutiusculis ſerratis, venis pubeſcentibus ſtipulis ovato-oblongis ciliatis 3nerviis baſi ſubſerratis. *Java.*

*vilosa* Blum. 106. V. caule stolonifero, foliis cordatis crenulatis pilosiusculis, stipulis setaceo-incisis ciliatis. *Java.*

Ad V. *persicifoliam* Roth. (V. pratensis Mart. et Koch.)
Ad V. *Wallichianam* Ging. (V. reniformis Wall.)

pag. 802.

Ad V. *rubellam* Cav. (V. Chamissoniana Ging. in Linnaea p. 408.)

*tracheliifolia* Ging. 107. V. suffruticosa glabra, foliis breviter petiolatis cordato-ovatis acuminatis argute serratis, stipulis lanceolatis integerrimis. *Ins. Sandwich.* Chamisso.

pag. 803.

Ad *Soleam* *.

*Foliis alternis.*

Post n. 6. 7. *sylvatica* * 24. S. suffruticosa pubescens, foliis alternis ovatis acuminatis dentatis, stipulis linearibus integerrimis, pedunculis solitariis, calycibus acuminatis, labello subrhombeo mucronato. *Brasil.* (Ionidium Hilar.)

*bicolor* * 25. S. suffruticosa villosa, foliis alternis lanceolatis dentatis, stipulis linearibus integerrimis, floribus racemosis, labello rotundato mucronato. *Brasil.* (Ionidium Hilar.)

*lanata* * 26. S. suffruticosa lanata, foliis alternis ellipticis obtusis integerrimis mucronatis, stipulis scariosis, labello late obcordato. *Brasil.* (Ionidium Hilar.)

*Poaya* * 27. S. suffruticosa hirsutissima, foliis alternis subsessilibus subcordato-ovatis obsolete dentatis, stipulis scariosis, labello maximo obcordato. *Brasil.* (Ionidium Hilar. pl. us. brasil. t. 9.)

*scariosa* * 28. S. suffruticosa hirsuta, foliis alternis lanceolatis acuminatis serratis, stipulis lanceolatis scariosis, laciniis calycis pinnatifidis, labello orbiculari. *Brasil.* (Ionidium Hilar.) I. villosissimum Hilar. var.

*alba* * 29. S. suffruticosa pubescens, foliis alternis lanceolatis serrato-ciliatis, stipulis scariosis, calycibus ciliatis pilosis, labello rotundato. *Brasil.* (Ionidium Hilar.)

*setigera* * 30. S. suffruticosa, foliis alternis oblongo-lanceolatis acuminatis dentatis, stipulis multipartitis ciliato-setosis, laciniis calycis pinnatifidis, labello oblongo concavo 5nervio. *Brasil.* (Ionidium Hilar.)

*communis* * 31. S. suffruticosa herbacea pubescens ramosa, foliis alternis lanceolatis dentatis glabris, stipulis linearibus integerrimis, pedunculis subracemosis, labello ovato 5nervio. *Brasil.* (Ionidium Hilar.)

*nana* * 32. S. ſuffruticoſa pubeſcens, foliis alternis lanceolatis dentatis, ſtipulis linearibus, calycibus acuminatis, labello complicato obcordato. *Braſil.* (Ionidium Hilar.)

*guaranitica* * 33. S. ſuffruticoſa glabra, foliis alternis lanceolatis dentatis, ſtipulis linearibus, floribus pendulis calycibus acuminatis, labello orbiculari crenulato. *Braſil.* (Ionidium Hilar.)

*Foliis oppoſitis.*

*atropurpurea* * 34. S. ſuffruticoſa, foliis oppoſitis ovato-lanceolatis acutis obſolete ſerratis, ſtipulis caducis, floribus racemoſis, labello obcordato. *Braſil.* (Ionidium Hilar.)

*bigibboſa* * 35. S. fruticoſa pubeſcens, foliis oppoſitis oblongo lanceolatis acuminatis obſolete dentatis, calycibus acuminatis ciliatis, labello ſpathulato baſ bigibbo. *Braſil.* (Ionidium Hilar.)

*Herbaceae.*

*urticaefolia* * 36. S. ramoſa viſcoſo-pubeſcens, foliis ſubſeſſilibus ſubcordato-ovatis acutis ſerratis glabris, pedunculis paucifloris, calyce integerrimo, labello quadrato. *Braſil.* (Ionidium Mart.)

*brevicaulis* * 37. S. ſimplex, foliis petiolatis obovatis crenatis piloſiusculis, ſtipulis lanceolatis nervoſis, pedunculis axillaribus erectis, labello orbiculari. *Braſil.* (Ionidium Mart.)

pag. 804.

Ad *Soleam anomalam* * (Ionidium racemoſum Mart.)
*Soleam Ipecacuanham* *, laciniis calycis ſerrato-pinnatifidis, eamdem cenſet Hilarius ac Violam Itoubou Aubl. (Soleam n. 23.) Hilar. pl. uſ. braſil. t. 11.

pag. 805.

Ad *Noiſettiam* Humb.

*galeopſifolia* Hilar. 5. N. caule herbaceo glaberrimo ſubalato, foliis lanceolatis acutis ſerratis, floribus racemoſo-faſciculatis, petalo infero cucullato cuſpidato, calcari acutiuſculo. *Braſil.* (N. longifolia Nees.)

Exſulet N. *pyrifolia* Mart., quae

ANCHIETEA Hilar.,

ad quam *ſalutaris* Hilar. 2. A. fruticoſa erecta, foliis ovatis ſubdentatis glabris ſubtus reſinoſo-punctatis, ſtipulis ſcarioſis ciliatis, pedunculis aggregatis axillaribus nutantibus 1floris. *Braſil.* Hilar. pl. uſ. braſil. t. 19.

† *Roquefeuillana* * 3. A. fruticoſa ſcandens, foliis oblongo-lanceolatis acutis crenato-ſerratis, pedunculis ſubracemoſis, labello ſubrhombeo obtuſo. *Braſil.* (Noiſettia? Roquefeuillana Hilar.)

pag. 806.

Ad *Gloſſarrhenem floribundum* Mart. (Schweiggeria frutiooſa * N. E. 2. 167., floribunda Hilar. mém. du muſ. 11. t. 22. B.)

pag. 807.

Ad *Alſodeam* Thuars.

Poſt n. 12. 13. *caſtaneaefolia* * 17. A. foliis alternis oblongo-lanceolatis argute ſerratis mucronatis, racemis ſimplicibus, pedicellis pubeſcentibus. *Braſil.* (Conohoria Hilar.)

† *Cuſpa* * 18. A. arborea excelſa, foliis elliptico-oblongis obtuſis integerrimis glabris ſupra nitidis, ſummis oppoſitis, pedunculis ſimplicibus bracteatis. *Nov. Granat.* (Cuſpa Humb., Conoria Cuſpa Kunth.)

† *megapotamica* * 19. A. foliis elliptico-oblongis integerrimis venoſo-reticulatis ſubtus ſubpubeſcentibus, pedunculis cymiferis axillaribus 2ſidis, filamentis dorſo barbatis. *Rio grande.* Sello.

Ad A. *phyſiphoram* Mart. (Conohoria Lobolobo Hilar.)

Ad A. *Rinoream* * (A. paniculata Mart., Conohoria Rinorea Hilar.)

Poſt *Alſodeam*:

Amphirrhox *.

*longifolia* * *Braſil.* Frutex foliis oblongo-lanceolatis ſubdentatis glabris, floribus racemoſis albidis. (Spathularia longifolia Hilar. mém. du muſ. 11. t. 24.) Spathulariae genus jam adeſt vol. 4. p. 495.

Ad *Impatientem.*

Ad I. *faſciculatam* Lam. proxime accedit I. *ſetacea* Colebr. (Balſamina Hook. exot. fl. t. 137.) et I. *heterophylla* Wallich.

Ad I. *latifoliam* L. I. *mollis* Wallich. var.

pag. 808.

Poſt n. 18. *trilobata* Colebr. 24. I. pedunculis ſub-4floris patulis folia ſubaequantibus, foliis oblongo-lanceolatis ſerratis glabris, calcari conico acuminato incurvo. *Silhet, prov. Ind. or.*

Ad I. *ſcabridam* Wall. (I. Hamiltoniana Don.)

*criſtata* Wall. 25. I. pedunculis ſub-3floris petiolos aequantibus, foliis lanceolatis acuminatis ſetaceo-ſerratis pubeſcentibus, calcari incurvo pedicellum aequante. *Ad terminos Mongoliae.*

*urticaefolia* Wall. 26. I. pedunculis ſub-4floris filiformibus folia ſubaequantibus, foliis ovatis acuminatis glanduloſo-crenatis ſparſe piloſis nitidis, calcari amplo conico pedicellum aequante. *Emodi montes.*

*calycina* Wall. 27. I. pedunculis ſub-2floris, foliis alternis ovatis acuminatis argute ſerratis utrinque pubeſcenti-

bus, calycibus amplis villosis, calcari ascendente conicó pedicellos superante. *Nepal.*

*grandis* Heyn. 28. I. pedunculis 5floris, floribus maximis, calcari longissimo, foliis longe petiolatis ovatis acuminatis serratis. *Ind. or.*

Post n. 22. *sulcata* Wallich. 29. I. pedunculis oppositis multifloris folio brevioribus, foliis oppositis ovato-oblongis argute serratis, calcari incurvo, caule glabro profunde sulcato. *Emodi montes.*

*bicornuta* Wall. 30. I. pedunculis elongatis corymbiferis, floribus fasciculatis bracteatis, nectarii ore appendicula cornuta, calcari conico apice filiformi, foliis ovato-lanceolatis acuminatis serratis supra pubescentibus. *Nepal.*

*umbellata* Heyn. 31. I. pedunculis apice umbelliferis, calcari longissimo, foliis ovatis obtuse acuminatis crenatis. *Ind. or.*

*odorata* Don. 32. I. racemis corymbosis folio brevioribus, calcari pedicellos aequante, petalis lateralibus 2appendiculatis, foliis lineari-lanceolatis serratis glabris. *Nepal.*

Ad I. *leptoceras* Wall. (I. micrantha Don., longicornu Wallich.)

*fimbriata* Hook. 33. I. racemo terminali capitato, bracteis purpureo-fimbriatis, calcari subulato incurvo florem excedente, foliis oblongis acuminatis serrato-ciliatis. *Silhet, prov. Ind. or.* Hook. exot. fl. t. 146. (I. bracteata Colebr. in Roxb. fl. ind. 2. 459.)

*scapiflora* Heyn. 34. I. scapo corymbifero, calcari longissimo, foliis radicalibus cordato-subrotundis obtusis multinerviis integerrimis. *Ind. or.*

pag. 810.

Ad *Argophyllum* Forst.

*ellipticum* Labill. 2. A. foliis ellipticis obtusis integerrimis margine revolutis subtus rufo-tomentosis, floribus cymosis. *Nov. Caledon.* A. *nitidum* Forst. habet folia subserrata.

pag. 811.

Ad *Ribes.*

Post n. 22. *mexicanum* * 40. R. foliis subcordatis sub-5lobis subtus pubescentibus, lobis ovatis duplicato-serratis, petiolis basi glandulofo-ciliatis, racemis terminalibus bracteatis, calycibus campanulatis. *Mexico.* (R. multiflorum Kunth.)

*affine* Kunth. 41. R. foliis cordatis sub-5lobis subtus hirsutis, lobis obtusis duplicato-crenatis, racemis solitariis pendulis, calycibus campanulatis. *Mexico.* (R. campanulatum W. herb.)

*xorullense* Kunth. 42. R. foliis cordatis 5lobis subtus pubescentibus, lobis acutis duplicato-serratis, ramulis racemisque solitariis glandulosis, bracteis deciduis. *Mexico.* (R. ciliatum W. herb.)

*frigidum* Kunth. 43. R. foliis cordatis subrotundis 3lobis glanduloso-pilosis, lobis inciso-serratis, racemis reflexis, bracteis dentato-ciliatis, calycibus campanulatis, fructibus hispidis. *Quito.* (R. hirtum W. herb.)

*glaciale* Wall. 44. R. foliis cordato-subrotundis 5lobis sparse pilosiusculis, lobis acuminatis inciso-serratis, ramulis argenteo-nitidis, racemis erectis glanduloso-pubescentibus, bracteis ciliatis flores aequantibus, stylo elongato, fructibus glabris. *Emodi montes.*

*villosum* Wall. 45. R. foliis subcordato-subrotundis 3lobis obtusis resinosis pilosis, lobis serratis glanduloso-ciliatis, racemis erectis, bracteis flores superantibus, ramis fructibusque villosis. *Emodi montes.*

pag. 812.

Post n. 32. *microphyllum* Kunth. 46. R. spinis subsolitariis rectis, foliis parvis subreniformibus 5fidis supra pubescentibus subtus glabriusculis, pedunculis brevissimis 2floris, calycibus campanulatis. *Mexico.*

pag. 813.

Post *Strumpfiam*:

## SPHAEROCARYA Wallich.

*edulis* Wall. *Nepal.* Arbor foliis alternis oblongis acuminatis subcarnosis supra nitidis subtus reticulatis, floribus racemosis, fructibus edulibus.

Ad *Gouaniam.*

G. *tiliaefolia* Lam. (G. nepalensis Wallich.)

*striata* Rich. 7. G. foliis ovatis glabris nervosis crenatis emarginatis, ramis rhachibusque striatis. *Guiana.* (G. domingensis Aubl.?)

*smilacina* Sm. 8. G. foliis cordatis acutis serrulatis glabriusculis, stipulis subulatis, pedunculis umbellatis folia subaequantibus. *Brasil.?*

*cordifolia* Radd. 9. G. foliis cordato-ovatis serrulatis pilosiusculis, stipulis minutis, capitulis axillaribus terminalibusque hirtis. *Brasil.*

*corylifolia* Radd. 10. G. foliis subcordato-ovatis acutis subdenticulato-glandulosis subtus pubescentibus, racemis axillaribus terminalibusque longissimis. *Brasil.*

† *canescens* Rich. 11. G. foliis oblongo-lanceolatis acutis subtus incanis, racemis axillaribus terminalibusque. *Guiana.*

*stipularis* Cand. 12. G. foliis subcordato-ovatis acuminatis serratis glabriusculis, stipulis maximis semisagittatis acuminatis, fructibus 3alatis. *Mexico.*

*cyclocarpa* Sm. 13. G. foliis elliptico-oblongis acutis obsolete serratis, junioribus ferrugineo-sericeis, fructus alis angustis orbiculatis. *Ind. occ.?*

*aptera* Cand. 14. G. foliis subcordato-ovatis acutiusculis grosse dentato-serratis utrinque villosis, racemis axil-

laribus terminalibusque, fructibus subovatis apteris. *Amer. tropic.*

*denticulata* Sm. 15. G. foliis ovatis acuminatis apice denticulatis subtus hirsutis, racemis axillaribus, cirris terminalibus. *Ind. or.*

*Retinaria* Cand. 16. G. foliis ovatis acutiusculis subserratis subpubescentibus, racemis folia longe superantibus, fructibus triquetro-alatis. *Ins. Mascaren.* (Retinaria scandens Gärtn.) G. microcarpa Cand. var.

Post *Carpodetum* Forst.:

CRUMENARIA Mart.

*decumbens* Mart. *Brasil.* Planta annua, foliis subcordato-ovatis trinerviis, stipulis ciliatis, floribus axillaribus pedunculatis minutissimis.

Ad *Hederam.*

*Hainla* Don. 6. H. caule arboreo aculeato, foliis cordatis 5lobis dentatis coriaceis glabris, umbellis globosis racemoso-paniculatis. *Nepal.*

*fragrans* Don. 7. H. foliis ternatis glabris subtus glaucis, foliolis ovatis setaceo-serratis, umbellis compositis multiradiatis glabris. *Nepal.*

*tomentosa* Don. 8. H. foliis septenatis coriaceis subtus dense tomentosis, foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis, umbellis racemosis, caule arboreo inermi. *Nepal.*

*aculeata* Don. 9. H. foliis septenatis subtus pubescentibus, foliolis oblongis acuminatis serratis, umbellis racemosis tomentosis, caule arboreo aculeato. *Nepal*

*parasitica* Don. 10. H. foliis pinnatis 2jugis coriaceis glabris subtu glaucis, foliolis oblongis acutis integerrimis, umbellis racemosis glabris, caule radicante subparasitico. *Nepal.*

Ad H. *terebinthaceam* Vahl. (H. elata Don.)

pag. 814.

Ad *Celosiam.*

Post n. 9. *muricata* * 15. C. fruticosa ramosa glabra, foliis ovati acutis, spicis paniculatis, calycibus glomerat basi setosis. *Ind. orient.* (Achyranthes muricat L, Desmochaeta Cand., Cladostachys frutescen Don.)

*longifolia* Mart. 16. C. suffruticosa erecta, foliis lanceolatis acum natis glabris, floribus glomerato-capitatis, st gmatibus 4, 5. *Brasil.*

pag. 817.

Ad *Achyranthem.*

Post n. 12. *violacea* * 13. A. foliis lanceolato-linearibus pubescen tibus, corymbo laxo. *Nov. Holland.* (Aylmeri Mart.)

*rosea* * 14. A. foliis verticillatis linearibus subulatis, corymbis terminalibus compactis bracteatis. *Nov. Holl.* (Aylmeria Mart.)

*linearifolia* Sw. 15. A. caule diffuso glabrato, foliis linearibus integerrimis, capitulis oblongis axillaribus terminalibusque, floribus extus villosis. *Ins. Bartholom. in Caribaeis.* Act. holm. 1825. p. 428.

pag. 818.

Ad *Desmochaetam achyranthoidem* Kunth. (Pupalia densiflora Mart. nov. gen. t. 156.) *Brasil.*

Ad *Illecebrum.*

I. *iresinoides* * deleatur, rediturum ut *Pfaffia iresinoides* *.

Post n. 3. *pulverulentum* * 22. I. suffruticosum albido-tomentosum, foliis ovato-oblongis obtusis supra pulverulentis, floribus paniculatis, calycibus lanatis. *Peru.* (Trommsdorffia Mart.)

pag. 819.

I. *flavescens* * delendum, cum ad *Mogiphanem* Mart. pertineat.

Post n. 13. *maritimum* * 23. I. caule diffuso radicante, foliis spathulatis mucronatis glabris, floribus lateralibus aggregatis, calycibus acutis, squamulis stamina intercedentibus sub-3fidis. *Brasil.* (Bucholzia Mart.)

pag. 820.

Post n. 18. *triandrum* Hamilt. 24. I. caule repente 4gono laevi, axillis barbatis, foliis lanceolatis obtusis denticulatis glabris. *Nepal.* (Alternanthera prostrata Don.)

Ad I. *polygonoides.* (Bucholzia polygonoides Mart.)

Post *Illecebrum*:

GUILLEMINEA Kunth.

*Illecebrum* * *Quito.* Herba diffusa ramosissima, foliis oppositis (altero minore) spathulatis acutis glabris, petiolis vaginantibus, stipulis nullis, capitulis axillaribus subsessilibus. (Gu. illecebroides Kunth. in Humb. nov. gen. 6. t. 518. Illecebrum densum W. herb.)

Ad *Iresinem.*

I. *elatior* Rich. (Rosea elatior Mart. nov. gen. t. 155.) *Brasil.*

*angustifolia* Euphras. 9. I. herbacea erecta glabra, foliis lineari-lanceolatis denticulatis utrinque attenuatis, panicula ramosissima, spicis oblongis. *Ins. Bartholom. in Caribaeis.*

*paniculata* * 10. I. herbacea glabra ramosissima, geniculis barbatis, foliis oblongis integerrimis utrinque attenuatis laevibus, spicis paniculatis, calycibus trinerviis longissime lanatis. *Brasil.* (Hebanthe Mart.)

*ſpicata* * 11. I. herbacea ramoſa ſuperne ferrugineo-pubeſcens, foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſubtus denſe hirſutis, ſpicis ſubternis pedunculatis, calycibus 5nerviis longiſſime lanatis. *Braſil.* (Hebanthe Mart.)

*virgata* * 12. I. ſuffruticoſa erecta ramoſa, foliis ovato-oblongis acuminatis ſubtus ferrugineo-ſtrigilloſis, calycibus 3-5nerviis lanatis. *Braſil.* (Hebanthe Mart.)

*dysdicta* * 13. I. herbacea erecta ramoſa, foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus pubeſcentibus, floribus ſpicato-paniculatis, calycibus 3nerviis fulvo-villoſis. *Braſil.* (Trommsdorffia aurata Mart.)

pag. 823.

Ad *Gomphrenam.*

G. *gnaphaloides* Vahl. deleatur, redux *Pfaffia* Mart.
G. *braſilienſis* eſt *Mogiphanes* Mart.
G. *ſericea* *, *tuberoſa* * et *ſtenophylla* * ſunt *Pfaffiae* Mart.
Poſt n. 9. *macrocephala* Hilar. 27. G. hirſutiſſima, caule aſcendente, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis rufo-hirſutis, capitulo maximo terminali hemiſphaerico polyphyllo, foliolis longiſſimis, bracteis dentato-criſtatis. *Braſil.* Hilar. pl. uſ. braſil. t. 32.

*deſertorum* Mart. 28. G. caule erecto 2fido foliisque lanceolatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis elongatis, capitulis 2phyllis, bractearum carina demum criſtata. *Braſil.*

*leucocephala* Mart. 29. G. caule erecto tenero dichotomo, foliis lanceolatis ſubtus villoſis, capitulo 4phyllo, bracteis carina ſerrulatis, calycibus denſe lanatis. *Braſil.*

*eriophylla* Mart. 30. G. caule erecto ſimplici foliisque ovatis acutis denſiſſime tomentoſis, capitulis ſeſſilibus globoſis diphyllis, bracteis calyce brevioribus. *Braſil.*

*Schlechtendalii* Mart. 31. G. caule erecto hirſutiſſimo, foliis ovalibus obtuſis mucronulatis, capitulis ſeſſilibus, bracteis calycibusque ſerratis. *Braſil.*

*Hänkeana* Mart. 32. G. caule aſcendente ramoſo foliisque lanceolatis acutis villoſiuſculis, pedunculis elongatis ſolitariis, capitulis diphyllis. *Peru.*

*celoſioides* Mart. 33. G. caule aſcendente brachiato foliisque ovato-lanceolatis hirſutis, pedunculis terminalibus elongatis, ſpicis cylindricis 2phyllis. *Ad fl. Platam.*

*pulchella* Mart. 34. G. caule ramoſo aſcendente foliisque lanceolatis acutis ſtrigoſis, pedunculis elongatis, capitulis globoſis 2phyllis, bracteis calyce triplo brevioribus. *Monte Video.*

*villoſa* Mart. 35. G. caule ſimplici, foliis ovato-lanceolatis mucronulatis villoſis, capitulis globoſis 2phyllis bracteis calyce brevioribus. *Monte Video.*

*Selloi* * 36. G. caule erecto ſimplici foliato foliisque oblongis hirſutis, pedunculis elongatis, capitulo maximo 2-4phyllo, bracteis calycibusque ſerratis *Monte Video.*

*agrestis* Mart. 37. G. caule erecto simpliciusculo foliisque lanceolatis strigoso-villosis, capitulis subdiphyllis lateralibus terminalibusque, bracteis calycem subaequantibus. *Brasil.*

*nigricans* Mart. 38. G. caule simpliciusculo foliisque lanceolatis subtus villoso-lanatis, pedunculis elongatis strigosis, capitulis 2phyllis, bracteis calycem aequantibus. *Brasil.*

*scapigera* Mart. 39. G. hirsutissima, caule simplici erecto, superne aphyllo, foliis radicalibus lanceolatis, capitulis globosis 3-5phyllis, bracteis subcristatis calycem aequantibus. *Brasil.*

Post n. 11. *macrorrhiza* Mart. 40. G. radice napiformi, caule dichotomo, foliis lanceolatis subtus villosis, capitulis pedunculatis globosis, bracteis calyce brevioribus. *Brasil.*

*debilis* Mart. 41. G. caule erecto basi diviso, foliis lineari-lanceolatis subtus villosis, pedunculis elongatis filiformibus, capitulis globosis, bracteis foliaceis, calyce tomentoso brevioribus. *Brasil.*

*sericantha* Mart. 42. G. radice lignosa, caule erecto subsimplici, foliis lanceolatis subtus densissime tomentosis, summis verticillatis, pedunculis elongatis, calycibus sericeis. *Brasil.*

*mollis* Mart. 43. G. caule erecto diviso, foliis lanceolatis acutis incano-villosis subsericeis, bracteis ovatis calyce brevioribus. *Brasil.*

*rupestris* Nees. 44. G. caule erecto diviso, foliis linearibus acutis albo-villosis, pedunculis elongatis, capitulis globosis, bracteis calyce brevioribus. *Brasil.* (G. Schultesia Mart.)

*virgata* Mart. 45. G. caule ramoso virgato pubescente, foliis linearibus acutis glabris, capitulis spicatis alternis, bracteis calyce brevioribus. *Brasil.*

*vaga* Mart. 46. G. caule erecto dichotomo, foliis petiolatis ovato-oblongis acutis subtus arachnoideo-villosis, capitulis pedunculatis subternis, bracteis calyce brevioribus. *Brasil.*

*elegans* Mart. 47. G. caule erecto dichotomo ferrugineo-pubescente, foliis petiolatis oblongis subtus venosis flavido-villosis, capitulis pedunculatis globosis, bracteis calyce brevioribus. *Brasil.*

*incana* Mart. 48. G. caule erecto simpliciusculo superne aphyllo, foliis radicalibus oblongo-lanceolatis incano-villosis, capitulis axillaribus terminalibusque, bracteis calyce brevioribus. *Brasil.*

† *angustiflora* Mart. *49. G. glabra, caule gracili erecto ramoso angulato, foliis linearibus angustissimis glaucis, spicis sub-4stichis aphyllis laxis, bracteis brevissimis, calyce corollino tubuloso elongato. *Brasil.* Mart. nov. gen. t. 121.

pag. 824.

Post n. 21. *bicolor* Mart. 50. G. caule prostrato strigoso, ramulis fuscis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis, capitulis hemisphaericis sessilibus, foliis floralibus

apice sphacelatis, bracteis denticulato-alatis. *Brasil.*

*prostrata* Mart. 51. G. caule ramoso, foliis subcordato-ovatis acutis subtus villosis, capitulis globosis pedunculatis bracteis foliaceis calyce brevioribus. *Brasil.*

*demissa* Mart. 52. G. caule procumbente 2fido foliisque lanceolatis acutis subtus pubescentibus, capitulis 2phyllis, bracteis cristatis calyces aequantibus. *Brasil.*

G. *interrupta* habet stigma bilobum s. bifidum: ergo manet.

Post *Gomphrenam*:

## PFAFFIA Mart.

* *Capitulis subsolitariis.*

*gnaphalioides* Mart. 1. Pf. caule fruticoso foliisque ovato-oblongis mucronatis lanatis, capitulo globoso 2phyllo terminali. *Brasil. Monte Video.* (Celosia gnaphaloides L., Gomphrena gnaphaloides Vahl., lanata Poir.)

*puberula* * 2. Pf. caule erecto ramoso foliisque oblongis acuminatis subpubescentibus, capitulis ovatis aphyllis longe pedunculatis, calycibus pubescentibus. *Brasil. Nov. Granat.* (Brandesia puberula Mart. Achyranthes capituliflora Coll. hort. ripul. t. 18.)

*velutina* Mart. 3. Pf. caule simplici foliisque subrotundo-ovatis obtusis fulvo-villosissimis, capitulis ovatis pedunculatis subsolitariis. *Brasil.*

*tomentosa* Mart. 4. Pf. caule foliisque ovatis acutis subrepando-dentatis subtus albo-tomentosis, pedunculis simplicibus terminalibus elongatis, capitulis subglobosis. *Ad fl. Platam.* Sello.

*jubata* Mart. 5. Pf. villosissima, foliis lineari-lanceolatis, pedunculis simplicibus terminalibus, capitulis subglobosis. *Brasil.*

*glabrata* Mart. 6. Pf. caule ramoso glabro, nodis villosis, foliis lanceolatis acuminatis elongatis, pedunculis simplicibus axillaribus, capitulis ovato-globosis. *Brasil.*

** *Capitulis spicisve aggregatis.*

*villosa* * 7. Pf. caule erecto dichotomo foliisque sessilibus ovato-oblongis acutis subtus albo-villosis, capitulis subternis diphyllis, calycibus glabriusculis. *Brasil.* (Brandesia villosa Mart.)

*iresinoides* * 8. Pf. caule suffruticoso ramoso ferrugineo-hirsuto, foliis ovato-oblongis subtus fusco-sericeis, pedunculis ternis, capitulis ovatis minutis, calycibus longissime lanatis. *Nov. Granat.* (Alternanthera Kunth., Illecebrum iresinoides Syst. veg. 1. 818., Sertürnera Mart.)

*rufa* * 9. Pf. caule ramoso rufo-hirsuto, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis acutis hirsutis, pedunculis 3fidis, spicis ternis aphyllis oblongis. *Brasil.* (Brandesia rufa Mart.)

*sericea* Mart. 10. Pf. radice tuberosa, caule simpliciusculo superne nudo, foliis lanceolatis sericeis, pedunculis

3ſidis ſubcorymboſis, capitulis globoſis. *Braſil.* (Gomphrena ſericea et tuberoſa Syſt. veg. 1. 823.)

*hirtula* Mart. 11. Pf. pubeſcens, foliis linearibus, pedunculis terminalibus ſubternis, capitulis globoſis. *Braſil.*

*glauca* * 12. Pf. caule ramoſiſſimo foliisque lanceolatis glaucis glabriuſculis, pedunculis trichotomis paniculatis, capitulis minutis ovatis, floribus polygamis. *Braſil.* (Gomphrena ſtenophylla Syſt. veg. 1. 823., Ireſine glomerata N. Entd. 2. p. 110., Sertürnera glauca Mart.)

## Mogiphanes Mart.

*diffuſa* Mart. 1. M. caule erecto ramoſiſſimo foliisque ovato-lanceolatis glabriuſculis, pedunculis 3fidis, ſpicis cylindricis, bracteis calycibusque ariſtatis. *Braſil.*

*ramoſiſſima* Mart. 2. M. caule erecto ramoſiſſimo, ramis patulis foliisque lanceolatis acuminatis pubeſcentibus, capitulis oblongis pedunculatis ſolitariis aphyllis. *Braſil.*

*braſilienſis* Mart. 3. M. caule erecto ramoſo rufo-villoſo, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis pubeſcentibus, capitulis pedunculatis ovatis terminalibus. *Braſil.* (Gomphrena braſilienſis Jacqu., Philoxerus R. Br.) M. villoſa Mart. var.

*ſtraminea* Mart. 4. M. caule erecto ramoſo foliisque oblongis acuminatis pubeſcentibus, capitulis pedunculatis ovatis, ſepalis 3nerviis. *Braſil.* (Gomphrena braſilienſis L., patula Wendl.)

*multicaulis* Mart. 5. M. caule aſcendente ramoſiſſimo foliisque lanceolatis acutis ſubtus ſtrigilloſis, pedunculis ſubternis, capitulis oblongis baſi foliatis. *Braſil.*

*hirtula* Mart. 6. M. caule aſcendente diviſo foliisque ovatis acutis ſtrigilloſis, pedunculis ſolitariis elongatis, capitulis oblongis aphyllis. *Braſil. Monte Video.*

*flaveſcens* Mart. 7. M. caule ſubſcandente foliisque obovatis glabris, capitulis globoſis pedunculatis ſubſolitariis, calycibus glabris. *Nov. Granat.* (Alternanthera Kunth., Illecebrum Syſt. veg. 1. 819.)

## Hoplotheca Nutt.

*lanata* Mart. 1. H. caule erecto ſubramoſo, foliis oblongo-lanceolatis ſubtus ramisque ſericeo-villoſis, pedunculis elongatis, capitulis ſubrotundis ſeſſilibus. *Amer. auſtr.* (Gomphrena lanata Kunth., Humboldtiana R. et Sch.)

*lactea* Mart. 2. H. caule ſuffruticoſo erecto, foliis ovatis pubeſcentibus ſubtus albidis, ſpicis numeroſis paniculatis. *Amer. tropic.* (Gomphrena lactea Cand.)

*floridana* Nutt. 3. H. caule erecto ſimplici glanduloſo, foliis ſeſſilibus lanceolatis acutis ſupra papilloſo-ſcabris ſubtus denſe ſericeo-lanatis, panicula virgata,

spicis sessilibus. *Florida.* (Gomphrena Syst. veg. 1. 824.)

*tomentosa* Mart. 4. H. caule erecto villoso, foliis subrotundis obtusis subtus tomentoso-lanatis, spicis pedunculatis oppositis. *Ad fl. Platam.* Sello.

*sericea* Mart. 5. H. caule erecto foliisque lineari-lanceolatis acutis sericeo-villosis, spicis oppositis pedunculatis. *Brasil.* (Gomphrena sericea Hofmannsegg.)

Post *Anrederam*:

## BOUSSINGAULTIA Humb.

*basellоides* Kunth. *Quito.* Frutex volubilis, foliis alternis ovalibus carnosis integerrimis, floribus racemosis albidis. Humb. nov. gen. 7. t. 645. b.

### pag. 825.

Ad *Condaliam* Cav.

*spinosa* * 3. C. spicis axillaribus oppositis, foliis confertis subspathulato-linearibus glabris, pedunculis aggregatis nutantibus. *Rio grande.* Sello.

Post *Flüggeam* W.:

## LICANIA Aubl.

*incana* Aubl. *Guiana.* Arbor foliis alternis ovato-oblongis acuminatis integerrimis subtus incanis, stipulis linearibus acuminatis, floribus spicatis albis. (Hedycrea Schreb. W.)

### pag. 827.

Ad *Phylicam.*

Post n. 9. *squarrosa* Vent. 30. Ph. foliis lineari-lanceolatis patulis villosis subtus incanis, floralibus longioribus, capitulis florum subrotundis, laciniis calycis erectis acuminatis. *C. B. S.*

### pag. 828.

Post n. 22. *elliptica* Roxb. 31. Ph. foliis oppositis ellipticis rigidis subtus incano-villosis concavis, stipulis ovatis, capitulis pedunculatis axillaribus villosis. *Ins. Helenae.*

*ramosissima* Cand. 32. Ph foliis alternis lanceolatis acutis superne lucidis subtus incano-villosis revolutis, stipulis subulatis, floribus axillaribus subsessilibus. *Ins. Helenae.* (Ph. rosmarinifolia Roxb.)

Ad Ph. *plumosam.* (Ph. horizontalis Vent.)

### pag. 829.

Ad *Thesium.*

Post n. 4. † *divaricatum* Jan 26. Th. caule ramosissimo, ramis fructiferis divaricatis, foliis linearibus, bracteis

ternis carnofo-triquetris fubulatis, fructibus fubrotundis. *Ora maris adriatici. Hifpan. auftr.*

*roftratum* Mert. Koch. 27. Th. caule fimplici, foliis linearibus ínerviis, racemis fimplicibus demum comofis, bracteis folitariis, fructibus fubglobofis calyce duplo brevioribus. *Bavaria auftr.*

pag. 831.

Ad *Leptomeriam* R. Br.

Poft n. 2. *xiphoclada* Sieb. 9. L. ramis angulatis compreffis efquamatis, floribus glomeratis, bracteis caducis, laciniis calycis linearibus revolutis. *Nov. Holl.*

Ad *Hamiltoniam farmentofam* * (Comandra livida Richardf., non farmentofa.)

pag. 833.

Ad *Mufam.*

M. *rofacea* Jacqu. (M. ornata Roxb.)
M. *glauca* Roxb. (M. nepalenfis Wallich.)

pag. 834.

Ad *Heliconiam.*

*brafilienfis* Hook. 5. H. foliis cordato-oblongis acutis glabris, fcapo erecto, nectarii folio fuperiore convoluto. *Brafil.*

*buccinata* Roxb. 6. H. acaulis, foliis lanceolatis lucidis, fpadice centrali flexuofo pubefcente, fpathis bifariis divergentibus, nectario acuto. *Inf. Molucc.*

Ad *Rauwolfiam.*

*fumatrana* Jack. 12. R. foliis verticillatis petiolatis elliptico-oblongis integerrimis glaberrimis, pedunculis terminalibus umbelliferis, fauce corollae villis claufa. *Sumatra.* Malayan mifc. 1. n. 2. 22.

pag. 835.

Ad *Alyxiam* Banks.

A. *obtufifolia* R. Br. (A. lucida Wallich.) *Ind. or.*
A. *ftellata* R. et Sch. habitat et in *Inf. Molucc.*
A. *fcandens* R. et Sch. (A. coriacea Wallich.) *Inf. freti Malacc.*

*glaucefcens* Wallich. 8. A. foliis oppofitis oblongis coriaceis fupra nitidis fubtus glaucis, corymbis axillaribus multifloris, fauce corollae coronata. *Inf. freti Malacc.*

Ad *Melodinum* Forft.

*phillyreoides* Labill. 2. M. erectus, foliis oblongis obtufiusculis coriaceis, pedunculis trichotomis fubcorymbofis folia fuperantibus. *Nov. Caledon.*

*monogynus* Carey. 3. M. fcandens, foliis oblongo-lanceolatis elongatis glaberrimis, paniculae ramis oppofitis, floribus 1gynis. *Silhet, prov. Ind. or.* Bot. reg. 834.

pag. 843.

Ad *Hoyam* R. Br.

Post n. 1. †*pallida* Lindl. 7. H. foliis ovato-lanceolatis acuminatis carnosis venosis, umbella compacta, laciniis corollae obtusiusculis. *Patria?* Bot. reg. 951.

†*lanceolata* Wall. 8. H. foliis lanceolatis acuminatis, umbellis paucifloris, laminis gynostegii lineari-oblongis obtusis subtus sulcatis. *Nepal.*

†*linearis* Wall. 9. H. foliis linearibus obtusis carnosis utrinque cauleque filiformi dense pilosis. *Nepal.*

Ad *Pergulariam.*

Post n. 4. *sanguinolenta* Lindl. 14. P. foliis ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis, cymis multifloris folio brevioribus, calycibus tubum corollae intus glabrae aequantibus. *Senegambia.* Bot. mag. 2532.

pag. 846.

Ad *Gonolobum* Mx.

Post n. 22. *floccosus* Bertol. 26. G. foliis cordatis acuminatis subtus tomentosis, floribus glomeratis, folliculis echinatis. *Guadalupa.*

pag. 848.

Ad *Asclepiadem.*

Post n. 24. *melliodora* Hilar. 39. A. caule simplici erecto, foliis petiolatis linearibus elongatis acutis subtus pubescentibus, umbellis lateralibus multifloris. *Rio grande.*

pag. 851.

Ad *Macroscepim longifloram* * (Schubertia longiflora Mart.) *Brasil.*

Ad *Cynanchum.*

Post n. 2. *longifolium* Martens. 33. C. herbaceum volubile, foliis cordatis acuminatis nervosis, laciniis corollae acutis, coronae exterioribus denis alternatim lanceolatis acutis et subcrenatis obtusis. *Ager venetus.*

pag. 852.

Post n. 22. *multiflorum* * 34. C. volubile hirsutum, foliis cordato-oblongis acutis utrinque pubescentibus, umbellis multifloris, laciniis coronae cum antheris appendiculatis ope calli cohaerentibus. *Brasil.* (Schubertia multiflora Mart.)

pag. 853.

Poſt *Cynanchum:*

## DITASSA R. Br.

* *Erectae.*

*decuſſata* Mart. 1. D. foliis adnatis confertis cordato-ovatis revolutis rugoſis hirtis, pedunculis multifloris ſubcymoſis. *Braſil.* D. paſſerinoides Mart. var.

*acerofa* Mart. 2. D. foliis oppoſitis verticillatisque linearibus ſubulatis villoſis, floribus umbellatis. *Braſil.*

*laevis* Mart. 3. D. ſuberecta, ramis laxis, foliis breviter petiolatis lineari-lanceolatis mucronatis utrinque glabris, umbellis multifloris, pedicellis flore brevioribus. *Braſil.*

** *Volubiles.*

*obcordata* Mart. 4. D. foliis petiolatis obcordato-ſubrotundis mucronatis reflexo-complicatis, floribus ſubſolitariis. *Braſil.*

*mucronata* Mart. 5. D. foliis breviter petiolatis oppoſitis ovato-lanceolatis mucronatis revolutis pubeſcentibus, floribus umbellatis. *Braſil.*

*retuſa* Mart. 6. D. foliis petiolatis obovatis retuſis mucronatis glabris margine planis, floribus umbellatis. *Braſil.*

*linearis* Mart. 7. D. foliis breviter petiolatis linearibus mucronatis planis glabris, umbellis paucifloris, pedicellis flores aequantibus. *Braſil.*

pag. 854.

Ad *Oxypetalum* R. Br.

* *Volubilia.*

*riparium* Kunth. 1. }
*Gothofreda* R. et Sch. 2. } v. p. 854.

*Bankſii* R. et Sch. 3. O. foliis cordato-ovatis acutis pubeſcentibus, pedunculis multifloris, laciniis corollae reflexis, retinaculis antherarum apice nudis. *Braſil.* Mart. nov. gen. t. 29.

*appendiculatum* Mart. 4. O. foliis cordato-oblongis acutis pubeſcentibus, cymis ſub-4floris, laciniis corollae erecto-patentibus, retinaculis antherarum apice membranaceo-appendiculatis. *Braſil.*

*megapotamicum* * 5. O. foliis cordato-lanceolatis acuminatis laevibus, pedunculis cymoſis incano-pubeſcentibus. *Rio grande.*

*Berterianum* * 6. (n. 3. ſyſt.)

*montanum* Mart. 7. O. foliis lanceolatis acutis, pedunculis multifloris, laciniis corollae ſurſum reflexis, foliolis coronae acutis, retinaculis apice ſagittato-dilatatis. *Braſil.*

** *Erecta herbacea.*

*folioſum* Mart. 8. O. foliis cordato-ovatis ſubſeſſilibus confertis, pedunculis multifloris, laciniis corollae erectis, foliolis coronae bilobis. *Braſil.*

*erectum* Mart. 9. O. foliis cordato-ovatis acutis pubescentibus, pedunculis 1floris, laciniis corollae patentibus, foliolis coronae 2dentatis. *Brasil.*

*strictum* Mart. 10. O. foliis cordato-lanceolatis subsessilibus, pedunculis 1floris, foliolis coronae 3fidis, antherarum membrana elongata. *Brasil.*

*capitatum* Mart. 11. O. foliis lanceolatis acutis villosis, floribus in umbellam globosam congestis, foliolis coronae bifidis. *Brasil.*

pag. 855.

Post *Araujam* Brot.:

PHYSIANTHUS Mart.

*albens* Mart. 1. Ph. volubilis pubescens, foliis basi truncata oblongis subtus albo-pruinosis, cymis dichotomis, lobis coronae integerrimis. *Brasil.*

*megapotamicus* * 2. Ph. volubilis glaber, foliis sagittato-cordatis acuminatis, pedunculis 1floris, lobis coronae denticulatis. *Rio grande.* Sello.

Ad *Astephanum cubensem* Kunth. (Periploca parviflora W. herb., Humboldtiana R. et Sch.)

pag. 856.

*Ad Gentianam.*

Post n. 4. *volubilis* Don. 70. G. volubilis, foliis petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis 3nerviis, floribus axillaribus solitariis, laciniis calycis lineari-subulatis, corollae campanulatae ovatis acutis, antheris ovalibus. *Nepal.*

*capitata* Hamilt. 71. G. erecta simplex, foliis ovali-oblongis mucronatis enerviis, floribus terminalibus sessilibus aggregatis bracteatis, laciniis calycis membranaceis ovatis acutis, corollae tubulosae rotundatis. *Nepal.*

G. *unalascensis* Ledeb. hinc ad p. 859. post n. 56. est transferenda.

pag. 857.

Post n. 23. *depressa* Don. 72. G. acaulis, foliis confertis elliptico-oblongis acutis cartilagineo-serratis, flore solitario sessili, laciniis calycis corollaeque campanulatae ovatis mucronatis. *Nepal.*

pag. 858.

Post n. 43. *Gebleri* Ledeb. 73. G. caule simplici erecto, foliis lineari-lanceolatis elongatis, floribus aggregatis terminalibus, corolla campanulata sulcata. *Imaus.* Reichenb. ic. t. 271.

pag. 859.

Post n. 62. *decemfida* Don. 74. G. caule ramoso diffuso, foliis radicalibus elliptico-oblongis mucronatis, caulinis,

linis minimis lineari-lanceolatis carinatis apice reflexis, floribus terminalibus subsolitariis, laciniis calycis lanceolatis recurvato-mucronatis, corollae alternis crassioribus aristatis. *Nepal.*

Post n. 56. *plebeja* Ledeb. 75. G. caule simplici teretiusculo, foliis ovatis acutiusculis sub-5nerviis, laciniis calycis latitudine inaequalibus, corollae erectis. *Sibir.*

*aleutica* Chamiss. 76. G. caule 4gono subramoso, foliis lanceolatis amplexicaulibus, floralibus elongatis, laciniis corollae hypocrateriformis 4-(sub-5-)fidae lanceolatis apice denticulatis. *Ins. Aleut.* (G. unalascensis Ledeb. Syst. veg. 1. p. 856.)

*Rurikiana* Chamiss. 77. G. caule 4gono ramoso, foliis lanceolatis sub-3nerviis, floribus longe pedunculatis, laciniis calycis inaequalibus, corollae setaceo-acuminatis. *Ad oras freti Bering. Asiae et Amer. arctic.*

pag. 860.

Post n. 64. *floribunda* Don. 78. G. caule erecto tereti ramoso, foliis connatis lanceolatis acutis pubescentibus, floribus racemosis, corollae villosae laciniis ovatis acutis. *Nepal.*

Ad G. *Amarellam.* G. lancifolia Pers., obtusifolia Reichenb., spathulata Bartl., montana Nees. varr.

pag. 861.

Ad *Swertiam.*

Post n. 6. †*angustifolia* Don. 17. Sw. caule erecto 4gono ramosissimo, foliis lineari-lanceolatis acutis 3nerviis, floribus pedunculatis, laciniis calycis linearibus acutis corolla longioribus. *Nepal.*

*multicaulis* Don. 18. Sw. caulibus caespitosis, foliis spathulato-lanceolatis, pedunculis 1floris, laciniis calycis ovalibus obtusis corolla brevioribus. *Emodi montes.*

pag. 862.

Ad *Evolvulum hirsutum.* E. *heterophyllus* Labill. t. 29. *Nov. Caledon.* var.

pag. 863.

Post *Reinwardtiam:*

## NEUROPELTIS Wallich.

*racemosa* Wall. *Ins. freti Malacc.* Frutex diffusus, foliis petiolatis ternatis ovatis acutis carnosis, floribus racemosis, bracteis orbiculatis membranaceis reticulato-venosis.

pag. 864.

Ad *Cuſcutam.*

Ante n. 1. *Epilinum* Weih. 22. C. caule ſimplici, glomerulis florum ebracteatis, corolla urceolata, dentibus abbreviatis, ſquamis appreſſis, ſtaminibus incluſis. *Ad Linum in Germania.*

Ad C. *monogynam* Vahl. dele patriam *Europ.* et ſyn. C. Epilinum Weih.

pag. 865.

Ad *Hydroleam.*

Poſt n. 3. *megapotamica* * 7. H. caule herbaceo glanduloſo-villoſo, foliis lanceolatis utrinque attenuatis hirſutis, corymbis terminalibus. *Rio grande.* Sello.

pag. 866.

*Banffya* Baumg. delenda, redit ſyſt. 2. 373., *Gouffeia* vero Cand. cum *Brachyſtemmate* Don. ſyſt. 2. 399.

pag. 867.

Ad *Panacem.*

Poſt n. 6. *glabratus* Kunth. 10. P. arboreus, foliis quinatis glabris, foliolis oblongis utrinque attenuatis integerrimis, umbellulis ſub-8carpis racemoſo-paniculatis. *Nov. Granat.*

P. *ſplendens* Kunth. neutiquam ad P. *ſpecioſum* pertinet, cum foliola habeat argute duplicato-dentata ſupra hiſpidula ſubtus argenteo-ſericea, ſed dubia ſpecies, cum nec flores nec fructus affuerint.

*vinoſus* Schlechtend. 11. P. arboreus, foliis ſubſeptenatis ſubtus racemisque ferrugineo-ſericeis, foliolis obovato-oblongis mucronatis revolutis integerrimis, umbellis paniculatis. *Braſil.* Sello.

*macrocarpus* Schlechtend. 12. P. arboreus, foliis ſubſeptenatis ſubtus ochraceo-tomentoſis, foliolis obovato-ellipticis integerrimis revolutis, umbellis paniculatis. *Braſil.* Sello.

Poſt *Picramniam* Sw.:

MENISCOSTA Blum.

*ſcandens* Blum. *Java.* Frutex ſcandens glaber, foliis oblongis mucronatis, floribus paniculatis axillaribus.

pag. 868.

XANTHOSIA Rudg.

*piloſa* Rudg. 1. X. foliis lanceolatis ſinuato-dentatis ſubtus denſe ſtellato-tomentoſis, ramis hirtis. *Nov. Holl.*

*montana* Sieb. 2. X. foliis 3fidis ſupra hiſpidiuſculis ſubtus ſtellato-tomentoſis, ramis hiſpidiuſculis flexuoſis. *Nov. Holl.*

DULONGIA Kunth.

*acuminata* Kunth. *Popayan in Columbia.* Arbuscula foliis membranaceis oblongis acutis apice ſerratis, e quorum nervo medio pagina ſuperiore racemuli florum naſcuntur. Humb. nov. gen. 7. t. 623. (Phyllonoma ruſcifolia W. herb.)

pag. 869.

Ad *Eryngium.*

Poſt n. 11. *pandanifolium* Schlechtend. 56. E. foliis linearibus obſolete denticulato-ſpinuloſis, caule paniculato polycephalo, capitulis ovatis coloratis inermibus, paleis ovatis acuminatis calycibusque laevibus. *Ad fl. Platam.* Sello.

*Priſtis* Schlechtend. 57. E. foliis linearibus anguſtiſſimis ſtrictiſſimis duplicato-ſpinoſo-ciliatis, caule paniculato polycephalo, paleis ſubulato-ſpineſcentibus calycibusque ſcabris. *Rio grande.* Sello.

*canaliculatum* Schlechtend. 58. E. foliis linearibus canaliculatis nitidis horizontaliter ſpinoſo-ciliatis, caule paniculato polycephalo, capitulis globoſis ſubinermibus, involucris connatis, bracteis calycibusque laevibus. *Braſil.* Sello.

*Sanguiſorba* Schlechtend. 59. E. foliis enſiformi-linearibus obtuſiusculis retrorſum ciliatis, capitulis paucis coloratis, paleis ſubulatis rigidis calycibusque laevibus. *Rio grande.* Sello.

*luzulaefolium* Schlechtend. 60. E. foliis linearibus acutis denticulatis baſi ſetoſo-ciliatis, capitulis paucis inermibus globuloſis, paleis calycibusque ſcabriusculis. *Braſil.* Sello.

*junceum* Schlechtend. 61. E. foliis linearibus anguſtiſſimis acutis canaliculatis ſubdenticulatis, capitulis paucis globoſis ſubinermibus, involucris connatis, paleis calycibusque laevibus. *Braſil.* Sello.

*eriophorum* Schlechtend. 62. E. foliis linearibus inermibus integerrimis obtuſis baſi villoſo-fimbriatis, capitulis paucis ovato-globoſis inermibus coloratis, paleis elongatis calycibusque laevibus. *Ad fl. Platam et magnum Amer. auſtr.* Sello.

pag. 871.

Poſt n. 26. *floribundum* Schlechtend. 63. E. foliis enſiformibus acuminatis ſpinuloſo-ſerratis ciliatis, caule polycephalo, paleis ſubulatis ſcabris. *Braſil.* Sello.

*Serra* Schlechtend. 64. E. foliis enſiformibus ſpinoſo-ſerratis ciliatis, caule polycephalo, involucris ſpinoſo-dentatis, paleis ſubulatis laevibus. *Monte Video.* Sello.

*uncinatum* Schlechtend. 65. E. foliis ſpathulato-lanceolatis recurvo-ſpinoſo-dentatis, capitulis paucis, involucris ſpinoſo-pinnatifidis, paleis tricuſpidatis ſcabris. *Braſil.* Sello.

*elegans* Schlechtend. 66. E. radice globoſa, foliis lineari-lanceolatis tricuſpidatis ſpinoſo-ciliatis, caule polycephalo, involucris paleisque tricuſpidatis. *Monte Video. Rio grande.* Sello.

*ciliatum* Schlechtend. 67. E. radice craſſa, foliis obovato-lanceolatis pectinato-fimbriato-ciliatis, capitulis pauciſſimis ovalibus coloratis, paleis ſubulatis laevibus. *Rio grande.* Sello.

pag. 874.

Ad *Saniculam*.

S. *marilandica*. (S. liberta Schlechtend.)

†*hermaphrodita* Don. 4. S. foliis ternatis glabris, foliolis ovatis utrinque attenuatis lobatis ſerratisque, umbella 3fida ſub-5flora, floribus omnibus ſeſſilibus. *Nepal.*

*elata* Don. 5. S. foliis ternatis tripartitisve glabris, foliolis late ovatis acutis baſi cuneatis lobatis ſerratisque, umbellis 3fidis, floribus ♂ pedicellatis. *Nepal.*

Ad *Pozoam coriaceam* Lag. (Aſteriſcium chilenſe Chamiſſ. in Linnaea p. 354. l. 254.) *Chili.*

pag. 875.

Ad *Hydrocotylen*.

H. *umbellata*. (H. modeſta Schlechtend.)

Poſt n. 10. *Barbaroſſa* Schlechtend. 61. H. foliis orbiculatis 8lobis crenatis rufo-hirſutis, umbellis longe pedunculatis multifloris, caule radicante. *Braſil.*

*Aſterias* Schlechtend. 62. H. foliis petiolatis 3-5lobis piloſiuſculis, lobis lanceolatis duplicato-ſerratis, umbellis longe pedunculatis multifloris, fructibus tuberculatis, caule decumbente. *Braſil.*

Ad H. *aſiaticam*. (H. Thunbergiana * n. 22.)

pag. 876.

Poſt n. 19. *leucocephala* Schlechtend. 63. H. foliis reniformi-orbiculatis ſub-9nerviis duplicato-dentatis utrinque piloſiuſculis, umbellis globoſis multifloris, fructibus laevibus, caule radicante. *Braſil.*

Ad H. *capitatam* Thuars. (H. hiſpida Hamilt. Don.)

pag. 877.

Ad H. *macrodontem* * H. calliodus Schlechtend. var. glabra.

Poſt n. 36. *Chamaemorus* Schlechtend. 64. H. foliis reniformibus ſub-7lobis nervoſis duplicato-crenatis glabris, pedunculis brevibus petiolisque retrorſum hiſpidis, umbellis capitatis multifloris, fructibus reſinoſo-punctatis, caule repente. *Chili.* Chamiſſo.

Ad H. *ſibthorpioidem* Lam. (H. tenella Don.) *Nepal.*

pag. 878.

Ad H. *plantagineam* * (H. montana Schlechtend.)

pag. 879.

Ad *Trachymenem* Rudg.

*ericoides* Sieb. 6. Tr. foliis linearibus acutis ſubcarnoſis patentibus, ramulis flexuoſis hirſutiuſculis, umbellis paucifloris ſubcompoſitis. *Nov. Holl.*

*buxifolia* Sieb. 7. Tr. foliis subcordato-ovatis 3nerviis subsessilibus, umbella decomposita, caule fruticoso. *Nov. Holl.*

pag. 880.

Ad *Bowlesiam* R. et P.

*geraniifolia* Schlechtend. 6. B. stellato-pubescens cinerea, foliis cordato-reniformibus 7lobis, lobis obtusis 3dentatis, pedunculis abbreviatis trifloris, caule erecto. *Chili.* †

Ad *Bupleurum.*

B. *arborescens* L. (Heteromorpha arborescens Schlechtend.)

pag. 881.

Post n°. 7. *Mundtii* Schlechtend. 34. B. suffruticosum ramosissimum, foliis lineari-setaceis elongatis, umbellis 2-3radiatis, involucellis 5phyllis umbellulas aequantibus, fructibus laevibus. *Afric. austr.*

pag. 882.

*Odontites* 26. B. caule ramoso, ramis divaricatis, foliis linearibus 3nerviis, involucellis lanceolatis cuspidatis elongatis pellucidis nervoso-venosis. *Sicilia. Neapol. Gallia austr.* (B. divaricatum α. Lam., veronense Turr., Gerardi Pollin.)

*aristatum* Bartl. Reichenb. 35. B. caule erecto ramoso, ramis patulis, foliis lineari-lanceolatis 3nerviis, involucellis ovato-lanceolatis aristatis opacis 3nerviis subvenosis. *Europ. austr.* (E. baldense Turr.)

*glumaceum* Sibth. Sm. 36. B caule gracili erecto ramoso, foliis linearibus angustissimis, involucellis ovatis pellucidis cuspidatis 3nerviis eveniis. *Graecia. Creta.* (B. gracile Urv.)

*junceum* 37. B. caule ramoso paniculato, foliis amplexicaulibus lineari-lanceolatis acuminatis striatis, involucris umbellae pauciradiatae inaequalibus, involucellis lineari-subulatis pedicellisque fructu brevioribus, costis acutis. *Ad mare adriatic. Gallia. Italia.*

*Gerardi* Jacqu. 38. B. caule ramoso paniculato, foliis amplexicaulibus linearibus 3-5nerviis, umbellae radiis quinis inaequalibus, involucellis linearibus cuspidatis subaequalibus umbellulas superantibus, pedicellis fructus aequantibus, costis acutiusculis. *Gallia. Italia. Austria.*

*baldense* Host. 39. B. caule ramoso, foliis lineari-lanceolatis acuminatis 5nerviis, involucellis linearibus cuspidatis pedicellisque fructus subaequantibus, costis subalatis, valleculis striatis. *Austria. Hungaria. Transsylvan. Tauria.*

pag. 883.

Ad B. *tenuissimum*. (B. junceum Pollich., Pollichii Gmel.)

† *tenue* Hamilt. 40. B. caule gracili ramoso, foliis linearibus mucronatis 5nerviis, supremis lanceolatis, umbellis sub-4fidis, involucellis ellipticis mucronatis fructus subaequantibus. *Nepal.*
Don.

Ad *Hermada*.

*rudissima* Reichenb. 6. H. foliis radicalibus obovato-oblongis lobata spinuloso-ciliatis venosis subtus asperis, petiolis crassis vaginantibus, umbellis compositis longe pedunculatis. *C. B. S.* (*Lichtensteinia lacera* Schlechtend. in Linnaea, 1. p. 394.)

pag. 884.

Ad *Seseli varium* Trevir. patria *Austria*.

pag. 885.

Ad *Seseli dubium* Schk. (Selinum lineare Schum., Cnidium venosum Koch.)

pag. 886.

Ad *Sisonem*.

Post n. 4. † *trinervius* Hamilt. Don. 16. S. caule erecto tereti nudiusculo, foliis radicalibus pinnatis glabris, foliolis lanceolatis acutis integerrimis 3nerviis, involucro 5phyllo, involucellis lanceolatis aristatis. *Nepal.*

pag. 887.

Post n. 9. † *Gussonii* * 17. S. caule simpliciusculo, foliis oppositis sessilibus 3partitis glabris, laciniis oblongis acutis mucronato-dentatis, pedunculis 2fidis, involucro 2phyllo exili, flosculis ♂ pluribus, umbella pauciflora. *Patria?*

pag. 888.

Ad *Cnidium* Cusson.

Ad Cn. *Silaum* * (Silaus pratensis Bess. Koch.)

Post n. 10. *suffruticosum* Schlechtend. 11. Cn. caule suffruticoso ramoso, ramis rigidis teretibus, foliis petiolatis 2pinnatis succulentis glabris, foliolis oblongis obtusiusculis incisis, involucris sub-3phyllis, fructibus ovalibus laevibus 5alatis. *C. B. S.* (Conium suffruticosum Berg.)

pag. 890.

Ad *Oenanthem interruptam* Thunb. (Annesorrhiza capensis Schlechtend.)

Ad *Oenanthem inebriantem* Thunb. (Lichtensteinia pyrethrifolia Schlechtend.)

Ad *Oenanthem obscuram* * (Lichtensteinia? 3fida Schlechtend.)
Ad *Meum heterophyllum* Mönch. (Critamus heterophyllus Koch.)

pag. 891.

Ad *Meum inundatum* * (Helosciadium inundatum Koch.)

pag. 892.

Ad *Cachryn alatam* M. B. Affinis est Prangos pabularia Lindl. ex India septentrionali, diversa foliis glabris. Quarterly journ. of scienc. vol. 18. n. 37.

pag. 895.

Ad *Thysselium palustre* Hofm. (Peucedanum palustre Mönch. Koch.)
Ad *Caucalin grandifloram*. (Orlaya Hofm., Platyspermum Koch.)

pag. 898.

Ad *Daucum*.

*montevidensis* Link. 17. D. caule erecto foliisque decompositis hirsutis, foliolis linearibus abbreviatis, involucro foliaceo decomposito umbellam superante, partialibus 3fidis, floribus exiguis albidulis, fatis fructuum glochidatis. *Monte Video*.

† *depressus* * 18. D. acaulis, foliis radicalibus 2pinnatis pubescentibus, foliolis multipartitis tenuissimis, laciniis linearibus mucronatis, scapis caespitosis filiformibus villosis folia superantibus, involucro sub-5phyllo pinnatifido. *Emodi montes*. (Athamanta depressa Don.)

Ad *Torilin* Gärtn.

† *elata* * 10. T. caule elato ramoso tereti retrorsum hispido, foliis longe petiolatis decompositis, foliolis lanceolatis pinnatifidis, extremis elongatis, involucro polyphyllo, fructibus ovatis setosis. *Nepal* (Caucalis elata Don.)

pag. 899.

Ad *Athamantam*.

*gigantea* Don. 9. A. caule elato sulcato ramoso, foliis supradecompositis glabris, foliolis ovatis inciso-serratis aristatis, involucro polyphyllo, fructibus ovatis pubescentibus. *Nepal*.

Ad A. *Libanotida*. (Seseli Libanotis Koch.) (Ligusticum Gmelini Chamiss. Gmel. sib. 1. t. 44. olim L. vaginatum mihi, est varietas polymorphae hujus speciei.)

Ad A. *Matthioli* Wulf. (Pimpinella anethifolia Don.) *Nepal*.

Post *n*. 5. † *teres* Don. 10. A. caule simplici stricto tereti laevi, foliis bipinnatis glabris, foliolis pinnatifidis, laciniis linearibus acutis canaliculatis, involucro 5phyllo brevi, involucellis polyphyllis radios aequantibus. *Nepal*.

pag. 900.

Ad *Athamantam tortuosam* * (Bubon aphyllus Schlechtend.) *C. B. S.*

pag. 901.

Ad *Scandicem.*

*brachycarpa* Gusson. 7. Sc. caule humili ramoso, ramis divaricatis, foliis ternato-decompositis glabris, foliolis linearibus obtusiusculis ciliatis, fructibus subcylindricis, stylis convergentibus. *Sicil.*

pag. 902.

Ad *Myrrhida.*

Post n. 10. *longistylis* Torr. 23. M. caule erecto laevi, foliis 2ternatis, foliolis ovatis inciso-lobatis dentatis, umbella 3-4radiata, involucro sub-3phyllo, fructibus hispidis basi attenuatis, stylis strictis elongatis. *Nov. Caesar.*

pag. 903.

Post n. 20. *gracilis* * 24. M. caule laevi ramoso, foliis triplicato-pinnatifidis, foliolis lanceolato-linearibus acutis, involucellis 5phyllis, fructibus ovato-oblongis acutangulis. *Patria?* (Chaerophyllum Cyminum Fisch., gracile Bess. Trevir.)

pag. 905.

Ad *Sium.*

S. *lancifolium* M. B. habet ramos sulcatos.

Ad S. *angustifolium.* (Berula angustifolia Koch.)

Ad S. *nodiflorum* et *repens.* (Helosciadium Koch.)

*crassipes* * 26. S. caule basi radicante ascendente, foliis pinnatis, foliolis ovatis dentatis, umbellis 3fidis, pedicellis demum basi incrassatis connatis. *Corsica.* (Helosciadium Koch. Reichenb. ic. t. 218.)

Ad S. *Falcariam.* (Critamus agrestis Bess. Koch.)

pag. 906.

Ad S. *Bulbocastanum* * (Carum Bulbocastanum Koch.)

pag. 907.

Ad *Conium.*

*Arracacha* Hook. 3. C. caule tereti striato glabro, foliis impari-pinnatis amplis laevibus, foliolis bijugis late ovato-oblongis pinnatifidis inciso-serratis, involucro nullo, involucellis oligophyllis, flosculis centralibus sessilibus abortientibus. *Ad Bogotam Nov. Granat.* Hook. exot. fl. t. 152.

Ad *Ligusticum.*

Post n. 4. †*nepalense* Don. 22. L. caule erecto simplici, foliis pinnatis, foliolis ovatis utrinque attenuatis inciso-

serratis nervosis, infimis 3partitis, involucellis polyphyllis. *Nepal.*

Ad L. *peloponnesiacum* Scop. (Molopospermum Koch.)

Ad L. *Cervariam* * (Peucedanum Lapeyr. Koch.)

pag. 909.

Ad *Selinum.*

Ad S. *austriacum* Jacqu. et *Oreoselinum* Scop. (Peucedanum Koch.)

S. *lineare* Schum. huc non pertinet sed ad *Seseli dubium* Schk. p. 885. Hujus loco ponendum S. *rablense* * (Peucedanum Koch.)

pag. 910.

Post n. 14. †*stellatum* Don. 17. S. caule erecto ramoso, foliis pinnatis glabris, foliolis ovatis mucronatis 3lobis inciso-dentatis, involucro sub-2phyllo, radiis umbellae pubescentibus, involucellis maximis coloratis. *Nepal.*

pag. 911.

Ad *Peucedanum.*

Post n. 12. †*virgatum* Schlechtend. 18. P. caule fruticoso ramoso, *foliis pinnatis glabris subcoriaceis, foliolis lanceolatis* integerrimis margine revolutis mucronatis, involucris abbreviatis polyphyllis. *C. B. S.*

pag. 912.

Ad *Heracleum.*

H. *asperum* M. B. in *alpibus bavaricis* inventum fertur.

Post n. 8. *nepalense* Don. 18. H. caule elato sulcato hirsuto, foliis 2jugis villosis, foliolis lobatis obtusis serratis, floribus flavidis aequalibus. *Emodi montes.*

pag. 913.

Ad *Pastinacam.*

Post n. 5. *ambigua* Torr. 11. P. caule elato subangulato, foliis pinnatis glabris, foliolis linearibus subintegerrimis rigidis subtus glaucis, umbella terminali subsolitaria, involucellis subulatis. *Nov. Caesar.* (Oenanthe ambigua Nuttall.)

pag. 916.

Ad *Angelicam pratensem* M. B. (Ostericum palustre Bess. Koch.)

Ad *Imperatoriam verticillarem* Cand. (Peucedanum verticillare Koch.)

Ad *Imper. Chabraei* * (Peucedanum Carvifolia Vill. Koch., Selinum podolicum Bess.)

pag. 917.

Ad *Thapsiam garganicam.* (Ferula neapolitana Tenor.)

pag. 920.

Ad *Chenopodium.*

Post n. 23. *giganteum* Don. 55. Ch. caule elato angulato ramoso; foliis inferioribus ovatis dentatis, superioribus oblongis obtusis mucronatis subintegerrimis, spicis racemosis foliosis axillaribus. *Nepal.*

pag. 928.

Ad *Amarantum curvifolium* * Patria: *Caucasus.*

pag. 930.

Ad *Microteam debilem* Sw. (Galenia celosioides *, Aphananthe celosioides Link.)

pag. 931.

Ad *Chailletiam* Cand.

*toxicaria* Don. 5. Ch. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis undulatis integerrimis glabris coriaceis, racemis paniculatis, fructibus pubescentibus. *Afric. occ.*

*erecta* Don. 6. Ch. foliis oblongo-lanceolatis obtusis emarginatis glabris coriaceis integerrimis, floribus axillaribus, fructibus pubescentibus. *Afric. occ.*

pag. 933.

Ad *Viburnum.*

Post n. 6. *cotinifolium* Don. 33. V. foliis ovato-oblongis integerrimis utrinque stellato-tomentosis subtus ramulisque cinereis, cymis terminalibus lanatis. *Nepal.*

*cylindricum* Hamilt. 34. V. foliis ovato-oblongis acuminatis coriaceis integerrimis subtus ramulisque pubescentibus, cymis compositis tomentosis, corollae tubulosae limbo brevissimo 5dentato. *Nepal.*

*punctatum* Hamilt. 35. V. foliis ovato-oblongis mucronatis integerrimis utrinque glabris, cyma terminali sessili patente. *Nepal.*

pag. 934.

Post n. 16. *Mullaha* Hamilt. 36. V. foliis ovatis acuminatis remote serratis subtus ramisque dense tomentosis, cymis compositis patentissimis, dentibus calycis abbreviatis. *Nepal.*

*nervosum* Don. 37. V. foliis cordatis acuminatis serratis nervosis subtus ramulisque stellato-tomentosis, pedunculis terminalibus ternis cymosis paucifloris. *Nepal.*

## pag. 936.

### Ad *Rhoëm.*

Ad Rh. *Vernicem* del. patria *Japonia.* (Rh. venenata Cand.)

Post n. 5. *juglandifolia* Humb. 50. Rh. foliolis sub-6jugis basi inaequaliter ovato-oblongis acuminatis subtus pubescentibus, petiolo teretiusculo subtomentoso, panicula ramosissima bracteata, calycibus glabris. *Nov. Granat.*

*vernicifera* Cand. 51. Rh. foliolis 5jugis sessilibus oblongis acutis utrinque tomentosis, petiolo teretiusculo, panicula terminali. *Japonia. Nepal.* (Rh. Vernix Thunb., juglandifolium Wall. Don.)

†*perniciosa* Kunth. 52. Rh. foliolis 7-8jugis longissime petiolatis rhombeo-ovatis membranaceis glabris reticulato-venosis, petiolo teretiusculo. *Nov. Hispan.* Nec flores nec fructus visi.

*acuminata* Cand. 53. Rh. foliolis 3-4jugis oblongis acuminatis ramulisque glabris subtus parallele venosis, paniculis axillaribus folio brevioribus. *Nepal.*

## pag. 937.

Ad Rh. *javanicam.* (Rh. *Amela* Don.) *Nepal.*

*fraxinifolia* Don. 54. Rh. foliolis 7jugis oblique lanceolatis acuminatis serratis glabris lucidis, petiolo teretiusculo, panicula ramosissima villosa. *Nepal.*

Post n. 20. *pyroides* Burch. 55. Rh. foliolis obovato-oblongis integerrimis mucronatis, petiolis ramulisque pubescentibus, racemis axillaribus folio brevioribus, terminalibus paniculatis. *Afric. austr.*

Post n. 25. †*tridactyla* Burch. 56. Rh. foliolis spathulato-linearibus obtusissimis glabris, ramulis rigidis inermibus. *Afric. austr.*

## pag. 938.

Post n. 40. *parviflora* Roxb. 57. Rh. foliolis obovatis crenato-dentatis utrinque ramisque villosis, panicula terminali. *Nepal.*

*serraefolia* Burch. 58. Rh. foliolis linearibus acuminatis elongatis serratis glabris, panicula terminali. *Afric. austr.*

Ad Rh. *cuneifoliam.* (Rh. grandidentata Burch.)

## pag. 939.

### Ad *Cassinem.*

*excelsa* Wall. 10. C. arborea, foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis subcarnosis glabris, umbellis axillaribus rotundatis, stigmatibus 5. *Nepal.*

*discolor* Wall. 11. C. arborea, foliis oppositis oblongis utrinque attenuatis integerrimis subtus subargenteis coriaceis, fasciculis axillaribus dichotomis, stigmatibus 4. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 940.

Ad *Paliurum* Lam.

*virgatus* Don. 3. P. foliis oblique cordatis acutis 3nerviis lucidis, aculeis ftipularibus geminis recto falcatoque, fructus alis integerrimis. *Nepal.* Bot. mag. 2535.

Ad *Turneram.*

Poft n. 1. *mollis* Kunth. 23. T. foliis ovato-oblongis groffe crenato-ferratis utrinque fericeo-pilofis fubtus canefcentibus, calycibus bracteatis. *Nov. Granat.*

Ad T. *acutam* W. (T. carpinifolia Kunth.)

Ad T. *peruvianam* W. (T. fericea Kunth.)

pag. 941.

Poft n. 7. *hexandra* * 24. T. fruticofa, foliis oblongis inaequaliter crenato-ferratis fupra pubefcentibus fubtus incano-tomentofis, calycibus bracteatis, floribus 6andris. *Nov. Granat.* (T. tomentofa Kunth.)

Ad T. *tomentofam* W. (Piriqueta tomentofa Kunth.) Stylos habet 2partitos.

pag. 942.

Ad *Drymariam* W.

Poft n. 1. *diandra* Blum. 6. Dr. caule decumbente diffufo pubefcente, foliis fubrotundo-ovatis mucronatis, pedunculis 2fidis, floribus diandris, calyce corollam fuperante, capfula fub-1fperma. *Java.*

Poft *Drymariam:*

## MERCKIA Fifch.

*phyfodes* Fifch. *Orae maritimae Afiae et Amer. arctic.* Planta Arenariam referens, foliis ovatis ciliatis, pedunculis 1floris, floribus albis. (Arenaria? phyfodes Fifch. Cand.)

Ad *Corrigiolam.*

*telephiifolia* Pourr. 2. C. perennis, foliis fpathulatis acutiusculis, floribus terminalibus glomeratis pedunculatis. *Corfica. Gallia auftr.* Reichenb. ic. t. 161.

pag. 943.

Ad *Stackhoufiam* Labill.

*fpathulata* Sieb. 2. St. caule herbaceo, foliis alternis fpathulatis glabris, fpicis terminalibus elongatis. *Nov. Holland.*

pag. 944.

Ad *Staphyleam occidentalem* Sw. dele fyn. Ventenatii.

pag. 945.

Ad *Xanthoxylon*.

Poſt n. 13. *hyemale* Hilar. 39. X. foliolis 3-6jugis ſubſeſſilibus obovatis obtuſis crenato-ſerratis margine glandulosis, floribus paniculatis 4andris 1gynis. *Braſil.* Hilar. pl. uſ. braſil. t. 37.

*ſorbifolium* Hilar. 40. X. foliolis 2-5jugis oblongis crenato-ſerratis venoſis glabris, petiolis aculeatis, floribus paniculatis 5andris dioecis 1gynis. *Braſil.* (Langsdorffia Leandr., Pohlana Langsdorffii Mart. nov. act. nat. cur. 11. p. 185. 12. p. 17.)

pag. 946.

Ad X. *Culantrilo* Kunth. (X. Tingo aſſuiba Hilar.)

*lucidum* Hilar. 41. X. arboreum, ramis 4angulis, foliolis 2-3jugis ſpathulatis retuſis integerrimis pellucido-punctatis baſi 2tuberculatis, floribus ♂ paniculatis 4andris. *Braſil.* (X. nitidum Hilar.)

pag. 947.

Poſt n. 37. *praecox* Hilar. 42. X. arboreum inerme, foliis ſubabrupte pinnatis oblongis obtuſis ſubintegerrimis ſubtus pubeſcentibus pellucido-punctatis, floribus ♀ paniculatis 4fidis. *Braſil.*

pag. 952.

Ad *Araliam*.

Poſt n. 12. *pubeſcens* Cand. 34. A. fruticoſa glabra, foliis impari-pinnatis 2pinnatisque pubeſcentibus, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis ſerratis baſi inaequaliter attenuatis, umbellis compoſitis verticillatis. *Nov. Hiſpan.*

pag. 953.

Poſt n. 30. *dubia* * 35. A. caule fruticoſo muricato-echinato, foliis profunde cordatis palmato-7partitis ſubtus ferrugineo-pubeſcentibus, laciniis lanceolatis ſerratis, umbellis compoſitis, floribus 1gynis. *Ind. or.* (Gaſtonia palmatà Roxb. Lindl. bot. reg. 894.)

pag. 954.

Poſt *Gloſſopetalum*:

## EURYCOMA Jack.

*longifolia* Jack. *Sumatra.* Arbuſcula foliis amplis pinnatis, floribus paniculatis purpureis.

Ad *Pilocarpum* Vahl.

*Humboldtii* * 4. P. foliis oblongo-lanceolatis acutis, petiolis marginatis, racemis compositis pubescentibus laxis, petalis rotundatis punctato-glandulosis, germinibus tuberculosis. *Nov. Andaluf.* (Esenbeckia pilocarpoides Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 655.)

pag. 955.

Ad *Droseram.*

Post n. 11. 12. *sessilifolia* Hilar. 29. Dr. foliis sessilibus cuneiformibus fimbriato-laciniatis basi nudiusculis, stipulis multipartito-ciliatis, scapo glabro, calycibus glanduloso-pubescentibus, stigmatibus sub-5fidis. *Brasil.*

*montana* Hilar. 30. Dr. foliis breviter petiolatis oblongis obtusissimis glanduloso-pilosis, stipulis laciniatis, scapo pubescente, calycibus glandulosis. *Brasil.*

*hirtella* Hilar. 31. Dr. foliis spathulatis obtusis in petiolum decurrentibus glanduloso-pilosis, stipulis 3partitis, scapo hirsuto, calycibus glandulosis. *Brasil.*

*parvifolia* Hilar. 32. Dr. foliis obovatis obtusissimis glanduloso-pilosis, scapo glabriusculo 2-3floro, calycibus glandulosis. *Brasil.*

*maritima* Hilar. 33. Dr. foliis spathulato-cuneatis glanduloso-pilosis, stipulis subnullis, scapo calycibusque glanduloso-pubescentibus. *Brasil.*

*communis* Hilar. 34. Dr. foliis spathulatis obtusissimis petiolatis glanduloso-pilosis, stipulis multipartitis, calycibus glanduloso-pubescentibus. *Brasil.* Hilar. pl. us. brasil. t. 15.

*villosa* Hilar. 35. Dr. foliis lineari-lanceolatis scapo calycibusque glanduloso-pilosis, petiolis villosis, stipulis 2partitis ciliatis. *Brasil.*

*ascendens* Hilar. 36. Dr. foliis linearibus scapoque ascendente glanduloso-pilosis, calycibus latiusculis. *Brasil.*

*graminifolia* Hilar. 37. Dr. foliis linearibus longissimis erectis, stipulis late ovatis laciniatis, scapo 3angulari paucifloro. *Brasil.*

*spiralis* Hilar. 38. Dr. foliis linearibus elongatis spiratim tortis, stipulis lanceolatis acutis, scapo complanato 2fido glanduloso-pubescente. *Brasil.*

Post n. 19. *hilaris* Schlechtend. 39. Dr. foliis rosaceo-congestis spathulato-lanceolatis obtusis glanduloso-pilosis subtus petiolisque villosis, stipulis 0, racemo secundo bracteato. *C. B. S.*

pag. 958.

Ad *Staticem.*

Ad St. *globulariifoliam* Desf. Patria: *Sardinia.*

*echioides* 25. St. foliis ſpathulatis obtuſis muricato-aſperis, ſcapi ramis ſtrictis elongatis ſimpliciuſculis, calycibus remotis ariſtatis. *Europ. auſtr.* (St. ariſtata Sm.)

*articulata* Loiſ. 57. St. foliis ſpathulatis punctato-ſcabris, ſcapi ramoſiſſimi ramis divaricatis punctato-aſperis dichotomis articulatis, articulis medio craſſioribus. *Gallia provinc. Corſica. Sardinia.* (St. echioides R. et Sch., rorida Sm.)

*acutifolia* Reichenb. 58. St. foliis lineari-lanceolatis acutis, ſcapo erecto, ramis dichotomis teretibus, floribus diſtantibus. *Liguria.* Reichenb. ic. t. 225.

pag. 961.

Ad *Armeriam* W.

*ſardoa* * 16. A. foliis filiformibus canaliculatis ſcapoque glabris, foliolis involucri obtuſis. *Sardin. Corſica.*

pag. 962.

Ad *Linum.*

Poſt n. 8. *ſiculum* Presl. 49. L. ſimplex, foliis lineari-lanceolatis acutis 3nerviis, floribus corymboſo-paniculatis, ſepalis acuminatis 3nerviis margine glanduloſis, petalis emarginatis. *Sicil.*

Poſt n. 12. *piligerum* Presl. 50. L. ſimplex hirſutum, foliis oblongo-lanceolatis 3nerviis, ſepalis linearibus piloſis, ſtylis ſtamina aequantibus. *Sicil. Creta.*

pag. 963.

Poſt n. 23. *carneum* Hilar. 51. L. foliis lineari-lanceolatis acutiſſimis glauceſcentibus, inferioribus oppoſitis, ſuperioribus ſubimbricatis, panicula coarctata, calyce acuto ſerrulato petalis breviori. *Braſil.*

pag. 964.

Poſt n. 29. *erigeroides* Hilar. 52. L. ſimplex erectum, foliis alternis confertis linearibus acutiſſimis baſi 2glanduloſis, panicula ſubcorymboſa, ſepalis acuminatis glanduloſo-ſerratis. *Ad fl. Platam.*

*litorale* Hilar. 53. L. multicaule erectum glaberrimum, foliis linearibus acutis, ſuperioribus alternis, floribus paniculatis, ſepalis acutis glanduloſis. *Braſil.*

*junceum* Hilar. 54. L. caule erecto virgato glaberrimo, foliis remotis abbreviatis appreſſis linearibus acutis, floribus paniculatis, ſepalis acutis glanduloſis. *Braſil.*

Ad L. *ſtrictum.* (L. alterniflorum Delil.) *Gallia auſtr.*

pag. 965.

Ad L. *aquilinum* Molin. (L. Chamiſſonis Schiede in Linnaea p. 69.)

Poſt n. 45. *Cicanoba* Hamilt. 55. L. fruticoſum, foliis alternis petiolatis oblongis acuminatis ſerratis glabris, umbella terminali multiflora, ſepalis acutis, floribus trigynis. *Nepal.*

*repens* Don. 56. L. fruticoſum repens, foliis alternis ovatis mucronulatis crenulatis glabris, pedunculis ſolitariis, ſepalis lanceolatis mucronatis denticulatis. *Nepal.*

AD

# VOLUMEN II.

# CLASSIS VI.

pag. 5.

Post n. 1198. *Phycella* Lindl. Cor. tubulosa 6partita subringens subclausa. Stamina basi laciniarum inserta, sterilia 6 basi exteriorum adnata. Stigma simplex.

pag. 9.

Post n. 1274. *Compsanthus* * (Compsoa Don.) Cor. campanulata 6petala, apice incrassata, petalis extus gibboso-saccatis. Filamenta basi dilatata. Antherae peltatae. Stigmata 3 2fida apice revoluta. Caps. siliquaeformis 3locularis polysperma.

---

*Miersia* Lindl. Bracteae patentes, 6 exter. petaloideae, inter. bifidae coloratae depauperatae. Perianthium 1phyllum urceolatum carnosum, ore 6dentato. Stamina minima fauci perianthii inserta. Stigma capitatum. Caps. 3locularis apice 3valvis polysperma. *Familia?*

pag. 11.

Post n. 1299. *Steriphoma* *. Cal. campanulatus 2lobus. Pet. 4. Fructus oblongus stipitatus. *Cappárideae*.

Post n. 1308. *Leptodermis* Wallich. Cal. 6dentatus, bractea membranacea tubulosa superne 2fida inclusus. Cor. 6fida. Antherae mediis filamentis adnatae lineares. Stigma 6fidum. Caps. 6sperma. *Familia?*

pag. 12.

Post n. 1327. *Soulamea* Lam. e syst. veg. 3. p. 150. huc transferenda. Cal. minimus 3fidus. Pet. 3. Stigmata sessilia. Samara 2locularis obcordata, loculis 1spermis. *Polygaleae*.

pag. 14.

n. 1357. *Cymation* * deleatur.

Post n. 1368. *Kolbea* Schlechtend. Petala sine unguiculis glandulisque staminifera. Stylus 0. Stigmata in angulis germinis. Caps. 3locularis: semina duplici serie.

pag. 15.

Post n. 1384. *Bocagea* Hilar. Cal. 3partitus vel subinteger. Pet. 6 duplici ordine. Stam. complanata. Antherae

2loculares. Baccae 1-3 distinctae 3spermae. *Anoneae.*

*Hornschuchia* Nees. Cal. inferus coriaceus subtruncatus. Cor. 6partita duplici ordine. Antherae lineares subsessiles. Fructus? *Familia?*

---

pag. 21.

*Bromelia nudicaulis* commutetur cum Br. *pyramidali* Curt.: apponatur syn. Br. *nudicaulis* Ker.

*nudicaulis* 23. Br. foliis lato-lanceolatis obtusis coriaceis enerviis lurido-viridis sursum nigro-spinuloso-serratis, scapo villoso superne bracteis coloratis vestito, spica simplici terminali, calycibus acutis uncinulatis. *Ins. Carib.* Hook. exot. fl. t. 143.

pag. 22.

Ad *Pitcarniam* Herit.

*albiflora* * 12. P. foliis lineari-lanceolatis acuminatis integerrimis glaberrimis, pedunculis laevibus bracteas superantibus, petalis revolutis, stylo stamina exserta excedente. *Brasil.* (P. albiflos Bot. mag. 2642.)

pag. 24.

Ad *Tillandsiam.*

Post n. 11. *pulcra* Hook. 40. T. foliis filiformi-setaceis canaliculatis laxiusculis tenuissime lepidotis, spica simplici, bracteis (roseis) flore brevioribus, laciniis corollae obtusis stamina superantibus. *Ins. Carib.* Hook. exot. fl. t. 154.

Post n. 15. *bulbosa* Hook. 41. T. foliis e basi latissima convoluto-subulatis flexuosis, spica simplici, bracteis viridibus flores subaequantibus, genitalibus exsertis corollam acutam superantibus. *Ins. Carib.* Hook. exot. fl. t. 173.

Post n. 24. *nitida* Hook. 42. T. foliis lingulatis nitidis integerrimis scapoque paniculato glaberrimis, floribus remotiusculis, calyce ovato bracteas excedente. *Jamaica.* Hook. exot. fl. t. 218.

pag. 25.

Post n. 31. *aloaefolia* Hook. 43. T. foliis lato-lanceolatis concavis longe acuminatis spiratim tortis rigidis obscure fasciatis farinaceo-lepidotis, spica paniculata flexuosa, floribus remotis, corolla apice revoluta calycem, genitalibus corollam superantibus. *Ins. Carib.* Hook. exot. fl. t. 205. T. *paniculata* proxima differt foliis brevioribus, corolla torta, stigmate bisulco. Plum. ic. 10. p. 233.

pag. 28.

Ad *Massoniam longifoliam* Jacqu. M. *grandiflora* Lindl. bot. reg. 958. var.

pag. 31.

*Ornithogalum corymbosum* R. et P. melius sic definitur: O. foliis lineari - lingulatis canaliculatis prostratis, corymbo 6floro, bracteis cordatis pedicello brevioribus, petalis latissimis undulatis, filamentis subulatis. *Peru. Chili.* Bot. reg. 906.

pag. 33.

Ad *Ornithogalum hispidum* Hornem. (O. Bergii Schlechtend.)

pag. 34.

Ad *Allium.*

Post n. 16. *Sulvia* Hamilt. 97. A. foliis lineari - loriformibus planis glabris, scapo tereti laevi, umbella patula multiflora. *Nepal.*

pag. 40.

Ad A. *moschatum.* (A. parciflorum Viv.)

pag. 41.

Ad *Yuccam.*

Post n. 2. *glauca* Noisf. 18. Y. foliis lanceolatis flaccidis glaucis, floribus subglobosis patentibus. *Carolina.* Bot. mag. 2662.

pag. 44.

Ad *Narcissum triandrum.* N. Macleai Ker. var.

pag. 47. 48.

Ad *Pancratium flavum* R. et P. (Chrysiphiala flava Bot. reg. 778.)
Post n. 33. *Herbertianum* * 37. P. foliis oblongo - lanceolatis utrinque attenuatis, scapo tereti 2floro, corolla cernua staminibus rectis breviore, coronae brevis dentibus 2fidis. *Peru.* (Stenomesson curvidentatum Herbert in bot. mag. 2640., Chrysiphiala pauciflora Hook. exot. fl. t. 132.)
*Leucoïum trichophyllum* Brot. spatha multi - non 1flora. Habitat et in Sardinia et Corsica.

pag. 49.

Ad *Amaryllida.*

A. *Atamasco.* Zephyranthes striata Bot. mag. 2593. var.
A. *candida* Ker. Zephyranthes verecunda Bot. mag. 2583. var.
*carinata* * 64. A. scapo 1floro foliis linearibus canaliculatis flaccidis breviori, spatha apice fisso - cancellata,

tubo erecto subringente, staminibus declinatis. *Mexico.* (Zephyranthes Bot. mag. 2594.)

*rosea* * 65. A. scapo 1floro folia linearia obtusa flaccida superante, spatha 2fida, corolla erecta regulari, laciniis ovalibus patentibus, stylo declinato. *Cuba.* (Zephyranthes rosea Lindl. bot. reg. 821.)

Ad A. *minutam* Humb. (Zephyranthes grandiflora Bot. reg. 902.)

pag. 50.

Post n. 12. *versicolor* * 66. A. foliis linearibus flaccidis, scapo tereti, spatha angusta, corolla nutante campanulata subirregulari. *Ad fl. Platam.* (Habranthus Herb. in Bot. mag. 2485.)

Ad A. *Reginae.* A. Carnarvonia Cand. hort. genev. t. 9. hybrida.

Ad A. *miniatam* R. et P. (Hippeastrum subbarbatum Herb. in bot. mag. 2475.)

*gracilis.* * 67. A. foliis gracilibus semicylindricis erectis, scapo tereti, corolla campanulata erecta, staminibus declinatis inaequalibus. *Ad fl. Platam.* (Habranthus gracilifolius Herb. in bot. mag. 2464.) Habr. angustus ib. 2639. var.

pag. 51.

Ante n. 28. *bifida* * 68. A. scapo 4floro tereti, foliis linearibus flaccidis, spatha 2fida, floribus pedicellatis tubulosis cernuis, fauce squamata, staminibus declinatis inaequalibus. *Bonaria.* (Habranthus bifidus Herb. in bot. mag. 2597.)

A. *cyrtanthoides* Sims. et *ignea* Lindl. ad Phycellam Lindl. reducuntor.

pag. 52.

Post n. 44. *lineata* Coll. 69. A. spatha multiflora, floribus pedunculatis, limbo aperto tubum superante, laciniis vittatis, genitalibus declinatis. *C. B. S.*

pag. 53.

Post n. 58. *intermedia* * 70. A. foliis elliptico-oblongis costato-reticulatis in petiolum decurrentibus, scapo compresso, floribus subcapitatis, laciniis oblongis obtusis. *Brasil.* (Griffinia Lindl. in bot. reg. 990.)

pag. 54.

Ad A. *striatam* Jacqu. (Brunsvigia minor Lindl. in bot. reg. 954.)

Post *Amaryllida:*

## PHYCELLA Lindl.

*ignea* Lindl. (Amaryllis ignea p. 51.)
*cyrtanthoides* Lindl. (Amaryllis cyrtanthoides Sims. p. 51.)

Ad *Crinum.*

Ad Cr. *erubescens* Ait. Cr. submersum Herb. in bot. mag. 2463. var.

Ad Cr. *defixum* Ker. Cr. elegans Herb. in bot. mag. 2592. var.

Ante n. 9. *strictum* Herb. 28. Cr. bulbo ovato, foliis lanceolatis erectis abbreviatis, umbella pauciflora, tubo limbum superante, stylo stamina subaequante. *Ceilon.* Bot. mag. 2635.

pag. 55.

Ad Cr. *flaccidum* Herb. Cr. confertum Herb. in bot. mag. 2522. var.

Post n. 23. *humile* Sims. 29. Cr. bulbo sphaerico, foliis lineari-lanceolatis lacunosis margine laevibus depressis, umbella multiflora, tubo limbum superante, laciniis angustis. *Ind. or.* Bot. mag. 2636.

pag. 56.

Post n. 25. *undulatum* Hook. 30. Cr. scapo compresso foliis lineari-lanceolatis canaliculatis breviori, tubo corollae longissimo, limbi laciniis erectis acutis undulatis. *Amer. austr.* Hook. exot. fl. t. 200.

pag. 57.

Ad *Strumariam spiralem* Ker. (Hessea spiralis Berg. in Linnaea p. 252.)

pag. 58.

Ad *Cyrtanthum* Ait.

Post n. 3. *striatus* Herb. 8. C. foliis linearibus subtus maculatis scapoque coloratis, floribus umbellatis cernuis, tubo costato striato, dentibus limbi obtusiusculis, genitalibus exsertis. *C. B. S.* Bot. mag. 2534.

Ad C. *collinum* Burch. (C. pallidus Bot. mag. 2471.)

pag. 59.

Ad *Hypoxin.*

Post n. 3. *minor* Don. 25. H. scapo capillari foliis linearibus acutis villosis triplo breviori, perianthio villoso, antheris filamenta superantibus. *Nepal.*

pag. 60.

Ad *Curculiginem fasciculárem* * (Colchicum fasciculare R. Br. ad Denham. it. p. 243.)

Ad C. *ensifoliam* R. Br. (C. stans Labill. nov. Caled. t. 24.)

pag. 61.

Ad *Lilium.*

Post n. 5. *cordifolium* Thunb. 23. L. caule sub-4floro, foliis petiolatis cordatis acuminatis venosis, floribus sessilibus campanulatis, laciniis elongatis. *Japon. Nepal.* (Hemerocallis cordata Thunb. japon.)

L. *japonicum* Thunb. habitat et in *Nepal.*

pag. 62.

L. *glabrum* * est L. *Martagon* var. pallida.

pag. 63.

Ad *Fritillariam verticillatam* W. (Fr. cirrhosa Don.) *Nepal.*

pag. 64.

Post n. 16. *macrophylla* Don. 20. Fr. floribus subternis cernuis, petalis spathulato-oblongis mucronulatis, bracteis pedicellos superantibus, foliis sparsis lineari-lanceolatis elongatis glabris. *Nepal.*

pag. 65.

Ad *Gloriosam.*

Gl. *simplex* Don. videtur varietas Gl. *superbae*, foliis angustioribus. *Nepal.*

*virescens* Lindl. 3. Gl. foliis cirriferis, pedunculis pendulis, petalis apice undulatis. *Senegamb.* Bot. mag. 2539.

Ad *Hemerocallem.*

*disticha* Don. 3. H. foliis linearibus carinatis margine cartilagineis scabris, floribus spicatis, nervis corollae reticulatim nexis. *Nepal.*

pag. 67.

Ad *Scillam vernam.* (S. fastigiata Viv.)

Sc. *undulata* Desf. et *obtusifolia* Poir. habitant et in *Sardinia.*

pag. 78.

Ad *Uropetalum* Ker.

*hyacinthoides* * 4. U. floribus racemosis nutantibus, bracteis pedicellos superantibus, foliis binis lineari-subulatis canaliculatis scapo longioribus. *C. B. S.* (Polemannia hyacinthiflora Berg. in Linnaea, p. 250.)

*longifolium* Lindl. 5. U. floribus laxe racemosis pendulis, petalis obtusis, foliis loriformibus acuminatis longissimis. *Afric. orient.* Bot. reg. 974.

pag. 80.

Ad *Alströmeriam.*

*rosea* Hook. 39. A. foliis linearibus subtortis, pedunculis elongatis 1floris subcorymbosis, petalis subspathulatis serrulatis. *Chili.* Hook. exot. fl. t. 181.

pag. 84.

Ad *Anthericum.*

Post n. 23. *nepalense* * 36. A. radice fasciculata, foliis lineari-lanceolatis scapum aequantibus, floribus race-

mosis cernuis, bracteis elongatis, petalis oblongis obtusis. *Nepal.* (Phalangium Lindl. in bot. reg. 998.)

pag. 91.

Ad *Conantheram* R. et P.

†*campanulata* Hook. 4. C. foliis lineari-lanceolatis acuminatis longissimis flaccidis, floribus racemosis nutantibus, corolla 1petala campanulata, limbo aequaliter 6lobo. *Chili.* Hook. exot. fl. t. 214. (C. bifolia Bot. mag. 2496.)

pag. 93.

Ad *Dracaenam*.

Post n. 14. *stricta* Sims. 18. Dr. caule fruticoso stricto, foliis confertis lineari-lanceolatis cuspidatis margine scabris, racemo composito multifloro. *Nov. Zeeland.* Bot. mag. 2575.

pag. 96.

Ad *Asparagum*.

Post n. 21. *filicinus* Hamilt. 28. A. caule erecto ramosissimo, foliis quinis inaequalibus lineari-falcatis mucronatis 1nerviis, pedunculis axillaribus subsolitariis folio brevioribus. *Ind. or. Nepal.* (A. Curillus Roxb.)

Ad *Convallariam*.

Post n. 2. *leptophylla* Don. 15. C. caule tereti glabro, foliis quaternis linearibus acuminatis longissimis, pedunculis elongatis subquaternis bifloris pendulis. *Nepal.*

pag. 97.

Ad *Ophiopogonem* Ker.

*intermedius* Don. 3. O. foliis linearibus obtusis strictis serrulatis, scapo 3quetro foliis duplo breviori, racemo paucifloro, bracteis flore brevioribus, stylo corollam aequante. *Nepal.*

pag. 98.

Ad *Uvulariam*.

Ad U. *parviflorum* Wallich. (Disporum parviflorum Don.)

*Pitsutu* Hamilt. 9. U. foliis petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis, umbellis multifloris, pedicellis flore brevioribus, filamentis elongatis. *Nepal.* (Disporum Pitsutum Don.)

Ad *Streptopoda* Mx.

†*simplex* Don. 4. Str. caule simplicissimo, foliis amplexicaulibus ovato-lanceolatis acuminatis, pedunculis filiformibus elongatis. *Nepal.*

pag. 99.

Ad *Xerophytam* Juss.

*abietina* * 2. X. perennis ramosa, foliis imbricatis e basi lata villosa filiformi-trigonis ciliatis, floribus terminalibus sessilibus subsolitariis. *Alp. Brasil.* (Vellosia abietina Mart.)

*plicata* * 3. X. perennis subramosa, foliis imbricatis lineari-lanceolatis plicatis margine carinulaque plicarum hirsutiusculis, floribus subsolitariis pedunculatis, germinibus longissimis. *Brasil.* (Vellosia plicata Mart.)

pag. 101.

Ad *Smilacem.*

Post n. 34. *ovalifolia* Roxb. 69. Sm. aculeis falcatis, foliis ovali-oblongis 3plinerviis, umbellis paniculatis folia subaequantibus. *Nepal.*

pag. 102.

Post n. 44. *orbiculata* Labill. 70. Sm. caule sub-4gono, foliis subcordato-orbiculatis fusco-mucronatis 5nerviis, petiolis apice incrassatis, floribus ♀ umbellatis. *Nov. Caledon.*

Post n. 51. *maculata* Roxb. 71. Sm. ramis sulcatis inermibus, foliis subpeltatis triangulari-ovatis 7nerviis, umbellis sessilibus spicatis folia superantibus. *Nepal.*

pag. 103.

Post *Peliosanthen* Andr.:

## Compsanthus *. (Compsoa Don.)

*maculatus* * *Nepal.* Herba hirsuta ramosa foliosa, foliis amplexicaulibus cordatis acuminatis, floribus terminalibus pedunculatis albis purpureo-maculatis.

## Miersia Lindl.

*chilensis* Lindl. *Chili.* Herba acaulis e bulbo, foliis radicalibus linearibus, scapo umbellifero, floribus rubentibus.

pag. 104.

Ad *Juncum.*

Post n. 7. *scheuchzerioides* Laharp. 66. J. culmo brevissimo, foliis filiformibus, spicis subbinis 3-5floris, sepalis ovato-lanceolatis mucronatis capsulam subglobosam aequantibus. *Ins. Falkland.*

pag. 106.

Post n. 24. *concinnus* Don. 67. J. culmo tereti oligophyllo striato, foliis teretibus articulatis, fasciculo terminali multifloro, involucro polyphyllo scarioso abbre-

viato, sepalis obtusis, capsula triquetra stylo elongato coronata. *Emodi montes.*

Ante n. 30. *conglomeratus* 68. J. culmo aphyllo subtiliter sulcato laxe farcto, panicula laterali composita glomerata, floribus 3andris, sepalis acuminatis, capsula obovato-truncata apiculata. *Europ. Asia. America.* (J. communis *α.* Meyer., glomeratus Thb., bogotensis Humb.)

*effusus* 69. J. culmo aphyllo laevi laxe farcto, panicula laterali composita patente, floribus 3andris, sepalis acuminatis, capsula obovato-truncata depressa submucronata. *Europ.* (J. communis *β.* Meyer.)

*diffusus* Hopp. 70. J. culmo aphyllo subtiliter sulcato farcto, vaginis radicalibus atropurpureis, panicula laterali patente, floribus 6andris, sepalis acuminatis, capsula obovata stylo coronata. *Ad Danubium.*

pag. 115.

Ad *Tradescantiam.*

Post n. 2. *barbata* * 31. Tr. caule procumbente ramoso hinc villoso, geniculis barbatis, foliis linearibus acutis subtus vaginisque villosiusculis, pedunculis solitariis. *Nepal.* (Cyanotis barbata Don.)

pag. 116.

Ad Tr. *villosam* * Patria: *Ind. or.*

pag. 119.

Ad *Berberim.*

Post n. 1. *iberica* Stev. 34. B. spinis simplicibus 3partitisque, foliis obovato-oblongis mucronatis integerrimis, racemis pendulis multifloris. *Caucas.*

Post n. 7. *glaucescens* Hilar. 35. B. racemis compositis pendulis, calycibus 8sepalis, foliis oblongis mucronatis integerrimis glaucescentibus. *Brasil.*

Ad B. *latifoliam* R. et P. (B. coriacea Hilar.?)

Ad B. *ruscifoliam* Lam. (B. spinulosa Hilar.?)

pag. 120.

Ad B. *nepalensem* * (B. Miccia Hamilt. Don.) Qui potuerit Donius Ilicem japonicam Thunb. huc trahere, haud intelligo. B. nepalensis * et in *Java* habitat.

pag. 121.

Ad *Cleomen.*

Post n. 4. *affinis* * 60. Cl. glanduloso-pilosa, foliis ternatis quinatisque obovatis integerrimis glanduloso-ciliatis. *Java.* (Gynandropsis Blum.)

pag. 122.

Ad Cl. *pentaphyllam.* Cl. Candelabrum Bot. mag. 2656. var.

pag. 125.

Ad Cl. *viscosam*. (Polanissa Blum.)

Post *Cleomen*:

## STERIPHOMA *.

*cleomoides* * 1. St. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis petiolos subaequantibus. *Caracas*. (Capparis paradoxa Jacqu. Stephania W.)

*elliptica* * 2. St. foliis ellipticis petiolos duplo superantibus *Ins. Trinit*. (Stephania elliptica Cand.)

pag. 126.

Ad *Mabam* Forst.

*rufa* Labill. 10. M. fruticosa, foliis lanceolatis obtusiusculis coriaceis, junioribus ramulis baccisque solitariis breviter pedunculatis rufo-pilosis. *Nov. Caledon*.

Ad *Amajouam corymbosam* Kunth. (? Melanopsidium nigrum Coll. hort. ripul. t. 35. Stigmata tria indicantur, quae silet Kunthius.)

pag. 127.

Post *Cassupam* Humb.:

## LEPTODERMIS Wallich.

*lanceolata* Wallich. *Nepal*. Frutex ramulis brevissimis fasciculatis, foliis ovatis acutis hispidis, floribus lateralibus sessilibus ternis. Quam Wallichius fl. ind. 2. p. 191. 5andram habet, Donius in fl. nepal. p. 138. 6andram pronunciat, *Hamiltoniae fruticosae* nomine.

Ad *Richardiam*.

R. *scabram* cum *pilosa* R. et P. eamdem esse Mart. et Hilar., differre a sequentibus laciniis calycis 3angularibus.

*rosea* Hilar. 2. R. ramis diffusis foliisque oblongis utrinque attenuatis hirsutis, verticillis multifloris, laciniis calycis lanceolatis. *Brasil*.

*emetica* Mart. 3. R. ramis hispidis, foliis ovato-lanceolatis mucronatis pilosiusculis, verticillis paucifloris, laciniis calycis linearibus. *Brasil*.

pag. 128.

Ad *Loranthum*.

Post n. 6. *obmunitus* * 75. L. ramis teretibus strictis, foliis spathulato-linearibus apice incrassatis, pedunculis nutantibus subsecundis, calyce duplici, exteriori 5dentato. *Rio grande*. Sello.

Post n. 11. *pendulus* Sieb. 76. L. ramis teretibus glabris, foliis oppositis lineari-lanceolatis longissimis coriaceis laevibus, pedunculis umbelliferis, corollis longissimis. *Nov. Holl*.

pag. 129.

L. *bicolor* Roxb. ad pentandros ablegandus.

Poſt n. 27. *ampullaceus* Roxb. 77. L. foliis breviter petiolatis oblongis glabris, racemis axillaribus ſolitariis folio brevioribus, tubo corollae gibbo, fructibus ovalibus. *Silhet, prov. Ind. or.*

*retuſus* Jack. 78. L. foliis oppoſitis obovato-oblongis retuſis glabris, racemis ſubſolitariis abbreviatis, tubo corollae gibbo, fructibus 1ſpermis. *Ind. or.*

pag. 130.

Poſt n. 45. *patulus* Jack. 79. L. foliis oppoſitis ovato-ellipticis glabris, racemis paniculatis, calyce bracteato integro. *Sumatra.*

pag. 131.

Poſt n. 47. *odoratus* Wallich. 80. L. foliis ellipticis obtuſis ſpicas axillares ſuperantibus, floribus patulis, ſtylo petalis breviori. *Nepal.* (L. viridiflorus Wallich.)

*globoſus* Roxb. 81. L. foliis oppoſitis oblongis eveniis glabris, ſpicis axillaribus ſubſolitariis, floribus oppoſitis. *Bengal.*

*corynitis* * 82. L. caule gracili, foliis ovali-oblongis, floribus axillaribus paucis, corolla irregulari, fructibus clavatis. *Silhet, provinc. Ind. or.* (L. clavatus Roxb.)

*coccineus* Jack. 83. L. foliis alternis petiolatis ovato-oblongis obtuſis glabris, ſpicis axillaribus, calyce ſubintegro. *Peninſul. Malacc.* Malayan miſcell. 1. 8.

*polyſtachys* Wallich. 84. L. ramis teretibus punctatis, foliis obovatis obtuſis, racemis axillaribus oppoſitis ſubfaſciculatis folio brevioribus, fructibus globuloſis. *Ind. or.*

*pulverulentus* Wallich. 85. L. ſuperne ſtellato-tomentoſus farinoſus, foliis oppoſitis obovatis glabris nervoſis, racemis lateralibus faſciculatis tomentoſis. *Nepal.*

Poſt n. 55. *veſtitus* Wallich. 86. L. foliis oblongis acutis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, floribus faſciculatis tubuloſis. *Nepal. Inſ. freti Malacc.* (L. ferrugineus Roxb.)

*liguſtrinus* Wallich. 87. L. foliis lanceolatis acutis glabris, racemis ſubumbellatis. *Nepal.*

*cordifolius* Wallich. 88. L. foliis cordato-ovalibus obtuſis, racemis faſciculatis. *Nepal.*

*umbellatus* Wallich. 89. L. foliis elliptico-oblongis acutis, floribus faſciculatis. *Nepal.*

Poſt n. 57. *involucratus* Roxb. 90. L. foliis oppoſitis cordato-ovatis breviter petiolatis glabriuſculis, umbellis axillaribus ſubſeſſilibus, involucro 4phyllo 4floro, calyce corollaeque tubo villoſis. *Bengal.*

*pentapetalus* Roxb. 91. L. foliis oppoſitis ſubcordato-oblongis glabris, racemis axillaribus folia aequantibus, petalis 5 baſi in corpus trigonum intumeſcentibus, antheris obovatis, fructibus oblongis. *Silhet, Nepal.*

*cylindricus* Jack. 92. L. foliis alternis petiolatis lanceolatis utrinque attenuatis, racemis axillaribus divaricatis folia aequantibus, limbo corollae tubum superante. *Sumatra.*

*incarnatus* Jack. 93. L. foliis alternis petiolatis ovatis acutis, junioribus ſtellato-pubeſcentibus, racemis ſpicatis hirſutis, tubo corollae limbum ſuperante. *Inſ. freti Malacc.*

*bracteatus* Heyn. 94. L. ſtellato-tomentoſus, foliis alternis longe petiolatis obovatis obtuſis, umbellis axillaribus, bractea elongata lingulata. *Ind. or.* Roxb. fl. ind. 2. p. 220.

pag. 133.

Ad *Triphaſiam* Lour.

*ſarmentoſa* Blum. 3. Tr. arborea aculeata, ramis ſarmentoſis, foliis ſimplicibus ternatisque oblongis acuminatis integerrimis, corymbis axillaribus, corolla tripetala. *Java.*

pag. 134.

Ad *Frankeniam.*

Ad Fr. *Nothriam* Thunb. (Fr. Krebſii Schlechtend.)

pag. 135.

*grandifolia* Chamiſſ. 17. Fr. caule ſuffruticoſo proſtrato, foliis oppoſitis obovatis mucronatis margine revolutis ſubcoriaceis pubeſcentibus, ramis calycibusque ſolitariis hirtis. *Nov. Californ.*

pag. 136.

Poſt *Atraphaxin:*

SOULAMEA Lam.

*amara* Lam. *Java. Inſ. Molucc.* Frutex foliis oblongis integerrimis, floribus racemoſis albidis. (Rex amaroris Rumph.)

pag. 142.

Deleatur *Cymation* *.

pag. 143.

Ad *Colchicum.*

Poſt n. 7. *Ritchii* R. Br. 8. C. foliis linearibus, ſpatha ſubmultiflora, appendicibus laciniarum corollae fimbriato-criſtatis. *Numidia.* Denham it. p. 241.

Ad *Androcymbium* W.

*eucanthum* W. 3. A. foliis ovato-lanceolatis undulatis tenuiſſime fimbriatis, floribus ſubternis breviter pedicellatis bracteatis. *C. B. S.* (Melanthium capenſe L., Anguillaria capenſis * p. 146.)

Ad *Tofieldiam* Hudſ.

Poſt n. 3. *coccinea* Richardſ. 9. T. ſcapo ſubfoliato colorato, foliis lineari-lanceolatis, floribus capitatis ſubſeſſilibus, calyculo 3fido. *Ad oras maris glacialis Amer. arctic.*

pag. 145.

Ad *Triglochin.*

*filifolium* Sieb. 13. Tr. ſcapo folia lineari-filiformia ſuperante, floribus racemoſis, fructibus ovatis, ſtigmatibus perſiſtentibus. *Nov. Holl.*

pag. 146.

Ad *Melanthium.*

M. *uniflorum* Jacqu. deleatur, rediturum ſub *Kolbea* Schlechtend.
M. *punctatum* Cav. (Erythroſtictus punctata Schlechtend.)
M. *gramineum* Cav. (Erythroſtictus graminea Schlechtend.)
M. *ciliatum* Thunb. floribus punctatis, cornibus fructus retrorſum verſis.

Poſt n. 7. *Bergii* Schlechtend. 12. M. foliis radicalibus lineari-lanceolatis papilloſo-ciliatis, ſcapo ſuperne ſulcato, ſpica terminali pauciflora, floribus epunctatis, cornibus erectis. *C. B. S.*

*marginatum* Schlechtend. 13. M. foliis radicalibus lanceolatis vaginantibus cucullatis papilloſo-ciliatis, ſcapo ſulcato baſi foliato, floribus laxe ſpicatis, germinibus acutangulis ſubalatis. *C. B. S.*

*rubicundum* W. 14. M. foliis oblongo-lanceolatis baſi cucullatis ciliatis, ſcapo angulato papilloſo, floribus ſpicatis ſecundis. *Afric. auſtr.*

Ad *Anguillariam biglandulosam* R. Br. (Pleea Sieberi Reichenb. in Sieb. fl. nov. holl. n. 156.)

*Anguillaria capenſis* * deleatur. Eſt Androcymbium leucanthum W.

pag. 147.

Poſt *Anguillariam* R. Br.:

## KOLBEA Schlechtend.

*Breyniana* Schlechtend. *Afric. auſtr.* Herba ſimplex e bulbo, caule folioſo ſub-1floro, foliis lineari-lanceolatis longiſſimis, flore puniceo-croceo. (Tulipa Breyniana L., Melanthium uniflorum Jacqu. Syſt. 2. p. 146. excl. ſyn. Desrouſſ., Melanthium aethiopicum Thunb.)

Ad *Zigadenum* Mx.

*chloranthus* Richardſ. 3. Z. caule ſubaphyllo folia radicalia linearia glauca ſuperante, racemo ſubcompoſito, bracteis lanceolatis. *Amer. arctic.*

Ad *Ornithogloſſum* Saliſb.

O. viride mutetur in *glaucum* Saliſb. (Lichtenſteinia laevigata W., Cymation laevigatum Syſt. 2. p. 142.)

*undulatum* Schlechtend. 2. (Lichtensteinia undulata W., Cymation undulatum Syst. 2. p. 142.)

Ad *Wurmbeam* Thunb.

*truncata* Schlechtend. 4. W. foliis lineari-lanceolatis, spica pauciflora flexuosa, floribus distantibus, laciniis limbi basi distantibus tubo longioribus. *C. B. S.*

pag. 153.

Ad *Dioscoream*.

Post n. 29. *Elephantopus* * 43. D. glaberrima, caudice maximo subrotundo, foliis reniformi-cordatis acutis 7nerviis utrinque nitidis, racemis ♂ axillaribus. *Afric. austr.* (Tamus Herit. Ait. Syst. 3. p. 905., Testudinaria Burch. Lindl. bot. reg. 921.)

+ *montana* * 44. D. foliis reniformi-cordatis obsolete nervosis subtus glaucis. *Afric. austr.* (Testudinaria Burch.)

pag. 155.

Ad *Menispermum*.

Post n. 5. *coriaceum* * 51. M. foliis cordato-ovatis mucronulatis coriaceis glabris, racemis elongatis solitariis pendulis. *Java.* (Cocculus Blum.)

Post n. 12. *lanuginosum* * 52. M. lanatum, foliis late ovatis retusis, corymbis axillaribus folio multo brevioribus. *Java.* (Cocculus Blum.)

*ovalifolium* * 53. M. foliis ovalibus integerrimis mucronatis 3nerviis glabris, ramulis villosis, pedunculis terminalibus paniculatis, pedicellis umbellatis. *Java.* (Cocculus Blum.)

pag. 156.

Post n. 26. *corymbosum* * 54. M. foliis subpeltatis cordato-subrotundis mucronulatis 5nerviis, corymbis axillaribus solitariis folio minoribus, pedicellis subumbellatis. *Java.* (Cocculus Blum.)

*rimosum* * 55. M. foliis subpeltatis ovali-oblongis acutis coriaceis glabris, racemis paniculatis axillaribus folio brevioribus, caule rimoso. *Java.* (Cocculus Blum.)

*glaucescens* * 56. M. foliis subpeltatis cordato-orbiculatis mucronatis glabris subtus glaucis, racemis paniculatis folia superantibus. *Java.* (Cocculus Blum.)

*bantamense* * 57. M. foliis subcordato-ovalibus acutis sub-5nerviis integerrimis glabris, paniculis elongatis axillaribus solitariis. *Java.* (Cocculus Blum.)

pag. 158.

Post *Lardizabalam* R. et P.:

## BOCAGEA Hilar.

*alba* Hilar. 1. B. arborescens, foliis ovato-lanceolatis acutis glabris, pedunculis subternis paucifloris, petalis interioribus angustioribus apice 3quetris. *Brasil.*

*viridis* Hilar. 2. B. fruticosa, foliis ovato-lanceolatis acutis subtus pilosis, pedunculis subsolitariis cernuis, petalis interioribus latioribus. *Brasil.*

*javensis* * 3. B. fruticosa, foliis ovato-lanceolatis, pedunculis subracemosis, petalis interioribus majoribus unguiculatis apice cohaerentibus. *Java.* (Orophea hexandra Blum.)

*enneandra* * 4. B. fruticosa, foliis oblongis, pedunculis sub-3floris, pedicellis fasciculatis, floribus enneandris. *Java.* (Orophea enneandra Blum.)

---

## HORNSCHUCHIA Nees.

*Bryotrophe* Nees. 1. H. foliis basi inaequalibus oblongis acuminatis triplinerviis subtus ad venas pubescentibus, pedunculis radicalibus racemosis. *Brasil.* Denkw. der bot. Ges. in Regensb. 2. t. 11.

*Myrtillus* Nees. 2. H. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis reticulato-venosis subtus ramisque pubescentibus, pedunculis 1floris lateralibus. *Brasil.* Denkw. der bot. Ges. in Regensb. 2. t. 12.

Ad *Rumicem.*

Post n. 4. *montevidensis* * 60. R. valvis oblongis obtusis granifeis reticulatis, ramis angulatis asperis, pedunculis verticillatis, foliis oblongis undulatis subcrispis. *Monte Video.* Sello.

pag. 159.

Ad R. *nepalensem* * (R. hamatus Trevir.)

R. *aegyptiacus* habitat et in *Sardinia.*

Ad R. *scutatum.* (R. hastatus Don.) *Nepal.*

pag. 163.

Ad *Alisma.*

Post n. 4. *reniforme* Don. 10. A. foliis longe petiolatis reniformibus nervosis glabris, scapo elongato paniculato, pedunculis oppositis ternisque, fructibus trigonis obtusis. *Nepal.*

## CLASSIS VII.

### pag. 164.

n. 1393. *Disandra* del.
n. 1397. *Pancovia* W. melius ad *Afzeliam* Sm. p. 279. n. 1683. ablegatur.

### pag. 165.

n. 1405. *Astranthus* Lour. satius Decandris pentagynis adnumeratur. Bot. mag. 2659.

### pag. 166.

*Disandra prostrata* del. in cl. V. jam collocata.

### pag. 168.

Ad *Pisoniam*.

Ad P. *Pacurero* Humb. (P. eucalyptifolia Kunth.)
Ad P. *aculeatam*. (P. loranthoides Kunth.)
Ad *Petiveriam alliaceam*. (P. tetrandra Gomez. var. levis.)

---

## CLASSIS VIII.

### pag. 170.

Post n. 1417. *Corallophyllum* Kunth. Cal. 8partitus coloratus. Cor. calyce minor tubulosa, limbo 8dentato. Stam. cor. inserta. Antherae biloculares. Stigma capitatum. Germen superum multiloculare, loculis 1spermis.

### pag. 171.

1420. *Cytinus* melius ad cl. XVI. *Monadelphiam* amandatur.
1425. *Sodada* Delil. cum *Capparide* aptius conjungitur.
1426. *Physostemon* Mart Stam. declinata.
1430. *Vitmannia* Vahl. *Rutaceis* adnumerator.
1431. *Elvasia* Cand. Antherae poris apice dehiscentes. *Ochneae* Hilar.

### pag. 172.

Post n. 1446. † *Acrozus* * (Acronodia Blum.) Flores dioeci. ♂ Cal. 4sepalus. Pet. 4 linearia apice erosa. Antherae lineares pubescentes.

pag. 173.

Poſt n. 1456. *Diplopetalon* * (Dimereza Labill.) Cal. 5ſepalus perſiſtens bracteatus. Pet. 10 duplici ſerie, exter. orbiculata, inter. 2partita apice 2calloſa. Diſcus glanduloſus 3-4fidus periſtemon. Capſ. coriacea 3valvis 3ſperma. *Sapindeac.*

n. 1465. *Luxemburgia* Hilar. melius ad cl. XIII.

pag. 175.

n. 1494. *Codia* Forſt. Rec. commune villoſum. Involucrum partiale 1phyllum. Cal. tubuloſus 4-5partitus. Petala 4, 5 ſummo calycis tubo inſerta. Stamina 8-10 gemina. Bacca ſicca 4-5locularis, ſemine perfecto ſubſingulari. *Onagrae* Labillard.

n. 1497. *Hermeſia* Humb. jungenda cum *Alchornea* Sw. Syſt. 3. n. 2381.

Poſt n. 1498. *Aſtilbe* Don. Cal. 4partitus coloratus. Cor. 0. Antherae 2loculares. Capſ. ſupera 2locularis 2roſtris polyſperma. *Saxifrageae.*

n. 1499. *Marathrum* Humb. ad *Lacida* Schreb. n. 1980. ablegandum.

---

pag. 187.

Ad *Ericam.*

E. *Coventria* Andr. (E. bucciniflora Bot. mag. 2465.)

pag. 192.

E. *incurva* Wendl. (non Andr.)

Poſt n. 196. *ſphaerantha* * 810. E. foliis linearibus obtuſis erectis glabris, ramis villoſis, floribus ſubcorymboſis terminalibus, calycibus ciliatis, corollis globoſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

pag. 196.

Poſt n. 245. *appreſſa* * 811. E. foliis minutis ſubellipticis obtuſis incano-pubeſcentibus arcte appreſſis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus lanatis, corollae pubeſcentis limbo contracto, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

pag. 203.

Ad *Diospyron.*

Poſt n. 9. *ſerrata* Hamilt. 28. D. foliis lanceolatis acuminatis ſerratis glabris, petiolis brevibus ramulisque villoſis, pedunculis aggregatis lateralibus cernuis calycibusque hirſutis, ſtylo 3fido. *Nepal.*

*ceraſifolia* Don. 29. D. foliis oblongis acuminatis integerrimis, petiolis brevibus ramulisque pubeſcentibus, pedunculis aggregatis lateralibus cernuis calycibusque pubeſcentibus, ſtylo 3fido. *Nepal.*

Poſt n. 20. *vaccinioides* Hook. 30. D. fruticoſa, ramis flexuoſis foliisque ovatis integerrimis nitidis ſubtus rufo-villoſis, floribus ſeſſilibus ſolitariis 4andris, fructibus 3locularibus. *China*. Hook. exot. fl. t. 139.

pag. 205.

Ad *Mimoſam*.

Poſt n. 6. *adhaerens* Kunth. 45. M. aculeata fruticoſa, foliis conjugato-pinnatis, foliolis bijugis dimidiato-obovatis mucronatis ſtrigilloſis, petiolis inermibus villoſis, capitulis ſolitariis. *Ad Orinocum*.

M. *tetrandra* Humb. ad M. *pudicam* Kunth.

M. *polyſtachya* ad *Entadam* Syſt. 2. p. 325.

pag. 206.

Ad M. *ſomniantem* Humb. (M. ſomniculoſa Kunth.)

pag. 208.

Ad *Chloram perfoliatam*, Chl. acuminata, ſerotina et lanceolata Koch. varietates leves, quae ſoli diverſitate cultuque naſcuntur juxta ac evaneſcunt.

CORALLOPHYLLUM Kunth.

*coeruleum* Kunth. *Mexico*. Caules caeſpitoſi carnoſi baſi foliis laciniatis veſtiti, flores ſeſſiles coerulei. Forte monſtrum. (Humb. nov. gen. 7. t. 660. b.)

pag. 210.

Ad *Vaccinium*.

Poſt n. 16. *canadenſe* Richardſ. 49. V. foliis lanceolatis integerrimis utrinque pubeſcentibus, racemo terminali, floribus faſciculatis, ſtylo incluſo. *Amer. arctic.*

pag. 212.

Poſt n. 36. *ſalicinum* Chamiſſ. 50. V. foliis lanceolatis cuſpidatis baſi attenuatis coriaceis integerrimis glabris venoſo-reticulatis, pedunculis axillaribus abbreviatis. *Ora occ. Amer. bor.*

V. *braſilienſe* * deleatur, rediturum ſub Luſſacia p. 294.

pag. 213.

*Sodada decidua* Forsk. melius *Capparis Sodada R. Br.*

*Phyſoſtemon lanceolatus* Mart. — ſtylo perſiſtente breviſſimo.

Ph. *tenuifolius* Mart. — ſtylo ſiliquam aequantes.

Ph. *rotundifolius* Mart. — ſiliqua ſtylum ſuperante.

Ad *Xylocarpum* Schreb.

Ante n. 1. *obovatus* * 3. X. foliis ſub-2jugis obovatis coriaceis. *Java*. (Carapa obovata Blum.)

pag. 214.

Ad *Tetrathecam* Sm.

*denticulata* Sieb. 6. T. foliis oppoſitis linearibus revolutis ſubdenticulatis ramulisque piloſiusculis, calycibus lanceolatis acutis glanduloſis. *Nov. Holl.*

Ad *Boroniam* Sm.

Poſt n. 3. *floribunda* Sieb. 14. B. foliis ſub-3jugis, petiolo marginato, foliolis lineari-lanceolatis mucronatis ſerrulatis, pedunculis ternis. *Nov. Holl.*

*microphylla* Sieb. 15. B. foliis ſub-6jugis, foliolis minutis obovatis mucronatis, pedunculis ternis. *Nov. Holl.*

pag. 215.

Poſt n. 5. *triphylla* Sieb. 16. B. foliis ternatis linearibus ſubtus revolutis tomentoſis, pedunculis axillaribus 1floris. *Nov. Holl.*

Ad B. *polygalaefoliam* Sm. B. hyſſopifolia Sieb. var.

pag. 216.

Ad *Jamboliferam pedunculatam* L. (Cyminoſma Gärtn. Cand.)

pag. 217.

Ad *Amyridem.*

A. *polygama* Cav. (Schinus dependens Ort. Duvaua Kunth.) Flores trigyni.

Poſt n. 4. † *Caraña* Humb. 28. A. foliis ternatis, foliolis oblongis acuminatis glabris epunctatis ſupra nitidis ſubtus albo-pruinoſis. *Ad Orinocum.* (Icica Caraña Kunth.)

pag. 218.

Ad A. *ambroſiacam* L. (Icica Tacamahaca Kunth.)

Ad A. *altiſſimam* W. (Icica macrophylla Kunth.)

Poſt n. 20. *pinnata* Kunth. 29. A. foliis 3jugis pellucido-punctatis glabris, foliolis ovatis obſolete crenulatis acutiusculis, petiolis ramulisque pubeſcentibus, paniculis axillaribus. *Amer. tropic.*

*fagaroides* * 30. A. foliis 3jugis glabris, foliolis ovatis obtuſis crenato-ſerrulatis reticulato-venoſis epunctatis pedunculis axillaribus aggregatis breviſſimis reflexis, fructu ſub-3valvi. *Mexico.* (Elaphrium fagaroides Kunth.)

† *graveolens* * 31. A. foliis 3jugis glabris epunctatis, foliolis oblongis acuminatis groſſe crenato-ſerratis reticulato-venoſis, petiolo ſuperne alato. *Ad fl. Magdalen.* (Elaphrium Kunth.)

pag. 219.

Ad A. *Elaphrium* * (Elaphrium glabrifolium Kunth.)

Ad A. *tomentoſam* * (Elaphrium Jacquinianum Kunth.)

Ad A. *copalliferam* * (Elaphrium excelſum Kunth.)

*jorullenſis* * 32. A. foliis ſub-8jugis villoſis rugoſis, foliolis oblongis obtuſis duplicato-crenatis ſupra incani ſubtus rufeſcentibus, petiolo interrupte alato alis crenatis, pedunculis axillaribus paucifloris *Mexico.* (Elaphrium jorullenſe Kunth. in Humb nov. gen. 7. t. 612.)

† *ariensis* * 33. A. foliis 5-7jugis villosis, foliolis oblongis acutis crenato-serratis, petiolo subalato, alis integerrimis. *Mexico.* (Elaphrium Kunth.)

† *lanuginosa* * 34. A. foliis sub-6jugis supra villoso-tomentosis subtus petioloque albido-lanatis, foliolis oblongis crenatis, panicula terminali glomerata. *Nov. Hispan.* (Elaphrium Kunth.)

Post *Amyridem:*

## † ACROZUS *. (Acronodia Blum.)

*punctatus* * *Java.* Arbor foliis lanceolatis serratis subtus punctatis, racemis axillaribus simplicibus. (Acronodia punctata Blum.)

### pag. 220.

Ad *Bäckeam.*

Post n. 2. *pinifolia* * 6. B. foliis oppositis lineari-filiformibus nigrescentibus, pedunculis axillaribus 3floris. *Nov. Caledon.* (Leptospermum Labill.)

Ad B. *virgatam* Ker. Leptospermum parvulum Labill. nov. Caled. t. 61. var. 10andra.

*trichophylla* Sieb. 7. B. foliis oppositis alternisque lineari-setaceis patulis glaberrimis, pedunculis axillaribus solitariis abbreviatis. *Nov. Holl.*

*spinosa* Sieb. 8. B. foliis fasciculatis spathulatis coriaceis glabris, ramis angulatis spinescentibus, racemis axillaribus terminalibusque compositis. *Nov. Holl.*

*fasciculata* Sieb. 9. B. foliis imbricato-fasciculatis setaceis apice incurvo-mucronatis glabris, pedunculis axillaribus aggregatis. *Nov. Holl.*

*carnosula* Sieb. 10. B. foliis 4fariam imbricatis breviter petiolatis teretibus carnosis abbreviatis gibbis glanduloso-tuberculosis, floribus axillaribus subsessilibus. *Nov. Holl.*

*microphylla* Sieb. 11. B. foliis 4fariam imbricatis basi scariosa subdecurrentibus triquetris obtusiusculis glanduloso-punctatis ciliatis, pedunculis terminalibus aggregatis. *Nov. Holl.*

### pag. 221.

Ad *Cupaniam.*

Post n. 5. *Poiretii* Kunth. 12. C. foliis pinnatis sub-4jugis, foliolis oblongis acutis coriaceis supra nitidis subtus glabriusculis, ramis racemisque paniculatis ferrugineo-tomentosis. *Ins. Trinit. Guadalup.* (Robinia rubiginosa Poir. Syst. veg. 3. p. 247.) Ann. des scienc. nat. 1. p. 457.

Post n. 11. *apetala* Labill. 13. C. foliis sub-6jugis ovato-lanceolatis glabris, racemis abbreviatis, floribus polygamis apetalis. *Nov. Caledon.*

centibus. *Mexico.* (F. decussata Graham. Bot. mag. 2507.) Bot. reg. 847.

pag. 237.

Ad *Daphnen.*

D. *cannabina* Lour. a Donio perperam D. *odorae* Thunb. accensetur.

*Bhalua* Hamilt. 32. D. floribus terminalibus umbellatis sericeo-villosis, laciniis corollae subrotundis retusis, stigmate sessili capitato, foliis lanceolatis utrinque attenuatis coriaceis glabris. *Nepal.*

D. *sericea* Vahl. et in *Nepal.* habitat.

pag. 239.

Ad *Gnidiam.*

Post n. 17. *denudata* Lindl. 19. Gn. foliis bifariam oppositis lanceolatis erectis 3nerviis ciliatis demum glabratis, floribus terminalibus aggregatis, laciniis corollae lanceolatis obtusiusculis ciliatis. *C. B. S.* Bot. reg. 757.

pag. 242.

Ad *Dodonaeam.*

*laurina* Sieb. 11. D. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris, ramis teretibus, ramulis ancipitibus, pedunculis cymosis axillaribus. *Nov. Holl.*

pag. 243.

Ad *Aspidistram* Ker.

*punctata* Lindl. 2. A. foliis longe petiolatis oblongis nervosis, floribus radicalibus solitariis 8fidis *China.* Bot. reg. 977.

pag. 245.

Ad *Lagettam* Juss.

*funifera* Mart. 2. L. fruticosa, foliis alternis subpetiolatis lanceolatis acutis subtus sericeis, floribus dioecis subracemosis. *Brasil.* (Daphne brasiliensis Radd.)

Ad *Codiam montanam* Forst. cf. eximiam analysin iconemque Labill nov. Caled. t. 46.

Ad *Weinmanniam.*

Ad W. *glabram.* (W. caripensis Kunth.)

Post n. 4. *pubescens* Kunth. 9. W. foliis impari-pinnatis 4-6jugis utrinque pilosis, foliolis elliptico-oblongis acutis serratis, petiolo communi alato articulato, racemis folia aequantibus. *Caracas.*

*hirtella* Kunth. 10. W. foliis impari-pinnatis ...jugis supra glabris subtus pubescentibus, foliolis oblongis acutiusculis serrulatis, petiolo communi alato arti-

culato, floribus fasciculato-racemosis. *Nov. Granat.*

*orbifolia* Kunth. 11. W. foliis impari-pinnatis 3-4jugis glabris, foliolis oblongis acutiusculis basi attenuatis serratis, petiolo communi alato articulato, ramulis glabris, floribus fasciculato-racemosis. *Nov. Granat.?*

*...garoides* Kunth. 12. W. foliis impari-pinnatis 3-6jugis glabris, foliolis parvis coriaceis obovatis apice crenatis, petiolo communi alato articulato, floribus corymbosis. *Peru.*

*...rophylla* Kunth. 13. W. foliis binatis ternatis bijugisque glabris, foliolis parvis coriaceis obovatis apice crenatis, petiolo communi subalato, pedunculis subsolitariis. *Peru.*

*he...rophylla* Kunth. 14. W. foliis simplicibus ternatisque membranaceis glabris, foliolis ovato-oblongis serratis, lateralibus multo minoribus, petiolo superne alato, racemis erectis elongatis. *Nov. Granat.*

W. *racemosa* Forst. habet racemos folia superantes. Huc et W. *macrophylla* Kunth. ex *Amer. austr.* et ipsa *laurina* Ej. Nec W. *ellipticam* Ej. diversam habeo: racemorum enim longitudo variat.

*...na* Ku...h. 15. W. foliis simplicibus oblongo-lanceolatis acuminatis argute serratis coriaceis glabris, racemis strictis elongatis. *Peru.*

pag. 246.

*Herme...* Humb. deleatur. Prima species, monente Adr. Jussievo, sub Alchornea, altera sub Callicoma militat.

Post *Galeniam*:

## Astilbe Don.

*rivularis* ... *Nepal.* Herba pilosa, foliis biternatis, foliolis ovatis duplicato-serratis, floribus spicato-racemosis ochroleucis.

*Marathru...* Humb. sub *Lacide* redibit.

pag. 248.

Ad *Serianam*.

Post n. 14. ...*talis* Hilar. 20. S. foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis subdentatis glaberrimis, petiolis nudis, racemis pubescentibus. *Brasil.*

pag. 250.

Ad *Paulliniam*.

Post n. 32. ...*lis* Hilar. 21. P. foliis supradecompositis glabris, foliolis inciso-serratis pellucido-venosis, panniculis simplicibus paucifloris. *Brasil.*

*cuspidata* Don. 27. L. foliis ovali-oblongis longo cuspidatis 3nerviis glabris, floribus axillaribus sessilibus aggregatis involucratis. *Nepal.*

Ad *Tetrantheram* Jacqu.

Ad T. *trinerviam* * (Laurus aggregata Bot. mag. 2497.)

Post n. 10. *megapotamica* * 15. T. foliis lanceolatis acuminati utrinque glaberrimis venosis, paniculis axillaribus diffusis ebracteatis, pedicellis paucifloris *Rio grande.* Sello.

*Dashia* Don. 16. T. foliis lanceolatis acutis 1nerviis glabris, pedunculis lateralibus corymbiferis, floribus 6partitis 12andris. *Nepal.*

*Cuipala* Don. 17. T. foliis elliptico-oblongis acutis 3plinervii glabris subtus glaucis, umbellis lateralibus sessilibus glomeratis, involucris 6phyllis imbricatis floribus 4partitis 6andris. *Nepal.*

*pallens* Don. 18. T. foliis ellipticis acutis 3plinerviis glabris subtus glaucis, umbellis axillaribus sessilibus glomeratis, floribus ♀ 4partitis. *Nepal.*

pag. 268.

Ad *Perseam* Gärtn.

Post n. 8. *Cathia* * 45. P. foliis oblongis acutis multinerviis subtus ramulisque tomentosis, paniculis axillaribus longe pedunculatis. *Nepal.* (Cinnamomum Cathia Don.)

*nitida* * 46. P. foliis oppositis elliptico-oblongis obtusis 3nerviis glabris subtus glaucis, ramis glabris, paniculis supraxillaribus erectis, floribus ternis. *Ind. or.* (Cinnamomum nitidum Hook. exot. fl. t. 176., Laurus Cassia Nees.)

Post n. 12. †*pyrifolia* * 47. P. foliis oblongis acutis venosis glabris subtus pallidis, panicula terminali multiflora. *Nepal.* (Cinnamomum Don.)

*tomentosa* * 48. P. foliis lanceolatis acutis venosis subtus racemisque terminalibus paniculatis tomentosis. *Nepal.* (Cinnamomum Don.)

pag. 271.

Ad *Anacardium.*

*Rhinocarpus* Cand. 2. A. foliis amplis spathulato-lanceolatis obtusis glabris reticulato-venosis, panicula corymbosa rufescente. *Ad fl. Magdalen.* (Rhinocarpus excelsus Berter. Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 601.) A. occidentale habet folia magis elliptica retusa, paniculam diffusam glabriusculam, stamen unicum abortiens, cum in nostra 6-8 abortiant. Idem tamen genus esse, plurima suadent.

pag. 272.

Ad *Rheum.*

*australe* Don. 7. Rh. foliis cordato-subrotundis obtusis subtus margineque scabris, petiolis sulcatis teretius-

caulis ramisque papilloso-asperis, sepalis oblongis apice crenulatis. *Nepal.*

pag. 273.

Ad *Butomum.*

*…ifolius* Don. 2. B. foliis longe petiolatis elliptico-oblongis nervosis, umbella pauciflora, spatha diphylla. *Nepala.*

---

# CLASSIS X.

pag. 274.

…ſt n. 1541. *Pernettia* Gaudich. Cal. 5partitus. Cor. urceolata, limbo 5fido revoluto. Filamenta basi incrassata. Antherae apice 2lobae, lobis 2fidis. Glandulae 10 3lobae perigynae. Bacca polysperma.

1543. *Encyanthus* Lour. capsulam fert, non baccam. Lindley. Enkianthum Lour. (ab ἔγκυος, quod male intellectos flores indicat) mutare debebat.

pag. 275.

…ſt n. 1561. *Mauria* Kunth. Cal. urceolatus 4-5lobus persistens. Pet. 4, 5 ovata. Filamenta subulata. Discus orbicularis. Stigma augulatum. Fructus 1spermus.

pag. 276.

…ſt n. 1564. *Cyrtocarpa* Kunth. Cal. 5partitus cum petalis patentibus nervoso-venosus. Discus orbicularis 10crenatus. Stigma sub-4fidum. Fructus drupaceus 5tuberculatus, calyce corolla staminibusque persistentibus suffultus.

…ſt n. 1569. *Micromelum* Blum. Cal. urceolatus integer persistens. Pet. 5 linearia. Stam. alterna breviora. Antherae didymae. Bacca exsucca, dissepimentis 5 1-2spermis.

pag. 277.

2. *Eriostemon* Sm. Filamenta pilosa. Antherae apice appendiculatae.

*…balium* Vent. Cal. 5fidus. Pet. 5. Stam. glabra. Antherae apice emarginatae s. glanduloso-callosae. Fructus 5coccus.

*…otia* Jacqu. et *Omphalobium* Gärtn. (non Jacqu. fil.) melius in cl. XVI. collocantur, ubi sientius secundum Candollei nupera sobservationes digestae quaerantur.

pag. 278.

n. 1612. *Godoya* R. et P. melius ad cl. XIII.

pag. 279.

Post n. 1628. *Bowdichia* Kunth. Cal. campanulatus 5dentatus, dentibus 2 superioribus conniventibus. Cor. 5petala subpapilionacea. Legumen stipitatum membranaceum hinc alatum. Semina compressa.

pag. 281.

Post n. 1664. *Baphia* Afz. Cal. calyptraeformis florem includens subtus hians. Vexillum patens subrotundum alas lineares aequans. Carina acuta. Legumen falciforme.

Post n. 1678. *Geissoïs* Labill. Cal. 4sepalus. Cor. 0. Stam. hypogyna exserta. Stylus 2partitus. Fructus siliquaeformis elongatus 2locularis, seminibus alatis imbricatis. *Familia?*

*Detarium* Juss. Cal. 4fidus. Cor. 0. Stamina alterna breviora. Stigma simplex. Drupa orbicularis, putamine farinaceo, 1sperma. *Familia?*

pag. 284.

Post n. 1737. *Poupartia* Commers. Flores diclini. Cal. 5fidus. Pet. 5 patentissima. Styli 5 approximati. Drupa nucleo 2-5loculari. *Terebinthaceae.*

---

pag. 287.

Post *Arbutum*:

PERNETTIA Gaudich.

*empetrifolia* Gaud. 1. (Arbutus pumila Forst.) Hab. et in *Ins. Falkland.*

*mucronata* Gaud. 2. (Arbutus mucronata Forst.)

*microphylla* Gaud. 3. (Arbutus microphylla Forst.)

Ad *Encyanthum* Lour.

E. *quinqueflorus* Lour. melius sic definitur: pedunculis aggregatis, sepalis patulis ovato-lanceolatis germen aequantibus, foveis nectariferis diaphanis, foliis oblongis utrinque attenuatis marginatis. *China.* Bot. reg. 884. (Melidora pellucida Salisb.)

*reticulatus* Lindl. 2. E. pedunculis aggregatis, sepalis ovatis appressis germine brevioribus, foveis nectariferis obscuris, foliis oblongis utrinque attenuatis reticulatis. *China.* Bot. reg. 885.

*biflorus* Lour. 3. E. pedunculis geminis, sepalis lanceolatis patulis pilosis, foliis parvis ovato-lanceolatis villosis. *China.*

pag. 288.

Ad *Gaultheriam.*

Poſt n. 4. *nummularioides* Don. 18. G. caule filiformi procumbente ſetoſo, foliis ſubſeſſilibus cordatis mucronatis ſupra nudis ſubtus margineque hiſpidis, pedunculis axillaribus breviſſimis ſolitariis bracteolatis. *Emodi montes.*

*myrtilloides* Schlechtend. 19. G. foliis oblongo-lanceolatis ſubtus ramisque ſetoſo-hirſutis, pedunculis breviſſimis bracteatis. *Braſil.* Sello.

Ad G. *fragrantiſſimam* Wallich. (G. fragrans Don.)

G. *hiſpida* * deleatur, reditura ſub *Luſſacia* *.

Ad G. *tomentoſam* Kunth. (G. ferruginea Schlechtend. *Braſil.*)

pag. 289.

Ad *Andromedam.*

Poſt n. 5. *Redowskii* Chamiſſ. 35. A. foliis 4fariam imbricatis ſquamaeformibus laevibus nitidis fimbriatis, ramis exacte 4gonis, floribus 8andris. *Sibir. or.*

pag. 290.

Poſt n. 22. *ovalifolia* Wallich. 36. A. arborea, foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis ſubcoriaceis glabriusculis, racemis lateralibus foliatis multifloris, pedicellis ſecundis pubeſcentibus, laciniis calycis ovatis acutis, corollis oblongis pubeſcentibus. *Nepal.*

*lanceolata* Wallich. 37. A. fruticoſa, foliis ellipticis acutiusculis membranaceis glabris, racemis terminalibus erectis, pedicellis cernuis directione variis ſquamuloſis, laciniis calycis obtuſis ciliatis, corollis ovatis pubeſcentibus. *Nepal.* (A. ſquamuloſa Don.)

*formoſa* Wallich. 38. A. arboreſcens, foliis lanceolatis acuminatis crenulatis glabris, racemis compoſitis thyrſoideis, pedicellis ſecundis cernuis calycibusque pruinoſis, laciniis calycis ovato-oblongis marginatis, corollis ovalibus. *Nepal.*

pag. 291.

Poſt n. 26. *eucalyptoides* Schlechtend. 39. A. fruticoſa, foliis petiolatis oblongis acuminatis integerrimis glabris, racemis lateralibus. *Rio grande.* Sello.

*nummularia* Schlechtend. 40. A. fruticoſa, foliis breviter petiolatis cordatis ovatis ſubretuſis coriaceis glabriusculis, racemis hiſpidis. *Rio grande.* Sello.

*pulcra* Schlechtend. 41. A. fruticoſa glabra, foliis petiolatis ovatis mucronatis coriaceis, racemis ſecundis axillaribus terminalibusque laevibus. *Braſil.*

*neriifolia* Schlechtend. 42. A. fruticoſa glaberrima, foliis petiolatis ovato-lanceolatis acutis coriaceis, panicula racemoſa terminali. *Braſil.*

pag. 292.

*Rhododendron arboreum* Sm. habet folia ſubtus argenteo-lepidota, racemos multifloros ſubcapitatos.

pag. 294.

Ad *Luſſaciam* *.

*Vaccinium* * 2. L. glabriuscula, foliis ovalibus mucronatis apice ſubſerratis, racemis aggregatis bracteatis ſecundis, corolla cylindrico-urceolata. *Braſil.* (Vaccinium braſilienſe * Syſt. 2. p. 212. Gay-Luſſacia Pſeudo-Vaccinium Schlechtend.)

*ſalicifolia* * 3. L. glaberrima pruinoſa, foliis oblongo-lanceolatis apice ſubſerratis, racemis paucifloris ebracteatis. *Braſil.* (Gay-Luſſacia Schlechtend.)

*Rhododendron* * 4. L. ramis hiſpidis, foliis obovato-oblongis calloſo-mucronatis apice obſolete ſerratis, floribus racemoſis. *Braſil.* (Gay-Luſſacia Schlechtend.)

*rugoſa* * 5. L. ramis hiſpidis, foliis oblongis retuſis rugoſis margine revolutis ſupra ſcabris ſubtus hirſutis, floribus racemoſis. *Braſil.* (Gay-Luſſacia Schlechtend.)

*hiſpida* * 6. L. ramis hirtis, foliis oblongis utrinque rotundatis apice calloſis integerrimis margine revolutis hiſpidiuſculis, racemis terminalibus foliatis ſtrictis ſecundis viſcoſo-piloſis. *Braſil.* (Gaultheria hiſpida * Syſt. 2. p. 288. Gay-Luſſacia Pſeudo-Gaultheria Schlechtend.)

*incana* * 7. L. incano-tomentoſa, foliis oblongis calloſo-mucronatis integerrimis revolutis, racemis bracteatis ſecundis. *Braſil.* (Gay-Luſſacia Schlechtend.)

*pinifolia* * 8. L. glaberrima pruinoſa, foliis confertis linearibus utrinque attenuatis crenatis, pedunculis paucifloris axillaribus bracteatis. *Braſil.* (Gay-Luſſacia Schlechtend.)

pag. 299.

Ad *Melaſtoma.*

Poſt n. 63. † *normale* Don. 167. M. foliis ovato-ellipticis acutis 5nerviis ſupra hiſpidis ſubtus lanatis, ramis ſetoſo-piloſis, floribus ternis, calyce ſquamulis ciliatis canis appreſſis veſtito. *Nepal.*

pag. 302.

Poſt n. 111. *denticulatum* Labill. 168. M. foliis oblongis acuminatis 3-5nerviis ſubtus flavidis rufo-punctatis, corymbis paucifloris, floribus 6petalis, denticulis lacinias calycis intercedentibus. *Nov. Caledon.*

pag. 309.

Ad *Rhexiam.*

Poſt n. 49. *paniculata* Hamilt. 86. Rh. foliis elliptico-oblongis acuminatis ſerrulatis coriaceis ſubtus ramisque lana-

lanatis, panicula ampla pyramidata, floribus cernuis. *Nepal.* (Arthrostemma Don.)

pag. 311.

Post n. 84. *bidentata* Mart. 86. Rh. fruticosa, foliis fasciculatis lanceolatis acutis 2dentatis glabris, floribus corymbosis 5andris, calycibus muricatis. *Brasil.*

pag. 312.

Ad *Osbekiam.*

Ad O. *nepalensem* Hook. (O. speciosa Don.)

Post n. 5. *Chulesis* Don. 20. O. foliis cordato-oblongis mucronulatis 5nerviis pilosis subtus canescentibus, ramis lepidotis, floribus corymbosis, squamis calycis ciliato-setosis. *Nepal.*

pag. 313.

Post n. 17. *ternifolia* Don. 21. O. ramis 3gonis, foliis ternis lanceolatis acutis 3nerviis margine hispidis, floribus racemoso-paniculatis, bracteis cordatis, laciniis calycis acutis hispidis. *Nepal.*

*rostrata* Don. 22. O. foliis ovato-lanceolatis acutis sub-5nerviis glabriusculis, floribus corymbosis, bracteis cordatis, calycibus setosis ciliatis. *Nepal.*

*angustifolia* Don. 23. O. foliis subsessilibus lineari-lanceolatis acutis obsolete 3nerviis ramisque 4gonis pilosis, floribus sessilibus glomeratis bracteatis, laciniis calycis ovatis. *Nepal.*

Ad *Boswelliam.*

B. *turifera* Colebr. habet potius folia pubescentia.
B. *balsamifera* * est in B. *glabram* Roxb. mutanda.
B. *hirsuta* Sm. (non *.)

Post *Garugam* Roxb.:

## MAURIA Kunth.

*simplicifolia* Kunth. 1. M. foliis simplicibus oblongis obtusis glabris, ramis verrucosis, floribus paniculatis. *Patria?* Humb. nov. gen. 7. t. 605. Eadem videtur cum Mangifera axillari Desrouss. in Encycl. bot. 3. p. 697. et Cambessedea Kunth. ad Humb. nov. gen. 7. p. 2. Hanc Sonneratus ex *Ind. or.* attulerat.

*heterophylla* Kunth. 2. M. foliis ternatis 2jugisque oblongis retusis glabris, ramis verrucosis, paniculis axillaribus terminalibusque. *Peru.* Humb. nov. gen. 7. t. 606.

Post *Baraultiam* Steud.:

## CYRTOCARPA Kunth.

*procera* Kunth. *Nov. Hispan.* Arbor procerissima, foliis pinnatis, floribus paniculatis albis.

pag. 314.

Ad *Glycosmida.*

Gl. *pentaphylla* Colebr. (Sclerostylis Blum.)

*cyanocarpa* * 3. Gl. foliolis oblongis obtusiusculis, corymbis axillaribus terminalibusque. *Java.* (Cookia Blum.)

*chlorofperma* * 4. Gl. foliolis oblongo-lanceolatis, racemis compofitis terminalibus. *Java*. (Cookia Blum.)

*trifoliata* * 5. Gl. foliis fimplicibus ternatisque oblongo-lanceolatis obtufis, racemis axillaribus breviffimis. *Java*. (Scleroftylis Blum.)

*fimplicifolia* * 6. Gl. foliis fimplicibus oblongo-lanceolatis obtufiusculis, racemis axillaribus breviffimis. *Java*. (*Scleroftylis lanceolata* Blum.)

Ad *Limoniam*.

Poft n. 9. *retufa* Don. 10. L. foliis obovato-ellipticis retufis, petiolis femiteretibus, pedunculis fubfolitariis 1floris. *Nepal*.

*fpinofa* * 11. L. fpinofa, foliis ovato-oblongis acutiusculis obfolete crenatis, pedunculis 1floris. *Inf. ad Javae oras*. (Scleroftylis Blum.)

pag. 315.

*Murraya paniculata* Cand. pedunculos habet fubfolitarios axillares. Hook. exot. fl. t. 184.

Poft *Murrayam*:

## MICROMELUM Blum.

*pubefcens* Blum. *Java*. Arbor foliis impari-pinnatis 4jugis; foliolis oblongis fubtus ramulisque pubefcentibus.

pag. 317.

Ad *Monotropam*.

M. *Morifoniana* Mx. et in *Nepal.* habitare, Don.

*humilis* Don. 6. M. caule 1floro, fquamis approximatis oblongis obtufis integerrimis, petalis intus filamentisque pilofis, ftigmate umbilicato 7fulcato. *Nepal*.

pag. 318.

Ad *Gomphiam*.

G. *oleaefolia* Hilar. habet petala calycem fuperantia.

Poft n. 9. *parvifolia* Hilar. 25. G. foliis feffilibus parvis ovatis fubintegerrimis fubtus ramulisque pubefcentibus, floribus thyrfoideis bracteatis, petalis orbiculatis. *Brafil*.

*floribunda* Hilar. 26. G. foliis imbricatis oblongis acutiusculis fubintegerrimis, paniculis terminalibus bracteatis, petalis obovato-orbiculatis. *Brafil*.

*fuaveolens* Hilar. 27. G. foliis oblongis acuminatis fubintegerrimis fubeveniis, floribus thyrfoideis numerofiffimis parvis, calyce corollam aequante, antheris laevibus. *Brafil*.

*cufpidata* Hilar. 28. G. foliis oblongis obtufis mucronatis fubintegerrimis glaberrimis, racemis terminalibus, antheris transverfe rugofis. *Brafil*.

G. *parviflora* Cand. habet folia integerrima, petala calycem fuperantia. (Correia 2. Vand.)

*hexaſperma* Hilar. 29. G. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis obſolete ſerratis ſubtus eveniis, paniculis terminalibus. *Braſil.*

*olivaeformis* Hilar. 30. G. glaberrima, foliis oblongis acuminatis obſolete ſerratis, racemis terminalibus, antheris laeviusculis, receptaculo carnoſo turbinato. *Braſil.*

*curvata* Hilar. 31. G. glaberrima, foliis ovato-oblongis acutis coriaceis venoſis apice ſerrulatis, racemis compactis incurvis, pedicellis tuberculatis, petalis calyce longioribus *Braſil.*

*glaucescens* Hilar. 32. G. glaberrima, foliis ſubcordato-oblongis mucronatis apice ſerrulatis glaucescentibus, racemis terminalibus, petalis obovatis calycem excedentibus, antheris transverſe ruguloſis. *Braſil.*

*lucens* Kunth. 33. G. foliis ſparſis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis remote ſerrulatis obſolete venoſis membranaceis nitidis, racemis terminalibus compoſitis. *Nov. Granat.*

*ſemiſerrata* Mart. 34. G. foliis ellipticis antrorſum ſerratis coriaceis, floribus paniculatis, petalis orbiculatis. *Braſil.*

*perſiſtens* Hilar. 35. G. glaberrima, foliis oblongis acuminatis ſerratis coriaceis, paniculis terminalibus, calycibus perſiſtentibus, petalis calycem ſubaequantibus. *Braſil.*

*venoſa* * 36. G. foliis lanceolatis acuminatis ſerrulatis ſubtus venoſis, racemis paniculatis, antheris transverſe ruguloſis. *Braſil.* (G. nervoſa Hilar.)

*humilis* Hilar. 37. G. ſuffruticoſa glaberrima, foliis oblongis coriaceis ſubſerratis, racemis paniculatis, petalis obovatis calycem ſuperantibus, antheris transverſe ruguloſis. *Braſil.*

*nana* Hilar. 38. G. ſuffruticoſa, foliis ovato-oblongis acutis ſerratis, ſtipulis perſiſtentibus, floribus axillaribus racemoſis, terminalibus paniculatis, petalis calycem ſubaequantibus, antheris transverſe ruguloſis. *Braſil.*

## pag. 319.

### Ad *Quaſſiam.*

*verſicolor* * 5. Qu. floribus dioecis 10andris paniculatis, foliis pinnatis, foliolis elliptico-oblongis obtuſiſſimis retuſis coſta media pubeſcentibus. *Braſil.* (Simaruba Hilar.)

### Ad *Zwingeram* Schreb.

*quaſſioides* * 8. Zw. foliis pinnatis 4jugis, foliolis elliptico-oblongis acuminatis ſerratis, corymbis trichotomis, floribus 5andris 5gynis. *Nepal.* (Simaba Don.)

## pag. 320.

### Ad *Rutam.*

Ante n. 13. Rutae ſimplicifoliae *Aplophyllae* genus Adr. Juſſ.

*cordata* Don. 23. R. foliis amplexicaulibus cordatis integerrimis glaucis, floribus corymbosis, petalis integerrimis, filamentis glabris. *Nepal.*

pag. 321.

Ad *Eriostemonem* Sm.

Post n. 4. *neriifolius* Sieb. 8. E. foliis lanceolatis marginatis mucronatis punctatis, pedunculis axillaribus 3floris, filamentis barbatis. *Nov. Holl.*

*hispidulus* Sieb. 9. E. foliis subspathulatis mucronatis calloso-crenatis supra hispidis subtus stellato-villosis, pedunculis 1floris. *Nov. Holl.*

*corymbosus* Labill. 10. E. foliis oblongis subtus sericeis rufo-lepidotis, corymbis terminalibus, filamentis pilosis, antheris apice nudis. *Nov. Caledon.*

PHEBALIUM Vent.

*correaefolium* Adr. Juss. 1. Ph. foliis lanceolatis supra scabris subtus stellato-tomentosis, pedunculis axillaribus ternis. *Nov. Holl.* (Ph. ovatum Sieb.)

*hexapetalum* Adr. Juss. 2. Ph. foliis oblongis obtusis utrinque stellato-tomentosis, pedunculis terminalibus congestis, floribus 6petalis 12andris. *Nov. Holl.*

*squamulosum* Vent. 3. Ph. foliis lineari-oblongis acutis subtus floribusque lepidotis, staminibus exsertis. *Nov. Holl.* (Eriostemon lepidotus * Syst. 2. 322.)

*anceps* Cand. 4. Ph. foliis spathulato-lanceolatis glabriusculis, floribus corymbosis lepidotis, staminibus corolla brevioribus. *Nov. Holl.* (Eriostemon anceps Syst. veg. 2. p. 322.)

*Billarderii* Adr. Juss. 5. Ph. foliis lanceolatis integerrimis subtus rufo-lepidotis, ramulis angulatis, pedunculis axillaribus 3floris, staminibus exsertis. *Nov. Holl.* (Eriostemon squameus Labill., Ph. elaeagnoides Sieb.)

*elaeagnifolium* Adr. Juss. 6. Ph. foliis linearibus obtusis supra seriatim punctatis subtus argenteo rufoque lepidotis, pedunculis terminalibus umbellatis, staminibus exsertis. *Nov. Holl.* (Ph. anceps Sieb.)

*salicifolium* Adr. Juss. 7. Ph. foliis lineari-lanceolatis crenatis subtus stellato-pulverulentis, floribus axillaribus umbellatis, staminibus exsertis. *Nov. Holl.*

*phylicoides* Sieb. 8. Ph. foliis linearibus obtusis asperis subtus revolutis, ramis strictis hispidis, fasciculis terminalibus, staminibus exsertis. *Nov. Holl.* (Ph. diosmeum Adr. Juss.)

pag. 323.

Ad *Zygophyllum fruticulosum* Cand., floribus 4fidis. (Röperia Adr. Juss.)

pag. 325.

Ad *Entadam* Adans.

*Plumerii* * 3. E. foliis 2pinnatis cirro terminatis, partialibus 4-propriis 6jugis, foliolis oblongis obtusis gla-

bris, ſpicis aggregatis denſe imbricatis, caule ſcandente. *Ind. occid.* (Mimoſa polyſtachya L. Syſt. 2. p. 205.)

Ad *Deſmanthum* W.

*leptophyllus* Kunth. 9. D. ſuffruticoſus inermis, foliis 2pinnatis glabris, partialibus 6-7-propriis multijugis, foliolis inaequilateris linearibus acutis ciliatis, petiolo baſi glandulifero, capitulis paucifloris. *Cumana.*

pag. 326.

Ad *Prosopin.*

Poſt n. 4. *elegans* * 8. Pr. foliis 2pinnatis, partialibus 4-propriis multijugis, foliolis linearibus ſubfalcatis mucronatis, petiolis eglanduloſis, ſpicis cylindricis. *Rio grande.* Sello.

*Bonplandiana* * 9. Pr. foliis 2pinnatis ſubtus pubeſcentibus, partialibus 4-propriis 8-9jugis, foliolis oblongis obtuſis, petiolo eglanduloſo, ſpicis geminis terminalibus. *Caracas.* (Adenanthera Bonplandiana Kunth.)

*inermis* Kunth. 10. Pr. foliis 2pinnatis ſubtus ſubpubeſcentibus, partialibus 3-propriis 6-13jugis lineari-oblongis, petiolo 2-3glanduloſo, ſpicis axillaribus ſolitariis. *Peru.*

*dubia* Kunth. 11. Pr. foliis 2pinnatis glabris, partialibus 12-propriis 15jugis, foliolis lineari-oblongis acutis, petiolo 2glanduloſo. *Nov. Granat.*

*tamariſcina* * 12. Pr. foliis 2pinnatis glabriuſculis, partialibus propriisque multijugis, foliolis imbricatis linearibus ſubciliatis, petiolo glandulifero, ſpicis terminalibus paniculatis. *Inſ. Maſcaren.* (Acacia W. Syſt. 3. 138., Gagnebina Cand.)

† *elephantorrhiza* * 13. Pr. glaberrima, foliis 2pinnatis, partialibus 10-12-propriis multijugis, foliolis linearibus, petiolis eglanduloſis, ſpicis axillaribus ſolitariis. *Afric. auſtr.* (Acacia Burch. Cand.)

Poſt n. 7. *juliflora* Cand. 14. Pr. ſpinis ſtipularibus geminis, foliis 2pinnatis, partialibus 2-propriis multijugis, foliolis oblongis obtuſis glabris, petiolo baſi glandulifero, ſpicis pendulis, germinibus villoſis. *Ind. occid. Amer. auſtr.* (Mimoſa piliflora Sw., Acacia juliflora W. Syſt. 3. p. 142.)

pag. 327.

Ad *Guilandinam.*

*ciliata* Berg. 6. Gu. ramis angulatis aculeatis, ramulis ferrugineo-tomentoſis, foliis abrupte pinnatis 3-6jugis glabriuſculis, foliolis oblique orbiculatis emarginatis, racemis ſpicatis, lomentis ellipticis aculeatis. *Inſ. Bartholom. in Caribaeis.* O. B. Bergius om Veſtindien Stockh. 1819. Wikſtröm. in Stockh. acad. handl. 1825. p. 431.

pag. 331.

Ad *Combretum.*

Poſt n. 6. *parviflorum* Reichenb. 7. C. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis venoſis ſubtus lepidotis, ſpicis axillaribus ferrugineis. *Senegambia.*

*nanum* Don. 8. C. foliis ovalibus obtuſis glabris, ſpicis pubeſcentibus. *Nepal.*

pag. 333.

Ad *Bauhiniam.*

B. *variegata.* (Schnellia microſtachya Radd., Pauletia multinervia Kunth.)

† B. *ungulata.* (Schnellia macroſtachya Radd., Pauletia picta Kunth.)

† B *parviflora* Vahl. (Pauletia glauceſcens Kunth. *Cumana.*)

B. *Pes caprae* Cav. (Caſparea Kunth.)

*ſuaveolens* Kunth. 24. B. foliis cordatis ſubrotundo-ovatis, lobis rotundatis patulis multinerviis ſubtus pubeſcentibus, racemis terminalibus, calycibus ſericeis. *Nov. Holl.*

B. *porrecta* Ait. (B. cumanenſis Kunth.)

pag. 334.

Ad B. *aculeatam.* (Pauletia glanduloſa Kunth.)

Ad B. *heterophyllam* Link. (B. ſplendens Kunth.)

Ad *Caſſiam.*

Ad C. *braſilianam* Lam. (Bactyrilobium ferrugineum Schrad., Caſſia Trinitatis Reichenb., moſchata Kunth.)

Ad C. *javanicam.* (C. Sieberiana Cand.) *Senegambia.*

*Humboldtiana* Cand. 119. C. foliis 14jugis oblongis acutiuſculis ſupra glabris ſubtus villoſiuſculis, petiolo eglanduloſo, racemis multifloris, leguminibus compreſſiuſculis undulato-annulatis. *Ad fl. Magdalen.* (C. ſpecioſa Kunth.)

Ad C. *Fiſtulam.* (C. excelſa Kunth., Bonplandiana Cand.)

pag. 335.

Poſt n. 5. *laeta* Kunth. 120. C. foliis 4jugis elliptico-oblongis acuminatis utrinque villoſis, petiolo eglanduloſo, pedunculis 4-8floris. *Nov. Granat.*

Poſt n. 8. *puberula* Kunth. 121. C. foliis 2jugis inaequilateris acutis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus, ſuperioribus elliptico-oblongis, inferioribus minoribus ſubrotundo-ovatis, petiolo baſi glandulifero, racemis axillaribus. *Nov. Granat.*

Poſt n. 11. *excelſa* Schrad. 122. C. foliis 10-15jugis elliptico-oblongis mucronatis baſi inaequalibus ſupra glabriuſculis nitidis ſubtus villoſis, corymbis paniculatis. *Braſil.* (C. faſtigiata Nees.)

pag. 336.

Post n. 24. *strobilacea* Kunth. 123. C. foliolis oblongis emarginatis supra pilosiusculis, subtus villosis, petiolo eglanduloso, racemis axillaribus, bracteis flores obvallantibus, leguminibus compressis torulosis. *Ad fl. Magdalen.* (C. Tarantan Kunth. var.?)

Post n. 29. *fraxinifolia* Kunth. 124. C. foliolis oblongis obtusis glabris, petiolo eglanduloso, racemis axillaribus corymboso-congestis, leguminibus compressis laevibus. *Ad fl. Amazonum.*

pag. 337.

Post n. 41. *purpurea* Carey. 125. C. foliolis lanceolatis pilosis, petiolo basi glandulifero, ramis purpureis, racemis congestis folio brevioribus, floribus 8andris. *Bengal.* Bot. reg. 856.

pag. 338.

Post n. 48. *pistaciaefolia* Kunth. 126. C. foliolis oblongis retusis supra glabris subtus pubescentibus, petiolo eglanduloso, floribus racemosis, leguminibus compressis transverse venosis. *Popayan in Columbia.*

Ad C. *tomentosam.* (C. cana Schrank.)

Ad C. *bifloram.* (C. nemorosa Kunth., rostrata Mart., aversiflora Herb. in Bot. mag. 2638.)

pag. 339.

Post n. 65. *venustula* Kunth. 127. C. foliolis obovato-ellipticis obtusis pubescentibus, petiolo basi glandulifero, racemi terminalis pedunculis 2floris. *Cumana.*

*acapulcensis* Kunth. 128. C foliolis obovato-ellipticis supra glabris subtus pubescentibus punctato-maculatis, petiolo basi glandulifero, pedunculis axillaribus 2floris. *Mexico.*

Post n. 70. *artemisioides* Cand. 129. C. incano-villosa, foliolis lineari-filiformibus, petiolo basi glandulifero, racemis axillaribus paucifloris folio brevioribus. *Nov. Holl.*

*glutinosa* Cand. 130. C. foliolis oblongis acuminatis ramisque glutinosis glabris, petiolo basi glandulifero, racemis axillaribus paucifloris. *Nov. Holl.*

*Alcaparillo* Kunth. 131. C. foliolis obovato-oblongis glabris, petiolis basi glanduliferis, racemis axillaribus terminalibusque laxis. *Peru.*

*elliptica* Kunth. 132. C. foliolis ellipticis retusis utrinque incano-villosis, petiolo eglanduloso, racemis axillaribus. *Cumana.*

*Peralteana* Kunth. 133. C. foliolis oblongis obtusis utrinque pubescentibus subtus incanis, petiolo eglanduloso, racemis axillaribus. *Mexico.*

*canescens* Kunth. 134. C. foliolis elliptico-subrotundis supra villosis subtus incano-tomentosis, petiolo eglanduloso, racemis axillaribus pendulis. *Quito.*

*argentea* Kunth. 135. C. foliolis subellipticis obtusis sericeis subtus argenteis, petiolo basi glanduloso, floribus axillaribus solitariis, terminalibus subracemosis, leguminibus gracilibus. *Mexico.*

pag. 340.

Post n. 80. *barbata* Mart. 136. C. foliolis ovato-oblongis obtusis subtus pubescentibus, petiolo eglanduloso, floribus racemosis bracteatis, leguminibus hirsutis. *Brasil.*

Post n. 84. *lotoides* Kunth. 137. C. foliolis obovatis obtusis glabris, petiolo eglanduloso, racemis terminalibus viscoso-pilosiusculis. *Cumana et ad Orinocum.*

Post n. 85. *cultrifolia* Kunth. 138. C. foliolis oblongo-lanceolatis falcato-ensiformibus apice denticulato-ciliatis glabris, petiolo glandulifero, ramis hinc pilosis, pedunculis axillaribus solitariis 1floris hirsutis bibracteatis. *Ad Orinocum.*

*fabaginifolia* Kunth. 139. C. foliolis dimidiato-cordatis obovatis subretusis glabris ciliatis, petiolo eglanduloso ramisque villosis, pedunculis axillaribus 1floris glabris bibracteatis. *Mexico.*

pag. 341.

Post n. 91. *viscosa* Kunth. 140. C. foliolis obovatis emarginatis viscoso-pilosiusculis, petiolo eglanduloso, ramis racemisque multifloris glutinoso-pilosis. *Nov. Granat.*

*pauciflora* Kunth. 141. C. foliolis ellipticis viscosis, petiolo eglanduloso, ramis racemisque terminalibus paucifloris viscoso-pilosis. *Mexico.*

Post n. 94. *tenella* Kunth. 142. C. foliolis oblongis glabris, petiolo glandulifero, pedunculis 1floris 2bracteatis pilosiusculis, caule procumbente. *Ad Orinocum.*

*obcordata* Sw. 143. C. foliolis obcordatis striato-venosis glabris, petiolo basi glandulifero, pedunculis subterminalibus 1floris, leguminibus pubescentibus. *Ins. Bartholom. in Caribaeis.* Act. holm. 1825. p. 429.

Post n. 98. *Swartzii* Wikstr. 144. C. foliolis spathulato-linearibus mucronatis basi obliquis glabris, pedunculo basi glandulifero, pedunculis subterminalibus 1floris, leguminibus curvatis glabris. *Ins. Bartholom. in Caribaeis.* Act. holm. 1825. p. 430.

pag. 342.

Ad C. *Patellariam* Cand. (C. biglandulosa Bertol. in opusc. scient. 3, p. 409.)

*flavicoma* Kunth. 145. C. foliolis lineari-oblongis pubescentibus, glandula stipitata petiolari, pedunculis 1floris 2bracteatis ramisque pilosis. *Mexico. Amer. austr.* C. riparia, propinqua, felipensis, tristicula, ramosissima Kunth. varr.

Post n. 113. *dimidiata* Hamilt. 146. C. foliolis linearibus mucronatis ciliatis, petiolo glandulifero, stipulis lan-

ceolatis nervosis, pedunculis axillaribus geminis 1floris 2bracteatis, leguminibus hirsutis. *Nepal.*

*arenaria* Kunth. 147. C. foliolis linearibus glabris margine hispido-scabris, inferioribus stipulisque ciliatis, petiolo biglanduloso, pedunculis 1floris 2bracteatis ramisque pilosis. *Amer. austr.*

pag. 343.

Ad *Caesalpiniam.*

Post n. 2. 3. *glabrata* Kunth. 20. C. glaberrima, foliis abrupte 2pinnatis, partialibus 3-4-propriis 4-5jugis, foliolis oblongo-ellipticis utrinque rotundatis coriaceis, racemis terminalibus congestis, staminibus corollam subaequantibus, leguminibus oblongis subtorulosis. *Quito.*

† *melanosticta** 21. C. foliis 2pinnatis, partialibus 2-propriis 4jugis, terminali elongato 8jugo, stipulis pinnatifidis, racemis elongatis, calycibus foliolisque glanduloso-punctatis. *Afric. austr.* (Melanosticta Burchellii Cand.)

*mollis* * 22. C. foliis 2pinnatis, partialibus 2-propriis 4jugis, foliolis ovato-oblongis obtusis, petiolis racemisque et leguminibus substipitatis tomentosis, calycis glandulosi lacinia inferiore fimbriata. *Ad fl. Magdalen.* (Adenocalyx racemosus Berter., Coulteria mollis Kunth.)

*pectinata* Cav. 23. C. foliis 2pinnatis glabris, partialibus 2-4-propriis 6-8jugis, foliolis oblongis, nervo medio subtus pubescente, calycis hirsuti lacinia inferiore fimbriata. *Amer. austr.* (Coulteria tinctoria Kunth.)

pag. 344.

Post n. 16. *ligulata* Rottl. 24. C. foliis 2pinnatis, partialibus 4-propriis 6jugis, foliolis ovalibus obtusis, petiolis retrorsum aculeatis, floribus paniculatis. *Ind. or.*

*Cacalaco* Humb. 25. C. foliis abrupte 2pinnatis, partialibus propriisque 4jugis, foliolis obovato-subrotundis emarginatis membranaceis glabris nitidis, racemis terminalibus villosis, staminibus corollam subaequantibus, leguminibus torulosis. *Mexico.* Humb. pl. aequinoct. 2. t. 137.

*horrida* * 26. C. foliis 2pinnatis aculeatis glabris, partialibus 2-propriis 4-7jugis, foliolis oblongis, calycis hirsuti lacinia infima fimbriata. *Amer. austr.* (Coulteria horrida Kunth. Humb. nov. gen. 6. t. 568.)

Post *Caesalpiniam:*

## BOWDICHIA Kunth.

*virgilioides* Kunth. *Amer. austr.* Arbor inermis foliis pinnatis, foliolis oblongis obtusis subtus ferrugineo-tomentosis, racemis congestis, floribus violaceis.

## pag. 345.

Ad *Cubaeam* Scop.

*ſpecioſa* * 4. C. arborea, foliis pinnatis, panicula ampla prolifera. *Braſil.* (Moldenhawera floribunda Schrad., Dolichonemia ſpecioſa Nees.)

Ad *Parkinſoniam.*

*orientalis* * 3. P. inermis, foliis pinnatis glabris, foliolis ſub-7jugis alternis oblongis, pedunculis axillaribus geminis 1floris. *Inſ. Molucc.* (Solulus arbor Rumph. 4. t. 128. Diphaca cochinchinenſis Lour., Dalbergia Diphaca Perſ.)

Ad *Afzeliam* Sm.

*bijuga* * 2. A. foliis 2jugis ellipticis coriaceis glabris, racemis lateralibus, floribus polygamis 7andris. *Guinea.* (Pancovia bijuga W. Syſt. veg. 2. p. 157.)

Ad *Hymenaeam.*

*Candolleana* Kunth. 4. H foliolis baſi inaequalibus coriaceis oblongis emarginatis, pedunculis terminalibus multifloris, germinibus polyſpermis. *Mexico.* Humb. nov. gen. 6. t. 566.

*floribunda* Kunth. 5. H. foliolis baſi inaequalibus coriaceis oblongis obtuſe acuminatis, paniculis axillaribus, leguminibus ovatis hirſutis 1-2ſpermis. *Guiana.* Humb. nov. gen. 6. t. 567.

Ad *Myroſpermum.*

*pubeſcens* Cand. 4. M. foliis impari-pinnatis ſubtus pubeſcentibus, foliolis ſubcordato-oblongis acutiusculis emarginatis, petiolis ramulisque hirtis. *Amer. auſtr.* (Myroxylon pubeſcens Kunth., peruiferum Lamb.)

## pag. 346.

*Anagyris chinenſis* * (Macrotropis foetida Cand.)
A. *inodora* Lour. (Macrotropis Cand.)

Ad *Sophoram.*

Ad S. *tomentoſam.* (S. havanenſis Jacqu.)
Poſt n. 3. *craſſifolia* Jaum. 8. S. arborea, foliolis inaequilateris oblongis obtuſis coriaceis ſubtus pubeſcentibus, racemo terminali elongato. *Senegambia.*

*macrocarpa* Sm. 9. S. arborea, foliolis elliptico-oblongis obtuſis rigidis ſubtus ſubſericeis, racemis axillaribus abbreviatis. *Chili.* (Maju, Molin. chil. ed. nov. p. 146. quam pro Caſſia ſtipulacea W. habet.)

*glauca* Leſchen. 10. S. fruticoſa, foliolis ellipticis mucronatis ſupra glaucis ſubtus villoſis, racemis terminalibus confertis. *Ind. or.*

*litoralis* Schrad. 11. S. fruticoſa, foliolis ſubrotundo-ellipticis ſupra glabris ſubtus tenuiſſime ſtrigilloſis caneſcentibus, racemis terminalibus. *Braſil.* (S. arenicola Nees.)

S. *obliqua* Perſ. deleatur, reditura ſub *Acaciis.*

pag. 347.

Ad *Podaliriam* Lam.

P. *hirsuta* W. (P. Burchellii Cand.)

*coruscans* Reichenb. 10. P. foliis subsessilibus confertis ovato-lanceolatis acutis utrinque sericeo-villosis, floribus axillaribus subsessilibus. *C. B. S.*

pag. 348.

Ad *Baptisiam* Vent.

*mollis* Nutt. 9. B. foliis petiolatis subrhombeo-lanceolatis caleque decumbente pubescentibus, stipulis linear lanceolatis, racemis spicatis terminalibus, leguminibus apice subulatis. *Carolina.* (Podalir mollis Mx.)

Post n. 8. †*nepalensis* Hook. 10. B. caule fruticoso glabro, foliis petiolatis ternatis, foliolis lanceolatis acuminatis subsericeis, stipulis deciduis, paniculis axillaribus. *Nepal.* Hook. exot. fl. t. 131.

Ad *Virgiliam* Lam.

*sylvatica* Cand. 5. V. foliis impari-pinnatis glabris, foliolis 6-7jugis ovalibus obtusis, paniculis terminalibus. *Afr. austr.* (Sophora sylvatica Burch.)

*lutea* Mx. 6. V. foliis impari-pinnatis glabris, foliolis 5jugis ovatis acuminatis, leguminibus stipitatis glabris. *Amer. bor.*

Ad *Cyclopiam* Vent.

*genistoides* Vent. 1. C. foliolis linearibus obtusis calycibusque muticis, ramis glabris. *C. B. S.* (Sophora genistoides L. Berg. cap. p. 140., Podaliria W., Galega Thunb.)

*galioides* Cand. 2. C. foliolis subulatis sulcatis mucronatis, calycibus acuminatis, ramis hirsutis. *C. B. S.* (Sophora galioides Berg. cap. p. 141., Aspalathus callosa Burm.)

*latifolia* Cand. 3. C. foliolis ovato-ellipticis submucronatis, calycibus acutis. *C. B. S.* (Genista buxifolia Burm.)

Ad *Thermiam* Nutt.

*laburnifolia* * 3. Th. foliis ternatis elliptico-oblongis acutis subsericeis, stipulis grandibus coalitis oppositifoliis caducis, racemis paucifloris, caule fruticoso. *Nepal.* (Thermopsis laburnifolia Don., napaulensis Cand.)

*fabacea* * 4. Th. foliis ternatis stipulisque distinctis late ovatis glabris, racemo terminali, caule herbaceo. *Camtschatca. Ins. Carib.* (Sophora fabacea Pall. astrag. t. 90. f. 2., Thermopsis Cand.)

*alpina* * 5. Th. foliis ternatis sessilibus stipulisque caulinis verticillatis ovatis villosis, spica terminali bracteata. *Imaus.* (Sophora alpina Pall. astrag. t. 90. f. 1., Thermopsis corgonensis Cand.)

pag. 349.

Ad *Edwardsiam* Salisb.

*nitida* Cand. 4. E. fruticosa, foliis pinnatis sericeis, foliolis obovatis obtusis emarginatis. *Ins. Mascaren.* (Sophora nitida Sm., sericea Jaum.)

*denudata* Cand. 5. E. fruticosa, foliis pinnatis supra glabris subtus sericeis, foliolis ellipticis retusis. *Ins. Mascaren.* (Sophora denudata Bory., retusa Pers.)

Ad *Chorizema* Labill.

*Henchmanni* R. Br. 4. Ch. foliis solitariis ternatisque lineari-filiformibus mucronatis pilosiusculis, ramis calycibusque bracteatis viscosis, floribus racemosis. *Nov. Holl.* Bot. reg. 986. (Podolobium aciculare Cand.)

† *platylobioides* Cand. 5. Ch. foliis ovatis acuminatis reticulatis integerrimis supra glabris subtus villosis, floribus axillaribus subsessilibus, germinibus villosissimis. *Nov. Holl.* (Platylobium reticulatum Sieb.)

Ad *Podolobium* R. Br.

*stauropkyllum* Sieb. 2. P. foliis oppositis 3fidis coriaceis glaberrimis, laciniis subaequalibus integerrimis apice spinosis, germine glabro. *Nov. Holl.*

*scandens* Cand. 3. P. foliis oppositis oblongis integerrimis apice setifero-mucronatis reticulatis subtus strigillosis, germine villoso, caule scandente. *Nov. Holl.* (Chorizema scandens Sm., Daviesia umbellata et humifusa Sieb.)

*sericeum* Cand. 4. P. foliis oppositis alternisque ellipticis calycibusque sericeis, racemis axillaribus folia aequantibus, germine setoso. *Nov. Holl.* (Chorizema sericeum Sm.)

Ad *Oxylobium* Andr.

*retusum* R. Br. 4. O. foliis oblongis retusis coriaceis reticulatis glabris, corymbis axillaribus pedunculatis congestis folio brevioribus. *Nov. Holl.* (Chorizema coriaceum Sm. Podolobium ? Cand.) Bot. reg. 913.

*spinosum* Cand. 5. O. foliis ternis late ovatis glabris apice stipulisque spinosis. *Nov. Holl.*

† *Pultenaeae* Cand. 6. O. foliis verticillatis alternisque linearibus obtusiusculis margine revolutis subtus ramisque pubescentibus, umbellis pedicellatis. *Nov. Holl.* (Pultenaea sylvatica Sieb.)

pag. 350.

Ad *Gompholobium* Sm.

G. *minus* Sm. deleatur, rediturum sub *Burtonia*.

Ad G. *grandiflorum* Sm. G. setifolium Sieb. var. foliis angustissimis elongatis setaceis.

*barbigerum* Cand. 7. G. foliolis spathulato-linearibus mucronatis glabris, pedunculis solitariis, carina apice dense

barbata, vexillo amplo calycem fuperanta. *Nov. Holl.* (G. fimbriatum Sieb.)

*virgatum* Sieb. 8. G. foliolis erectis linearibus obtufiusculis apice callofis, ramis teretibus, pedunculis fubracemofis, carina imberbi. *Nov. Holl.*

*tetrathecoides* Sieb. 9. G. foliolis lineari-filiformibus fubmucronatis abbreviatis, ramis teretibus, breviffime villofis, floribus fubterminalibus, carina imberbi. *Nov. Holl.*

*pedunculare* Cand. 10. G. foliolis inferioribus obovatis mucronatis, fuperioribus lineari-lanceolatis acuminatis, ftipulis petiolum aequantibus, pedunculis elongatis bafi apiceque 2bracteatis. *Nov. Holl.*

Ad *Calliftachyn* Vent.

*ovata* Sims. 2. C. foliis ternis obovatis mucronatis. *Nov. Holl.* Bot. mag. t. 1925.

Ad *Pultenaeam* Sm.

Poft n. 8. *parviflora* Sieb. 18. P. foliis fpathulatis recurvo-mucronatis fubeveniis glabris, junioribus ramulisque fubvillofis, ftipulis rufis fcariofis appreffis, capitulis paucifloris. *Nov. Holl.*

*plumofa* Sieb. 19. P. foliis linearibus concavis eveniis, junioribus ramisque villofis, floralibus villofiffimis, ftipulis fufcis fcariofis appreffis, capitulis fubrotundis. *Nov. Holl.*

*thymifolia* Sieb. 20. P. foliis obovatis concavis eveniis glabris, fuperioribus villofis, ftipulis deciduis, capitulis compactis. *Nov. Holl.*

*hypolampra* Sieb. 21. P. foliis oblongis obtufis glabris fubtus nitidis punctatis fub-3nerviis, ftipulis fcariofis ariftatis, capitulis fubfpicatis foliatis, calycibus villofis. *Nov. Holl.*

*capitellata* Sieb. 22. P. foliis fpathulatis fupra nitidis fubtus incano-fericeis, ramis glabris exftipulatis, capitulis compactis villofis. *Nov. Holl.*

*ariftata* Sieb. 23. P. foliis linearibus convolutis enerviis fubtus afperis bafi ciliatis, ftipulis fufcis elongatis fubulatis, calycibus villofiffimis ariftatis. *Nov. Holl.*

*echinata* Sieb. 24. P. foliis confertis tereti-fubulatis mucronatis fulcatis afperis, ftipulis fubulatis, bracteis ramofo-pilofis. *Nov. Holl.*

*phylicoides* Sieb. 25. P. foliis linearibus obtufiusculis margine revolutis fupra afperis fubtus ramulisque incanis, capitulis fubrotundis, calycibus obtufis. *Nov. Holl.*

*paleacea* Sm. 26. P. foliis linearibus fetaceo-mucronatis margine revolutis fericeis apice incurvis, bracteis fcariofis mucronatis calyces fuperantibus. *Nov. Holl.*

*biloba* R. Br. 27. P. foliis bilobo-retufis fupra fcabris fubtus ramisque incano-pubefcentibus, ftipulis fetaceis recurvis, calycibus fericeo-villofis. *Nov. Holl.* (P. deltoidea Sieb.)

**pag. 351.**

Ad P. *dentatam* Labill. deleatur fyn. P. paleacea Sm.

Ad P. *stipularem* Sm. (P. psoraleoides Sieb., non proteoides ut Cand. scribit.)
Ad P. *ferrugineam* Rudg. (P. lanata Sieb.)
Post n. 17. *racemulosa* Sieb. 28. P. foliis obovato-ellipticis obtusis supra scabris subtus glabris, ramulis pubescentibus, racemulis axillaribus foliatis. *Nov. Holl.*
*villifera* Sieb. 29. P. foliis ovato-lanceolatis cuspidato-aristatis subtus nitidis 3nerviis longissime ciliatis, ramulis hirtis, floribus axillaribus, bracteis scariosis cuspidatis. *Nov. Holl.*
*euchila* Cand. 30. P. foliis spathulato-linearibus obtusis glabris subtus glaucis, ramulis exstipulatis angulatis, pedunculis subracemosis, laciniis calycis inaequalibus, aliis latis obtusis, aliis linearibus acutis. *Nov. Holl.* (Dillwynia cuneata Sieb.)
*microphylla* Sieb. 31. P. foliis spathulato-linearibus calloso-mucronatis supra glabris subtus ramulisque incanis, floribus subcapitatis, calycibus pubescentibus. *Nov. Holl.*
*asperata* Sieb. 32. P. foliis linearibus revolutis glabriusculis supra tuberculoso-asperis, ramulis exstipulatis calycibusque glabris, floribus lateralibus subspicatis foliatis. *Nov. Holl.*
*comosa* Sieb. 33. P. foliis linearibus revolutis supra muricato-asperis subtus ramulisque exstipulatis strigillosis, floribus lateralibus subspicatis foliatis. *Nov. Holl.*
*squarrosa* Sieb. 34. P. foliis linearibus apice recurvo-mucronatis revolutis squarrosis scabris, ramulis exstipulatis, floribus foliatis, calycibus spinulosis. *Nov. Holl.*

pag. 352.

Ad *Daviesiam* Sm.

D. *reticulatam* Sm. satius est cum Candolleo Jacksoniis accensere.
*racemulosa* Cand. 13. D. foliis lineari-lanceolatis acuminatis pungentibus, racemis solitariis bracteatis folio brevioribus. *Nov. Holl.*

Ad *Dillwyniam* Sm.

D. *parvifolia* R. Br. — foliis subcarnosis punctatis oblique mucronatis.
Ad D. *ericaefoliam* Sm. D. pinifolia Sieb. var.
*acicularis* Sieb. 6. D. foliis filiformibus mucronatis rigidis erectis glabris, ramulis incanis, racemis terminalibus. *Nov. Holl.*
*rudis* Sieb. 7. D. foliis lineari-filiformibus mucronatis rigidis asperis, ramulis villosis, racemis spicatis foliatis. *Nov. Holl.* D. hispidula et teretifolia Sieb. varr.
*cinerascens* R. Br. 8. D. foliis lineari-filiformibus patentibus mucronato-pungentibus, junioribus ramulisque strigillosis, racemis paucifloris subterminalibus, calycibus sericeis. *Nov. Holland.* (P. juniperina Sieb.)

*tenuifolia* Sieb. 9. D. foliis linearibus gracillimis obtusiusculis rectis, ramulis subpubescentibus, pedunculis solitariis. *Nov. Holl.*

pag. 353.

Ad *Aotum* Sm.

*villosa* Sm. 1. A. foliis linearibus revolutis acutiusculis supra nitidis patentibus, ramulis pubescentibus, calycibus subsolitariis villosis. *Nov. Holl.* (Pultenaea rosmarinacea Sieb.)

*virgata* Cand. 2. A. foliis linearibus obtusis revolutis supra scabris erectis strictis, ramis tomentosis, floribus racemoso-spicatis lateralibus, calycibus sericeis. *Nov. Holl.* (Pultenaea virgata Sieb.)

Ad *Jacksoniam* R. Br.

*reticulata* Cand. 3. J. fruticosa, foliis lanceolatis pungentibus utrinque reticulato-venosis, stipulis geminis, floribus axillaribus solitariis. *Nov. Holl.* (Daviesia Sm.)

*furcellata* Cand. 4. J. fruticosa, ramis teretibus, ramulis furcellatis inermibus compressis striatis, racemis terminalibus, pedicellis apice bracteatis. *Nov. Holland.* (Gompholobium furcellatum Bonpl. plant. Navarr. t. 11.)

*horrida* Cand. 5. J. fruticosa, ramis angulatis, ramulis foliiformibus angulato-compressis spinescentibus, racemis terminalibus, pedicellis medio bracteatis. *Nov. Holl.*

Ad *Burtoniam* R. Br.

*scabra* R. Br. 1. B. foliis petiolatis ternatis lineari-subulatis subaduncis scabris muticis, ramulis teretibus pubescentibus. *Nov. Holl.* (Gompholobium scabrum Sm.)

*minor* Cand. 2. B. foliis sessilibus ternatis linearibus aduncis mucronatis erectis laevibus, ramulis teretibus hirtis. *Nov. Holl.* (Gompholobium minus Sm.) B. sessilifolia Cand. var. foliis longioribus.

*conferta* Cand. 3. B. foliis simplicibus confertissimis lineari-subulatis margine revolutis ramisque glabris. *Nov. Holl.*

Ad *Mirbeliam* Sm.

*speciosa* Sieb. 3. M. foliis linearibus acutiusculis revolutis integerrimis, pedunculis axillaribus aggregatis, calycibus sericeis. *Nov. Holl.*

Post *Mirbeliam*:

## BAPHIA Afzel.

*nitida* Loddig. *Afric. occid.* Arbor foliis pinnatis oblongis nitidis, floribus pedunculatis axillaribus albis.

Ad *Ormosiam* Jackf.

*dasycarpa* Jackf. 1. O. ramis ferrugineis leguminibusque tomentosis, foliolis oblongis acuminatis glabris. *Ind. occid.* (Sophora monosperma Sw., Podaliria Poir.)

*coccinea* Jackf. 2. O. foliolis subovatis coriaceis revolutis utrinque leguminibusque glabris. *Guiana.* (Robinia coccinea Aubl.)

*coarctata* Jackf. 3. O. foliolis inaequalibus supra glabris subtus ferrugineo-hirsutis. *Guiana.*

pag. 354.

Ad *Samydam.*

Post n. 6. *macrocarpa* Cand. 15. S. foliis ovatis acutis serratis subtus subtomentosis, pedunculis axillaribus brevissimis subaggregatis. *Mexico.*

pag. 356.

Ad *Caseariam.*

Post n. 23. *glomerata* Roxb. 24. C. foliis ovali-oblongis acuminatis glabris subserratis, pedunculis fasciculatis abbreviatis 1floris. *Bengal.*

pag. 357.

Ad *Copaiferam.*

* *Foliis abrupte pinnatis,*

† *pellucido-punctatis.*

*Jussievi* Hayn. 1. C. foliolis alternis ovato-lanceolatis acuminatis petiolisque glabris. *Peru.?* Hayn. plant. off. 10. t. 17. b.

*laxa* Hayn. 2. C. foliolis suboppositis ovato-ellipticis obtusis subtus ad costam petiolisque pubescentibus, spicis pedunculatis compositis villosis. *Brasil.* Hayn. plant. off. 10. t. 18.

*Langsdorffii* Desf. 3. C. foliolis 3-5jugis alternis ellipticis obtusis ciliatis splendidis, petiolis pedunculisque pubescentibus, spicis compositis. *Brasil.* Mém. du mus. 7. t. 14. Hayn. plant. off. 10. t. 19.

*oblongifolia* Mart. 4. C. foliolis suboppositis 6-8jugis elliptico-oblongis subemarginatis glabris, petiolis pubescentibus, stipulis lanceolatis, spicis compositis folio brevioribus. *Brasil.* Hayn. plant. off. 10. t. 23. a.

† *trapezifolia* Hayn. 5. C. foliolis alternis 7jugis trapezio-ovatis obtusis glabris, petiolis pubescentibus. *Brasil.* Hayn. plant. off. 10. t. 23. b. c.

*multijuga* Mart. 6. C. foliolis alternis multijugis ovato-oblongis acuminatis nitidis glabris costato-venosis. *Brasil.*

*bijuga* W. herb. 7. C. foliolis oppositis 2jugis oblique ovato-oblongis acutiusculis coriaceis nitidis petiolisque glabris, spicis paniculatis. *Brasil.* Hayn. plant. off. 10. t. 16.

*Jacquini* Desf. 8. C. foliolis alternis 2-5jugis ovato-oblongis acutiusculis nitidis parallele venoſis petiolisque glabris, ſpicis paniculatis. *Inſ. Carib. Nov. Granat.* (Copaiva officinalis Jacqu., Copaifera officinalis W. Cand. Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 659.)

*guianenſis* Desf. 9. C. foliolis oppoſitis 4jugis ſubcordato-oblongis acuminatis parallele venoſis glabris nitidis, ſpicis compoſitis. *Guiana.* Mém. du muſ. 7. t. 13.

†† *Foliis epunctatis.*

*Martii* Hayn. 10. C. foliolis oppoſitis ſub-3jugis ovali-oblongis acutiusculis margine ſubrevolutis petiolisque glabris, ſpicis paniculatis. *Braſil.* Hayn. plant. off. 10. t. 15.

*nitida* Mart. 11. C. foliolis oppoſitis ſub-4jugis ovato-oblongis acutis reticulato-venoſis nitidis petiolisque glabris, ramulis verrucoſis, racemis ſpicatis paniculatis elongatis, floribus remotiusculis. *Braſil.* Hayn. pl. off. 10. t. 17. a.

*coriacea* Mart. 12. C. foliolis oppoſitis ſub-3jugis ovalibus emarginatis coriaceis glabris ſubtus glaucefcentibus, ſpicis paniculatis. *Braſil.* Hayn. pl. off. 10. t. 20.

*cordifolia* Hayn. 13. C. foliolis oppoſitis ſub-5jugis cordato-oblongis obtuſis ſubtus ad coſtam petiolisque pubeſcentibus, pedunculis racemoſis. *Braſil.* Hayn. pl. off. 10. t. 21.

*Selloi* Hayn. 14. C. foliolis ſubalternis 4jugis lanceolatis obtuſiusculis, petiolis ſubtomentoſis, ſpicis paniculatis. *Braſil.* Hayn. pl. off. 10. t. 22.

** *Foliis impari-pinnatis vix pellucido-punctatis.*

*Beyrichii* Hayn. 15. C. foliolis ſub-3jugis oblongo-lanceolatis acuminatis petiolisque glabris, pedunculis racemoſis. *Braſil.* Hayn. pl. off. 10. t. 12.

Poſt *Crudiam* Schreb.:

## GEISSOÏS Labill.

*racemoſa* Labill. *Nov. Caledon.* Arbor foliis quinato-digitatis ſubtus discoloribus, ſtipulis oppoſitis magnis oblongis, floribus racemoſis.

## DETARIUM Juſſ.

*ſenegalenſe* Juſſ. *Senegambia.* Arbor foliis impari-pinnatis ſubtus villoſis, floribus racemoſis.

pag. 369.

Ad *Bucidam.*

*megapotamica* *3. B. racemis ſubcorymboſis, bracteis ſericeis, calycibus lanatis, foliis oblongis lanceolatis obtuſis ſubmucronatis. *Ad fl. magnum Amer. auſtr.*

B. *capitata* Vahl. habet bracteas villoſas calycesque glabros: B. *Buceras* bracteas caducas, calyces ſericeos.

pag. 860.

*Ad Hydrangeam.*

Post n. 1. *anomala* Wallich. 6. H. cymis terminalibus hirsutis, floribus conformibus, foliis ovatis acuminatis sinuato-dentatis nudiusculis, petiolis nervisque pilosis. *Nepal.*

*heteromalla* Wallich. 7. H. cymis radiatis diffuse ramosissimis pilosis, radiis integerrimis, foliis oblongis acuminatis serrulatis subtus tomentosis. *Emodi montes.*

*aspera* Don. 8. H. corymbis paniculatis diffusis radiatis, radiis ovatis mucronatis serratis, foliis lanceolatis acuminatis serrulatis subtus ramulisque dense incano-tomentosis. *Nepal.*

pag. 861.

Ad *Tiarellam.*

*polyphylla* Wallich. 5. T. foliis cordatis 3-5lobis argute serratis utrinque pilosis, caule glanduloso-piloso, racemo laxo, laciniis calycis oblongis mucronatis. *Emodi montes.*

pag. 862.

Ad *Saxifragam.*

Post n. 11. *foliolosa* R. Br. 118. S. foliis radicalibus cuneatis subdentatis, caule diviso folioloso, ramis 1floris, calycibus obovatis, petalorum laminis cordato-lanceolatis. *Ins. Melville.* (S. stellaris *β.* comosa W.)

Post n. 13. *cuscutaeformis* Loddig. 119. S. stolonibus reptantibus, foliis cordato-orbiculatis repandis utrinque hirsutis albo-venosis, scapo subbifloro pubescente, petalis aequalibus lanceolatis. *China.* Bot. mag. 2631.

pag. 863.

Post n. 22. †*hyperborea* R. Br. 120. S. foliis glaberrimis, radicalibus palmatis, petiolis elongatis, caule lanato subbifloro, bracteis oblongo-linearibus sessilibus, petalis 1nerviis. *Ins. Melville.*

†*petiolaris* R. Br. 121. S. foliis radicalibus palmatis subsessilibus glandulosis, florali lobato, scapo foliis subbreviori, petalis 3nerviis. *Amer. arctic.*

pag. 869.

Ad S. *petraeam.* S. cervicornis Viv. var. *Corsica.*

pag. 871.

Ad *Gypsophilam.*

Post n. 2. *dioeca* * 32. G. floribus paniculatis dioecis, foliis sessilibus lanceolatis, calycibus ovatis basi subangulatis glabris, bracteis foliaceis acutis. *Ad fl. Platam.* Sello. (Saponaria dioeca Schlechtend.)

pag. 372.

Post n. 15. *cerastioides* Wallich. 33. G. caule erecto 4gono piloso, foliis obovatis subsessilibus hirsutis, floribus corymbosis, laciniis calycis lanceolatis acutis membranaceo-fimbriatis, petalis emarginatis. *Nepal.*

pag. 373.

Post n. 29. *transsylvanica* * 34. G. caule herbaceo stricto, foliis linearibus carinatis obtusiusculis, floribus fasciculatis, bracteis minutis, calycibus coloratis, staminibus alternis abortientibus. *In alpibus dinariis.* (Banffya petraea Baumg. transsylvan. 1. 385. Syst. veg. 1. 866.)

pag. 377.

Ad *Dianthum.*

Ad D. *diffusum* Sm. D. *graminifolius* Presl. *Sicilia* var.

pag. 381.

Post n. 73. *siculus* Presl. 78. D. caule caespitoso 1floro, squamis calycis subsenis obovatis mucronatis tubo triplo brevioribus, petalis fimbriato-dentatis, foliis linearibus canaliculatis ciliato-scabris. *Sicil.*

*Arrostii* Presl. 79. D. caule caespitoso sub-1floro, squamis calycis quaternis emarginatis mucronatis tubo quater brevioribus, petalis fimbriato-dentatis imberbibus, foliis linearibus canaliculatis glaucescentibus rigidis serrulatis. *Sicil.*

pag. 382.

Ad *Chrysosplenium oppositifolium.* (Chr. nepalense Don.) *Emodi montes.*

pag. 384.

Ad *Malpighiam.*

Post n. 21. *macrophylla* W. suppl. 37. M. foliis amplis ovalibus integerrimis supra sericeo-strigillosis subtus setoso-aculeatis, umbellis lateralibus sessilibus. *Brasil.* Coll. hort. ripul. t. 11.

pag. 391.

Ad *Schinum.*

† *terebinthifolius* Radd. 5. Sch. foliis impari-pinnatis sub-3jugis subaequalibus subserratis, floribus racemosis. *Brasil.*

pag. 392.

Ad *Stellariam.*

Post n. 3. *monogyna* Wallich. 41. St. caule ramosissimo procumbente glabro, geniculis barbatis, foliis petiolatis

subrotundis nervosis glabris, umbellis dichotomis pedunculatis, floribus 5andris 1stylis. *Nepal.*

Post n. 10. *saxatilis* Hamilt. 42. St. caule erecto simpliciusculo foliisque elliptico-oblongis mucronulatis utrinque tomentosis, pedunculis axillaribus trichotomis multifloris, calycibus acuminatis corolla longioribus. *Nepal.*

*Edwardsii* R. Br. 43. St. caule glabro, foliis ovato-lanceolatis integerrimis enerviis nitidis, pedunculis terminalibus sub-1floris, petalis 2partitis lacinias calycis 3nervias superantibus, antheris purpureis. *Amer arctic.*

*marginata* Chamiss. 44. St. caule caespitoso glaberrimo 4gono, foliis connatis ovato-lanceolatis cartilagineo-marginatis apice uncinatis, pedunculis axillaribus solitariis, petalis capsulisque calycem aequantibus *Orae freti Bering.*

*crispa* Chamiss. 45. St. caule diffuso glaberrimo, foliis brevissime petiolatis ovatis acuminatis repando-undulatis 3nerviis, pedunculis axillaribus solitariis, calycibus 5nerviis petala superantibus. *Ins. Aleut.*

pag. 393.

*St. tetragono* Blum. in *Java* a St. uliginosa *Sm.* vix differt.

Post n. 20. *patens* Wallich. 46. St. caule decumbente foliisque sessilibus lineari-lanceolatis acutis utrinque villosis, pedunculis axillaribus 3fidis paucifloris, calycibus acutis glabris corollam aequantibus. *Nepal.*

*monosperma* Hamilt. 47. St. caule elato foliisque sessilibus late lanceolatis acuminatis glabris, panicula terminali trichotoma multiflora, calycibus obtusis corollis brevioribus, capsula 1sperma. *Nepal.*

*nitida* Hook. 48. St. caule erecto 4gono superne glaberrimo, foliis lanceolatis nitidis siccitate 3nerviis, pedunculis subpaniculatis, calyce obtuso petalis breviori. *Grönland.*

*laeta* Richards. 49. St. caule decumbente foliisque lineari-lanceolatis carinatis laevibus glaucis, pedunculis subgeminis terminalibus, calyce villosiusculo petalis aequante. *Amer. arctic.*

*gracilis* Richards. 50. St. caule gracili 4quetro foliisque lanceolatis enerviis glaberrimis, ramis sterilibus gemma foliorum terminatis, flore solitario subterminali, calyce 3nervio petalis subbreviori. *Ad sinum Hudson.*

pag. 394.

Post n. 35. *ligustrina* * 51. St. caule suffruticoso erecto ramoso, foliis lanceolatis acutis revolutis sub-3plinerviis glabris, floribus paniculatis, petalis calyce brevioribus, capsula 3valvi. *Ins. Sandwich.* (Schiedea ligustrina Chamiss.)

pag. 396.

Ad *Arenariam.*

Poſt n. 17. *Redowskii* Chamiſſ. 117. A. caule procumbente caespitoſo, foliis ovatis utrinque attenuatis mucronatis glabris baſi ciliatis, pedunculis terminalibus calycibusque corolla brevioribus pubeſcentibus. *Sibir.?*

*nepalenſis* * 118. A. caule diffuſo angulato, foliis petiolatis oblongis mucronatis ciliato-ſerrulatis, floribus corymboſo-paniculatis, pedunculis glanduloſis bracteatis, calycibus amplis coloratis obtuſis, petalis minutis, capſula 1ſperma. *Nepal.* (Brachyſtemma calycinum *Nepal.*)

pag. 397.

Poſt n. 29. *Salzmanni* Presl. 119. A. caule ramoſiſſimo flaccido villoſo, foliis oblongo-lanceolatis acutis hiſpidis ciliatis, panicula dichotoma, calycibus 3nerviis margine ſcarioſis corolla brevioribus capſula ſubgloboſa longioribus. *Sicil.*

Ad A. *procumbentem* Vahl. A. roſea Presl.

pag. 398.

Poſt n. 45. *abietina* Presl. 120. A. caule caeſpitoſo aſcendente paucifloro ſubvilloſo, foliis lineari-lanceolatis ariſtatis rigidis glabris baſi ciliatis, petalis obovatis emarginatis calycem acuminatum ſuperantibus. *Sicil.*

*elegans* Chamiſſ. 121. A. caule caeſpitoſo ramoſo foliisque linearibus obtuſis craſſiuſculis glaberrimis, pedunculis ſolitariis, calycibus ſubulatis, capſula 3valvi. *Aſia arctica ad fretum Bering.*

pag. 399.

Ad A. *polygonoidem* Wulf. varietas e ſolo ſterili pertinet ad *Gouffeia arenarioides*, quam Robillard et Caſtagne in agro maſſilienſi invenerunt, ſtylo tertio abortiente. Semina duo vel tria, quae quaterna in A. polygonoide. Cand. fl. gall. 6. 609. Semina ſubſolitaria in Stellaria monoſperma Hamilt., Arenaria bavarica L. et nepalenſe *.

Poſt n. 59. *quadrivalvis* R. Br. 122. A. caule caeſpitoſo, foliis lineari-ſubulatis 3nerviis glabris, pedunculis unifloris elongatis pubeſcentibus, calycibus acutiſſimis 3nerviis petala ſuperantibus, capſula 4valvi. *Inſ. Melville.*

Ad A. *grandifloram* L. del. ſyn. A. abietina Presl.

pag. 400.

Poſt n. 72. *Gerviana* Chamiſſ. 123. A. caule dichotomo foliisque lineari-filiformibus mucronatis ſucculentis glabris, floribus dichotome paniculatis glomeratis, capſulis 3valvibus calycem ſuperantibus. *Chili.*

pag. 401.

Ad A. *cucubaloidem* Sm. A. *nardifolia* Ledeb. ex Imao var.

pag. 402.

Ad A. *bavaricam* L. (A. Ponae Reichenb. ic. t. 188.)

pag. 403.

Poſt n. 109. *ſubulifolia* Presl. 124. A. caule caeſpitoſo ſimplici, foliis ſubulatis obtuſiuſculis glaberrimis, panicula dichotoma, calycibus acutiſſimis glanduloſo-pubeſcentibus petala duplo ſuperantibus, capſula 8valvi calycem aequante. *Sicilia.* (A. arvatica Presl.)

*laricina* Schlechtend. 125. A. caule decumbente, foliis faſciculatis ſubulatis rigidis ciliatis, floribus paucis terminalibus, petalis calycem ſuperantibus, ſeminibus diſciformibus ciliatis. *Sibir.* (Spergula laricina L. Syſt. veg. 2. 422.)

*Roſſii* R. Br. 126. A. caule ramoſiſſimo, foliis 8quetro-ſubulatis obtuſiuſculis, pedunculis 1floris elongatis, petalis oblongis ſepala ſub-8nervia ſuperantibus. *Amer. arctic.*

pag. 405.

Ad *Silenem.*

Poſt n. 18. *pauciflora* Cand. 146. S. caule erecto gracili baſi foliato ſuperne ſubviſcoſo, foliis ſubſpathulato-lanceolatis acutis baſi longe attenuatis glabriuſculis, pedunculis elongatis, calycibus clavatis glaberrimis, petalis longe unguiculatis reticulatis, genitalibus exſertis. *Corſica. Sardinia.* Moris.

pag. 408.

Ad S. *nicaeenſem* All. S. arenicola Presl. var.

Ad S. *cernuam* Thunb. S. pilofellaefolia Schlechtend.

Ad S. *luſitanicam.* S. ſardoa Moris.

pag. 409.

Ad S. *ceraſtoidem.* S. matutina Presl.

pag. 410.

Poſt n. 77. *undulatifolia* Moris. 147. S. caule erecto glabro, foliis ſpathulato-oblongis obtuſis undulatis glabris, floribus ſubfaſciculatis, calycibus glaberrimis coloratis, petalis 2lobis. *Sardinia.*

pag. 411.

Poſt n. 97. *calycina* Presl. 148. S. caule ſimplici erecto ſcabro apice viſcoſo; foliis lineari-lanceolatis acutis ſerrulato-ciliatis, floribus paniculatis bracteatis,

calycibus longissime clavatis pedicellisque visco-so-pubescentibus, petalis 2fidis coloratis. *Sicil.*

pag. 412.

Ad S. *italicam* Cand. S. sicula Presl. var.

pag. 415.

Ad S. *inflatam* Sm. S. crassifolia Thor., Thorei Dufour.

pag. 416.

Ad *Cherleriam.*

Ch. *octandra* Sieb., imbricata Ser., potius *Arenaria aretioides* Portenschl. Gay.

*dicranoides* Chamiss. 4. Ch. humilis dense caespitosa, foliis arcte imbricatis spathulato-oblongis glaberrimis carinatis, pedunculis solitariis brevissimis. *Ora asiatica freti Bering.*

*juniperina* Don. 5. Ch. dense caespitosa, foliis imbricatis lanceolatis mucronatis subtus carinatis laevibus, pedunculis axillaribus solitariis brevissimis, petalis calyce duplo longioribus. *Nepal.*

*grandiflora* Don. 6. Ch. dense caespitosa, foliis confertis tetrastichis lanceolatis mucronatis rigidis patulis basi ciliatis, pedunculis terminalibus 1floris, petalis obovatis (roseis) calycem superantibus. *Nepal.*

pag. 417.

Ad *Cerastium.*

Post n. 18. *furcatum* Chamiss. 54. C. caule simpliciusculo adscendente superne glanduloso, foliis late lanceolatis acutis hirtis, floribus dichotome paniculatis, calyce obtuso petalis breviori capsulam excedente. *Sibir.?*

Ad C. *arvense.* C. grandiflorum Don., oblongifolium Torr. var.

pag. 418.

Post n. 23. *Beringianum* Chamiss. 55. C. caule caespitoso adscendente hirsuto superne viscoso, ramis elongatis paniculatis, foliis oblongis acutiusculis, floribus nutantibus, petalis capsulisque cylindricis calycem acutum superantibus. *Ora Amer. arctic. ad fretum Bering.*

pag. 421.

Ad *Lychnidem dioecam.* L. divaricata Reichenb. ic. t. 303. var. glabra.

pag. 422.

*Spergula laricina* L. deleatur, Arenariis supra, Willdenovio et Schlechtendalio suadentibus, adnumerata.

Ad *Bergiam.*

*repens* Blum. 4. B. caule ramoso repente, foliis lanceolatis serrulatis, floribus glomeratis axillaribus. *Java.*

pag. 423.

Ad *Oxalida*

Agmen ducant

*Subaphyllae.*

*fruticosa* Radd. 140. O. caule suffruticoso ramoso, petiolis foliaceis lanceolatis nervosis glabris, pedunculis lateralibus abbreviatis subracemosis, stylis stamina superantibus. *Brasil.* (O. rusciformis Mikan. Zuccarin. in act. acad. monach. 9. t. 2.)

*bupleurifolia* Hilar. 141. O. caule suffruticoso simpliciusculo, petiolis foliaceis subaphyllis nervosis, pedunculis complanatis elongatis 2fidis, staminibus stylos superantibus. *Brasil.* (O. daphnaeformis Mik.)

† *saliciformis* Mik. 142. O. caule ramosissimo, ramis virgatis, petiolis foliaceis sparsis, pedunculis elongatis 2fidis racemosis, stylis brevissimis. *Brasil.*

Post n. 6. *ovata* Zuccar. 143. O. caule suffruticoso simpliciusculo foliisque ovatis acutiusculis glabris, nervo medio subtus basi incrassato, pedunculis multifloris, staminibus stylos superantibus. *Brasil.*

*alata* Mart. 144. O. caule suffruticoso, foliis ovatis acutis pubescentibus, pedunculis elongatis alatis multifloris, stylis stamina superantibus. *Brasil.*

pag. 424.

Ad O. *punctatam* L. (O. Piottae Coll.)

Post n. 23. *megapotamica* * 145. O. foliolis obcordatis dense pilosis, calycibus obtusiusculis, staminibus interioribus stylos superantibus. *Rio grande.* Sello.

*hispidula* Zuccar. 146. O. foliolis obcordatis ciliatis subtus glaucescentibus, calycibus acutis 2glandulosis, stylis stamina longiora superantibus. *Monte Video.*

*eriorrhiza* Zuccar. 147. O. bulbo lanato, foliolis obcordato-bilobis glabris, petiolis hirtis, staminibus stylos superantibus. *Monte Video.*

† *lobata* Sims. 148. O. radice tuberosa, foliolis obcordato-bilobis glabris subtus glaucescentibus; calycibus acutis. *Chili.* Bot. mag. 2386.

*nana* Hilar. 149. O. foliolis obovatis glabris, stylis stamina superantibus. *Rio grande.*

pag. 426.

Post n. 53. *lasiopetala* Zuccar. 150. O. radice tuberosa, foliolis obcordato-bilobis supra glabriusculis subtus pubescentibus, scapo sub-3floro, petalis extus margine pilosis, stylis stamina superantibus. *Monte Video.*

*rubra* Hilar. 151. O. foliolis obcordatis punctatis glabriusculis, scapo umbellifero, stylis stamina superantibus. *Brasil.*

*rupestris* Hilar. 152. O. foliolis obcordatis pilosis, scapo umbellifero, calycibus maculatis, staminibus stylos superantibus. *Brasil.*

*urbica* Hilar. 153. O. foliolis obcordatis pilosis, umbellis compositis, calycibus maculatis, stylis intermediis. *Brasil.* (O. violacea Savign., Martiana Zuccar.)

*triangularis* Hilar. 154. O. foliolis truncato-triangularibus sericeo-villosis, scapo umbellifero, staminibus stylos superantibus. *Brasil.*

*palustris* Hilar. 155. O. foliolis truncato-triangularibus glabriusculis, scapo umbellifero, stylis stamina aequantibus. *Brasil.* (O. papilionacea W. herb.)

*bipartita* Hilar. 156. O. foliolis linearibus bipartitis glabriusculis, scapo umbellifero, stylis intermediis. *Brasil.*

pag. 427.

Post n. 80. *macromischos* * 157. O. caule basi nudo stipulato, foliis fastigiato-verticillatis cauleque incano-villosis, foliolis linearibus subemarginatis, pedunculis longissimis demum refractis, stylis brevissimis. *C. B. S.*

pag. 428.

Post n. 88. *confertissima* Hilar. 158. O. caule suffruticoso, foliis parvis confertissimis, foliolis obovatis pilosis, stylis stamina superantibus. *Brasil.*

*caespitosa* Hilar. 159. O. caule suffruticoso brevissimo, foliolis obcordatis ciliatis, pedunculis folia superantibus, stylis longissimis. *Brasil.*

*Sternbergii* Zuccar. 160. O. caule erectiusculo abbreviato foliolisque obcordato-bilobis hirtis, pedunculis petiolos superantibus. *Peru.* Hänke.

*Commersonii* Pers. 161. O. caule brevissimo piloso, foliolis obovatis tomentosis, pedunculis folia subsuperantibus, calycibus obtusis. *Monte Video.* (O. sexenata Savign., hallucinatione folia sena indicantur.)

*paludosa* Hilar. 162. O. caule prostrato glaberrimo, foliolis obcordatis, petiolis basi stipulaceis dilatatis, pedunculis folia superantibus, stylis intermediis. *Brasil.*

*myriophylla* Hilar. 163. O. caule prostrato ramoso, foliis numerosis fasciculatis, foliolis profunde obcordatis villosis, stylis stamina superantibus. *Brasil.*

*amara* Hilar. 164. O. caule prostrato hirsuto, foliolis obcordatis villosis, pedunculis folia, staminibus stylos superantibus. *Brasil.*

Post n. 90. *serpens* Hilar. 165. O. caule repente, foliolis obcordatis subvillosis, pedunculis folia, staminibus stylos superantibus. *Brasil.*

pag. 429.

Post n. 106. *refracta* Hilar. 166. O. caule diffuso piloso, foliolis obcordatis ciliatis, pedunculis folia superantibus

2-3fidis umbelliferis, pedicellis fructiferis refractis, ftylis ftamina fuperantibus. *Brafil.*

*Hänkeana* * 167. O. caule erecto foliolisque obovatis emarginatis glabris, pedunculis 2fidis multifloris folia fuperantibus, floribus laxe racemofis, ftaminibus ftylos fuperantibus. *Peru.* (O. melilotoides Zuccar.)

*hifpida* Mart. 168. O. caule breviffimo foliolisque obovatis emarginatis hifpidis, pedunculis folia aequantibus fub-3floris, ftaminibus ftylos fuperantibus. *Brafil.*

*fquamata* Zuccar. 169. O. caule humili fquamofo, foliolis obcordato-bilobis glabris, pedunculis axillaribus dichotomis multifloris. *Chili.* Hänke.

*craffocaulis* Zuccar. 170. O. caule afcendente carnofo, foliolis obcordatis fubtus pubefcentibus, ftipulis lanceolatis acutis ciliatis, pedunculis elongatis umbelliferis paucifloris, ftaminibus ftylos fubaequantibus. *Peru.* Hänke.

pag. 430.

Ad O. *albicantem* Kunth. O. cinerea Zuccar. var.

Ad O. *Barrelieri* L. (O. campeftris Mart.)

Ad O. *rhombifoliam* Jacqu. del. O. hedyfarifolia Radd.

Ad O. *pentantham* Jacqu. del. Neaei Cand., apponatur O. divaricata Mart. var.

Ad O. *Plumerii* Jacqu. O. umbraticola Hilar.

O. *fruticofa* Radd. deleatur, fupra melius collocata.

Poft n. 122. *rhombeo-ovata* Hilar. 171. O. caule fuffruticofo, foliolis rhombeo-ovatis acuminatis ciliatis, medio majori, petiolis nudis, pedunculis 2fidis multifloris, ftaminibus ftylos fuperantibus. *Brafil.* (O. Neaei Cand., hedyfarifolia Radd.)

*cytifoides* Mart. 172. O. ramis tomentofis, foliolis ovatis utrinque attenuatis incano-villofis, pedunculis folia fuperantibus multifloris, ftylis ftamina fuperantibus. *Brafil.*

*denfifolia* Mart. 173. O. caule virgato denfiffime foliofo foliolisque obcordato-bilobis hirtis, pedunculis elongatis fub-8floris, ftylis ftamina fuperantibus. *Brafil.*

*rofellata* Hilar. 174. O. caule breviffimo fuffruticofo, foliolis pubefcentibus, lateralibus fubrotundis, intermedio oblongo elongato, pedunculis 2fidis paucifloris, ftylis ftamina fuperantibus. *Brafil.* (O. puberula Mart.)

*infipida* Hilar. 175. O. caule fimplici fuffruticofo, foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis fubtus pubefcentibus, pedunculis 2fidis. *Brafil.*

*linearis* Zuccar. 176. O. caule fimplici fuffruticofo, foliolis linearibus acutiusculis hirfutis, pedunculis terminalibus folitariis elongatis multifloris, ftylis ftamina fuperantibus. *Brafil.* Sello.

*cajanifolia* Hilar. 177. O. caule fuffruticofo pubefcente, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis, pedunculis 2fidis racemofis, ftaminibus ftylos fuperantibus. *Brafil.* (O. polymorpha Mart.)

*sepium* Hilar. 178. O. baule fuffruticofo glabro, foliis verticillatis, foliolis ovatis obtufiufculis, pedunculis bifidis racemofis, ftaminibus ftylos fuperantibus. *Brafil.*

*melilotoides* Hilar. 179. O. caule fuffruticofo pilofiufculo, foliolis ovatis obtufis, pedunculis bifidis racemofis, ftaminibus ftylos fuperantibus. *Brafil.*

*euphorbioides* Hilar. 180. O. caule fuffruticofo pubefcente vifcofo, foliolis obtufis glabris, inferioribus ovatis, reliquis linearibus, pedunculis 2fidis 7floris, ftaminibus intermediis. *Brafil.*

*nigrefcens* Hilar. 181. O. caule fuffruticofo pilofiufculo, foliolis ovato-oblongis glaberrimis. pedunculis 2fidis racemofis, ftaminibus intermediis. *Brafil.*

*faxatilis* Hilar. 182. O. caule fruticofo ramofiffimo, foliolis parvis fubrotundis, pedunculis breviter 2fidis, ftaminibus ftylos fuperantibus. *Brafil.* (O. leptophylla Zuccar.)

*diftans* Hilar. 183. O. caule fuffruticofo ferrugineo, foliolis obovatis retufis villofis, pedunculis umbelliferis. *Brafil.* (O. hirfutiffima Mart.)

*fulva* Hilar. 184. O. caule fuffruticofo hirfutiffimo, foliolis fubrotundis villofis, pedunculis 2fido-umbelliferis, ftaminibus ftylos fuperantibus. *Brafil.*

*cordata* Hilar. 185. O. caule fuffruticofo, foliis cordatis margine pubefcentibus, pedunculis 2fido-umbelliferis. *Brafil.*

*campeftris* Hilar. 186. O. caule fuffruticofo, foliolis obcordatis hirfutis, pedunculis 2fido-umbelliferis, ftaminibus ftylos fuperantibus. *Brafil.*

pag. 431.

O. *Commerfonii* del. fupra jam melius collocata.

pag. 432.

Poft n. 188. 189. *mimofoides* Hilar. 187. O. caule fruticofo fimplici, foliis abrupte pinnatis multijugis pubefcentibus, foliolis lineari-oblongis obtufis, pedunculis villofis bracteatis 3-4floris, ftaminibus ftylos fuperantibus. *Brafil.* Hilar. fl. brafil. t. 21.

*cafta* Mart. 188. O. caule fruticofo umbellatim ramofo, foliis abrupte pinnatis multijugis glabriufculis, foliolis adnatis fubrhombeis, fafciculis florum fubfeffilibus bracteatis, ftaminibus ftylos fuperantibus. *Brafil.* Zuccar. in act. acad. monach. 9. t. 6.

*dormiens* Mart. 189. O. caule fuffruticofo fimplici, foliis abrupte pinnatis multijugis pubefcentibus, foliolis fubfeffilibus bafi angulatis oblongis obtufis, pedunculis aggregatis 1floris e glomerulo bractearum prodeuntibus. *Brafil.* Zuccar. in act. acad. monach. 9. t. 5.

*fomnians* Mart. 190. O. caule fuffruticofo fimplici, foliis abrupte pinnatis fub-6jugis pubefcentibus, foliolis extimis majoribus obovato-oblongis obtufis, infimis

ſubcordatis acutis, capitulis florum longe pedunculatis bracteatis, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Braſil.* Zuccar. in act. acad. monach. 9. t. 4.

pag. 433.

Ad *Sedum.*

Poſt n. 8. *himalenſe* Don. 67. S. caule herbaceo erecto, foliis ovato-lanceolatis dentatis laevibus glaucis, corymbo ſubſimplici, radice craſſa. *Emodi montes.*

Poſt n. 15. *aſiaticum* * 68. S. caulibus caeſpitoſis filiformibus e caudice craſſiſſimo ortis, foliis ſparſis lineari-lanceolatis obtuſis integerrimis glaucis, umbellis paucifloris, calycibus obtuſis, floribus 8andris 4fidis. *Emodi montes.* (Rhodiola aſiatica Don.)

pag. 434.

Poſt n. 19. *Anacampſeros* 69. S. caule decumbente, foliis obovatis integerrimis glaucis ſubſeſſilibus, ramorum ſterilium roſaceo-congeſtis, corymbis pedunculatis terminalibus. *Gallia auſtr.*

pag. 437.

Ad *Cotyledonem.*

Poſt n. 2. *coruſcans* Haw. 26. C. foliis cuneiformibus mucronatis ſubinvolutis micantibus, floribus paniculatis pendulis. *C. B. S.* Bot. mag. 2201.

Poſt n. 9. *decuſſata* Lindl. 27. C. caule fruticoſo, foliis decuſſatis ſubteretibus fuſco-mucronatis glaucis, panicula longe pedunculata, floribus pendulis. *C. B. S.* Bot. reg. 915. (C. papillaris Haw. non Thunb.)

pag. 439.

Ad *Robergiam* Schreb.

*glabra* * 2. R. foliis pinnatis glabris, foliolis ſubcordatis acuminatis coriaceis, paniculis axillaribus folio brevioribus. *Ad Orinocum.* (Rourea glabra Kunth.)

## POUPARTIA Commerſ.

*borbonica* J. F. Gmel. *Inſ. Maſcaren.* Arbor foliis pinnatis, racemis compoſitis, floribus atropurpureis.

# CLASSIS XI.

## pag. 447.

Ad *Bassiam.*

*butyracea* Roxb. 3. B. foliis obovatis infra tomentosis coriaceis, pedunculis glomeratis floris calycibusque lanatis. *Nepal.*

## pag. 448.

Ad *Garciniam* manifesto pertinet *Stalagmites cambogioides* Murr., quae eadem sit ac *Garcinia Cambogia* Desr. sive secus, ambigo.

## pag. 449.

Ad *Elaeocarpum.*

E. *serratus* — axillis venarum subtus glandulosis.
E. *reticulatus* Sm. (Eriostemum dentatum Coll. hort. ripul. t. 30.)
Post n. 5. *lanceolatus* Blum. 11. E. foliis lanceolatis obtusiusculis remote serratis, racemis axillaribus folio longioribus nutantibus, fructibus ovalibus, nucleo rugoso aculeato. *Java.*

*obtusus* Blum. 12. E. foliis obovato-oblongis obtusiusculis basi mucronato-serratis, racemis axillaribus petalisque sericeis. *Java.*

*macrophyllus* Blum. 13. E. foliis ovato-oblongis obtusis repando-serratis, stipulis semiorbiculatis foliaceis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Java.*

*glaber* Blum. 14. E. foliis ovato-oblongis obtusis mucronato-serratis, racemis axillaribus folia superantibus. *Java.*

*resinosus* Blum. 15. E. foliis ovali-oblongis acuminatis obsolete serratis, axillis venarum glandulosis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Java.*

*angustifolius* Blum. 16. E. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis basi serrulatis, racemis axillaribus folio brevioribus, fructibus globosis, nucleo rugoso subsulcato. *Java.*

*floribundus* Blum. 17. E. foliis oblongis acuminatis obtuse serratis coriaceis glaberrimis, racemis axillaribus nutantibus folia aequantibus. *Java.*

*longifolius* Blum. 18. E. foliis oblongis acuminatis mucronulato-repandis, racemis folio brevioribus sericeo-tomentosis. *Java.*

*stipularis* Blum. 19. E. foliis oblongis acuminatis serrulatis, venis subtus pubescentibus, stipulis ovatis inciso-serrulatis, racemis axillaribus villoso-tomentosis, fructibus ovalibus. *Java.*

*tomentosus* Blum. 20. E. foliis ovato-oblongis acuminatis setaceo-denticulatis subtus ramulisque villoso-tomentosis, racemis axillaribus elongatis. *Java.*

pag. 450.

Ad *Triumfettam.*

Post n. 6. *spicata* Blum. 23. Tr. foliis cordato-subrotundis 3lobis inaequaliter serrulatis supra pubescentibus subtus villosis, floribus interrupte spicatis. *Java.*

*suffruticosa* Blum. 24. Tr. foliis cordato-ovatis acuminatis inaequaliter serratis subtus stellato-pilosiusculis, junioribus semi-3fidis, pedunculis extraxillaribus aggregatis 3-5floris. *Java.*

pag. 451.

Ad Tr. *trilocularem* Roxb. Tr. pseudo-angulata Blum. var.

Post n. 8. *villosiuscula* Blum. 25. Tr. foliis subrotundo-ovatis 3lobis 5nerviis argute duplicato-serratis, serraturis infimis callosis, supra villosiusculis subtus stellato-tomentosis, pedunculis extraxillaribus aggregatis 3floris. *Java.*

Ad Tr. *annuam* L. (Tr. graveolens Blum.)

† *oblonga* Wallich. 26. Tr. foliis ovato-lanceolatis inaequaliter serratis subtus lanatis. *Nepal.*

Ad Tr. *obliquam* Roth. (Tr. cana Blum.) add. pedunculis extraxillaribus aggregatis 3floris. Patria: *Java.*

pag. 454.

Ad *Lythrum.*

Post n. 6. *quintuplinervium* Mart. 16. L. fruticosum, foliis sessilibus oppositis ovatis 5plinerviis glabris, floribus oppositis sessilibus. *Brasil.*

*tribracteatum* Salzm. 17. L. foliis alternis spathulatis glaberrimis, floribus axillaribus subaggregatis 6andris, bracteis ternis subrotundis, caule ramoso, ramis decumbentibus. *Ager monspel.*

pag. 456.

Ad *Cupheam.*

Post n. 16. *parviflora* Hook. 24. C. suffruticosa glanduloso-pubescens, foliis lanceolatis basi attenuatis subrepandis ciliatis, floribus racemosis terminalibus. *Guiana.*

*Melvilla* Lindl. 25. C. foliis oppositis oblongis utrinque attenuatis scabris, floribus terminalibus racemosis cernuis, petalis 0. *Ins. Carib.* Bot. reg. 852.

Post n. 20. *megapotamica* * 26. C. caule herbaceo simplici glabro, foliis oppositis lineari-lanceolatis integerrimis, corymbis terminalibus paucifloris, calycibus glabris. *Rio grande.* Sello.

pag. 461.

Ad *Agrimoniam.*

A. *repentis* patria est *Armenia.* Tournef.

*nepalensis* Don. 5. A. foliis interrupte pinnatis villosissimis, foliolis ovatis serratis, impari petiolato, racemis rectis

tenuifloris, bracteis 8fidis calyce brevioribus, laciniis calycis lanceolatis-acutis carinatis. *Nepal.*
Ad *Callicomam ferratifoliam* R. Br. (Hermesia bankfiaefolia Syſt. 2. 246.)

pag. 462.

Ad *Pleurandram* Labill.

Poſt n. 6. *ſtricta* Sieb. 19. Pl. foliis linearibus apice callofis ſtriatis ſcabris, calycibus feſſilibus acutis pubeſcentibus. *Nov. Holl.*

*ciſtiflora* Sieb. 20. Pl. foliis lineari-filiformibus acutis ſulcatis punctato-aſperis, calycibus terminalibus ſeſſilibus glaberrimis margine membranaceis. *Nov. Holl.*

pag. 463.

Poſt n. 18. *aſtrotricha* Sieb. 21. Pl. foliis ſpathulato-linearibus calloſo-aſperis hirſutiuſculis, ramulis ſtellato-pulverulentis, pedunculis ebracteatis nutantibus, calycibus acutis. *Nov. Holl.*

*camforoſma* Sieb. 22. Pl. foliis faſciculatis filiformibus piloſis, ramis albido-hirſutis, calycibus ſolitariis ſeſſilibus glabris mucronatis. *Nov. Holl.*

*microphylla* Sieb. 23. Pl. foliis confertis teretiuſculis obtuſis 4ſulcatis incano-pubeſcentibus, pedunculis ſolitariis abbreviatis, calycibus obtuſiuſculis. *Nov. Holl.*

pag. 466.

Ad *Blackwelliam.*

† *nepalenſis* Cand. 8. Bl. foliis oblongis acuminatis ſerrato-dentatis utrinque glabris, racemis axillaribus paniculatis folio ſubbrevioribus, floribus 6-7andris. *Nepal.*

pag. 467.

Ad *Bruneliam* R. et P.

*propinqua* Kunth. 7. B. foliis impari pinnatis 3-4jugis ſubtus fuſco-tomentoſis, foliolis oblongis obtuſiuſculis crenulato-ſerratis, paniculis ferrugineis. *Amer. auſtr.*

pag. 468.

Ad *Sempervivum.*

Poſt n. 9. *calyciforme* Haw. 27. S. foliis denſe imbricatis ſpathulatis obtuſis glaucis apice recurvis margine albidis glabris, corymbo terminali glanduloſo-pubeſcente. *Madera.* Bot. reg. 892.

# CLASSIS XII.

pag. 471.

Post n. 1819. *Neillia* Don. Cal. campanulatus 5fidus. Petala subrotunda. Antherae 2loculares. Caps. 2locularis polysperma. *Spiraeeis affinis.*

*Pygeum* Gärtn. Cal. 6dentatus. Pet. 6. Drupa sicca oblonga 1sperma.

pag. 473.

Ante n. 1849. *Brayera* Kunth. Cal. persistens turbinatus, limbo duplici, utroque 5lobo. Pet. 5 squamaeformia. Stigmata subpeltata lobata. Fructus 2 1spermi.

Post n. 1860. *Cowania* Don. Cal. 5fidus. Pet. 5. Styli 5-11 plumosi. Achenia totidem stylis coronata.

---

pag. 477.

Ad *Prunum*.

Post n. 19. *cerasoides* Don. 43. Pr. foliis elliptico-oblongis acuminatis duplicato-serratis subtus pilosis, stipulis pectinatis glanduliferis, petiolis 5glandulosis, umbellis subsessilibus paucifloris. *Nepal.*

Post n. 23. *mollis* Torr. 44. Pr. foliis ovatis acuminatis duplicato-serratis ramulisque pubescentibus, stipulis setaceis denticulatis, calycibus glabriusculis serratis, fructibus ovalibus grandibus. *Massachusetts Amer. bor.*

Post n. 29. *undulata* Hamilt. 45. Pr. foliis elliptico-oblongis acuminatis coriaceis glabris integerrimis margine crispato-undulatis, petiolis eglandulosis, racemis solitariis multifloris glabris folio brevioribus. *Nepal.*

pag. 479.

Post *Banaram* Aubl.:

## NEILLIA Don.

*thyrsiflora* Don. 1. N. foliis cordato-ovatis 3lobisque acuminatis duplicato-serratis, stipulis foliaceis ovatis acuminatis serratis, racemis spicatis thyrsoideis terminalibus, bracteolis dentatis, calycibus sericeis. *Nepal.*

*rubiflora* Don. 2. N. foliis cordatis 3lobis acuminatis duplicato-serratis, stipulis integerrimis membranaceis caducis, racemis terminalibus solitariis paucifloris, bracteolis obtusiusculis integerrimis, calycibus tomentosis. *Nepal.*

## PYGEUM Gärtn.

*acuminatum* Colebr. *Silhet*, *prov. Ind. or.* Arbor, foliis alternis oblongis acuminatis integerrimis glabris, racemis axillaribus, floribus flavicantibus. Linn. transact. 12. t. 18.

### pag. 480.

Ad *Myrtum*.

Poſt n. 24. *veſtita* * 142. M. foliis lanceolatis acutis venoſis ſubtus ramulisque lanato-tomentoſis, pedunculis breviſſimis ſuboppoſitis, floribus 4fidis. *Rio grande.*

### pag. 481.

Poſt n. 41. *megapotamica* * 143. M. foliis ſpathulato-lanceolatis obſcure venoſis ſubtus flavido-ſericeis, pedunculis aggregatis folio brevioribus, floribus 4fidis. *Rio grande.* Sello.

Ad M. *cayennenſem* * (M. micrantha Mart. *Braſil.*)

### pag. 482.

Poſt n. 45. *Caledoniae* * 144. M. foliis ovatis glabris, pedunculis terminalibus ternis breviſſimis, floribus 4fidis. *Nov. Caledon.* (Caryophyllus ellipticus Labill. t. 63.)

### pag. 483.

Poſt n. 71. *ſpiciflora* * 145. M. foliis oblongo-lanceolatis cuſpidatis venuloſis ciliatis, ramis hirtis, pedunculis pubeſcentibus multifloris. *Braſil.* (Eugenia ſpiciflora Mart.)

### pag. 485.

Poſt n. 101. *umbraticola* Kunth. 146. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis revolutis coriaceis nitidis pubeſcentibus, racemis axillaribus 2partitis. *Ad Orinocum.*

† *longifolia* Kunth. 147. M. foliis amplis ſubcordato-oblongis cuſpidatis coriaceis glaberrimis lucidis, floribus 5fidis, fructibus pyriformibus. *Ad Orinocum.*

### pag. 486.

Poſt n. 115. † *xylopioides* Kunth. 148. M. foliis lanceolatis acuminatis membranaceis reticulatis ſubtus ſtrigilloſis, paniculis axillaribus folio brevioribus, floribus 5fidis, fructibus ovalibus 1ſpermis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 7. t. 657.

### pag. 487.

Ad M. *Berterianam* * (Eugenia auſtralis Coll. in act. taurin. 31. t. 8.)

pag. 488.

Ad *Psidium.*

Ps. *pyriferum* habet ramulos 4angulares, pedunculos 1-3floros. Congruit Ps. *sapidissimum* Jacqu. Quo igitur deleto, accedunt nova:

*Araça* Radd. 16. Ps. ramulis teretibus hirsutis, foliis oblongis obtusis utrinque pubescentibus, pedunculis axillaribus 1-3floris, fructibus subpyriformibus. *Brasil.* Opusc. scient. di Bologn. 4. t. 7. f. 1.

*litorale* Radd. 17. Ps. ramis teretibus, foliis oblongis obtusiusculis basi attenuatis coriaceis glabris, pedunculis 1floris, fructibus pyriformibus. *Brasil.* Opusc. scient. di Bologn. 4. t. 7. f. 2.

pag. 490.

Ad *Metrosideron* Gärtn.

M. *coriaceus* Labill. (M. albidus Sieb.)

pag. 491.

Post n. 14. *juniperinus* Reichenb. 23. M. foliis filiformi-subulatis mucronatis rigidis glabris tuberculosis, pedunculis lanatis, spicis capitatis. *Nov. Holl.* Sieber.

*pungens* Reichenb. 24. M. foliis linearibus mucronatis patulis nervosis glabris, pedunculis lanatis, spicis capitatis. *Nov. Holl.* Sieber.

Post n. 21. *operculatus* Labill. 25. M. foliis lineari-lanceolatis subtus discoloribus punctatis, floribus corymbosis, petalis operculi forma ante anthesin convolutis. *Nov. Caledon.*

pag. 492.

Ad *Leptospermum* Forst.

Post n. 10. *squarrosum* Sieb. 20. L. foliis lanceolatis acutis squarrosis rigidis glabris, junioribus subtus sericeis, calycibus sessilibus glabris coloratis obtusis. *Nov. Holl.*

L. *flexuosum* Link. (L. resiniferum Bertol.)

Post n. 19. *eriocalyx* Sieb. 21. L. foliis parvis spathulatis glaberrimis punctatis, calycibus subsessilibus sericeo-lanatis. *Nov. Holl.*

*pendulum* Sieb. 22. L. foliis linearibus acutiusculis subsericeis, pedunculis brevissimis aggregatis calycibusque dense sericeo-lanatis. *Nov. Holl.*

pag. 499.

*Calyptranthes paniculata* R. et P. Ad hanc referenda C. *aromatica* Hilar. pl. us. brasil. t. 14.

pag. 500.

Ad *Eucalyptum* Herit.

Post n. 5. *curvula* Sieb. 25. E. operculo conico, pedunculis sub-3floris incrassatis compressis divaricatis, foliis inaequaliter oblongo - lanceolatis acutis. *Nov. Holl.*

pag. 501.

Post n. 10. *pauciflora* Sieb. 26. E. operculo conico, pedunculis abbreviatis sub-6floris, foliis oblongo-lanceolatis falcatis nervoso-venosis elongatis. *Nov. Holl.*

Post n. 11. *virgata* Sieb. 27. E. operculo conico, pedunculis 3floris incrassatis compressis rugosis erectiusculis, foliis lanceolatis acuminatis coriaceis subvenosis glabris. *Nov. Holl.*

Post n. 14. *stricta* Sieb. 28. E. operculo submutico, pedunculis lateralibus 2floris, foliis linearibus acutis coriaceis glabris subpunctatis. *Nov. Holl.*

*longifolia* Lindl. 29. E. operculo submutico, pedunculis 3-6floris, foliis lineari-lanceolatis elongatis venosis acuminatis pendulis. *Nov. Holl.* Bot. reg. 947.

Post n. 22. *eugenioides* Sieb. 30. E. operculo mucronulato, umbellis lateralibus racemosis, ramulis teretibus, foliis inaequaliter oblongo-lanceolatis. *Nov. Holl.*

pag. 502.

Post *Waldsteiniam* Kit.:

## BRAYERA Kunth.

*anthelminthica* Kunth. *Abyssinia.* Arbor, cujus folia ignota, pedunculis ramosis pilosis bracteatis, floribus quaternis.

Ad *Spiraeam.*

Sp. *acutifolia* W. (Sp. flexuosa Fisch.) e *Sibiria.*

*vaccinifolia* Don. 32. Sp. foliis elliptico-oblongis acutis glabris apice serratis subtus glaucis, ramulis hirsutis, cymis terminalibus paucifloris tomentosis. *Nepal.*

*bella* Sims. 33. Sp. foliis ovatis acutis glabris serratis subtus glaucis, cymis terminalibus patentibus ramulisque pubescentibus. *Nepal.*

*canescens* Don. 34. Sp. foliis ovalibus obtusis integerrimis villosis, corymbis confertis ramulisque tomentosis. *Nepal.*

*cana* Kit. 35. Sp. foliis ovatis acutis integerrimis subtus incano-villosis, corymbis terminalibus pedunculatis. *Croatia.*

pag. 505.

Ad *Aizoon.*

*Camforosma* Reichenb. 11. A. ramis virgatis foliisque alternis lineari-subulatis glabris, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.*

pag. 506.

Ad *Mespilum.*

Post n. 21. *crenulata* Don. 41. M. foliis ovali-oblongis crenulatis apice retusis mucronulatis glabris nitidis, pedunculis lateralibus aggregatis elongatis 1-plurifloris. *Nepal.* (Crataegus crenulata Lindl.)

pag. 508.

*Photinia dubia* Lindl. (Mespilus tinctoria Don.)
Ph. *integrifolia* Lindl. (Pyrus integerrima Don.)

pag. 509.

Ad *Pyrum japonicam* Thunb. De genere fictitio *Chaenomeles* leg παλινῳδίαν auctoris ipsius in Bot. reg. ad n. 905.

*Pashia* Hamilt. 39. P. foliis longe petiolatis ovatis acuminatis serratis glabris, corymbis simplicibus umbellatis pilosis, laciniis calycis ovatis cuspidatis, fructibus sphaericis asperis. *Nepal.*

*Nussia* Hamilt. 40. P. foliis ellipticis mucronatis crenulatis coriaceis glabris, junioribus subtus ramulisque et corymbis terminalibus paniculatis niveo-lanatis, fructibus sphaericis. *Emodi montes.*

pag. 510.

Post n. 18. †*Sumboshia* * 41. P. foliis cordato-ovalibus mucronulatis subtus ramulisque lanatis, stipulis ellipticis acutis glanduloso-serratis, pedunculis terminalibus solitariis tomentosis, laciniis calycis oblongis, fructibus basi attenuatis. *Nepal.* (Cydonia Sumboshia Hamilt. Don.)

Ad P. *arbutifoliam* Ehrh. P. *floribunda* Lindl. Bot. reg. 1006. hybrida.

Post n. 24. *crenata* Don. 42. P. foliis longe petiolatis ovalibus acutis crenatis supra glabris subtus ramulisque niveo-tomentosis, corymbis simplicibus lanatis, laciniis calycis ovatis acutis. *Nepal.*

*lanata* Don. 43. P. foliis ovato-oblongis acuminatis duplicato serratis subtus ramulisque niveo-lanatis, corymbis terminalibus compositis, laciniis calycis ovatis acuminatis. *Nepal.*

pag. 518.

Ad *Mesembrianthemum.*

Post n. 112. *crassulinum* * 248. M. ramis decumbentibus, foliis semiteretibus acutiusculis viridibus lucidis basi distinctis, calycibus inaequalibus, filamentis exterioribus abortientibus elongatis. *Afric. austr.* (M. crassuloides Salm.)

pag. 526.

*Tetragonia expansa* Murr. (non Ait.)

Post *Dalibardam*:

## COWANIA Don.

*mexicana* Don. *Mexico.* Frutex ramosissimus lanatus, foliis confertis 3partito-pinnatifidis revolutis subtus niveo-lanatis, stipulis membranaceis dilatatis, floribus terminalibus sessilibus aureis. Linn. transact. 14. t. 22. f. 1.

### pag. 527.

Ad *Rubum.*

R. *pinnatus* Don. fl. nepal. p. 234. ad R. *lasiocarpum* Sm. pertinere videtur.

R. *asper* Don. ad R. *biflorum* Buchan.

*micranthus* Don. 72. R. foliis sub-3jugis supra viridibus nitidis subtus albo-villosis, foliolis ovatis mucronatis duplicato-serratis, petiolis sparse aculeatis, corymbo paniculato, petalis unguiculatis calyce brevioribus. *Nepal.* (R. pauciflorus Wallich. Bot. reg. 854.)

### pag. 528.

Post n. 13. *microphyllus* Don. 73. R. foliis ternatis quinatisque subtus niveo-tomentosis, foliolis obovatis serratis, pedunculis 3floris petiolisque aculeatis, calycibus dense tomentosis, caule decumbente, aculeis recurvis. *Nepal.*

R. *Wiegmanni* Weih. satius ad R. *plicatum* Ej. referendus.

### pag. 530.

Ad R. *occidentalem* addatur patria: *Amer. bor.*

Post n. 41. *pedunculosus* Don. 74. R. *foliis ternatis subtus niveo*-tomentosis, foliolis ovatis basi attenuatis inaequaliter serratis, petiolis aculeatis, stipulis linearibus, pedunculis elongatis subgeminis, caule inermi laevi. *Nepal.*

*flavus* Hamilt. 75. R. foliis ternatis subtus tomentosis, foliolis ovalibus serratis, ramulis setoso-aculeatis, stipulis lineari-setaceis, floribus glomeratis racemoso-corymbosis. *Nepal.*

### pag. 531.

R. *paniculatus* Sm. (R. cordifolius Don.)

*betulinus* Don. 76. R. foliis ovatis cuspidatis glabriusculis inaequaliter serratis, stipulis minutis glandulaeformibus, floribus subracemosis, pedicellis geminis quaternisve calycibusque nudis, ramis teretibus glabris petiolisque parce aculeatis. *Nepal.*

### pag. 532.

Post n. 68. *calycinus* Wallich. 77. R. caule reptante petiolisque villosis aculeatis, foliis cordato-orbiculatis cre-

natis utrinque villosis, stipulis late ovatis serratis, pedunculis axillaribus 1floris, calycis aculeati laciniis foliaceis inciso-dentatis petala superantibus. *Nepal.*

pag. 533.

Ad *Potentillam.*

Post n. 1. *nepalensis* Don. 96. P. caule fruticoso erecto, foliis sub-2jugis ovalibus obtusis integerrimis supra villosis subtus nudis, stipulis obtusis membranaceis, *calyce 15fido.* *Nepal.*

pag. 534.

P. *lineata* Trevir. (P. splendens Don., Siemersiana Lehm.)

*leuconota* Don. 97. P. caule erecto simplici villoso, foliis pinnatis 7jugis subtus argenteo-sericeis, foliolis ovali-oblongis obtusis inciso-serratis, pedunculis subumbellatis, laciniis calycis corolla brevioribus aequalibus. *Nepal.*

*peduncularis* Don. 98. P. foliis radicalibus pinnatis supra villosis subtus argenteo-sericeis, foliolis oblongis inciso-serratis, scapo erecto paucifloro, petalis calyce longioribus. *Nepal.*

*micropetala* Don. 99. P. caule ascendente ramoso villoso-tomentoso, foliis subtus niveo-tomentosis, radicalibus pinnatis caulinis ternatis, foliolis obovatis serratis, pedunculis axillaribus 1floris, petalis calyce duplo brevioribus. *Nepal.* (Comarum flavum Roxb.)

*confertiflora* Torr. 100. P. caule erecto viscoso-piloso, foliis subinterrupte pinnatis, foliolis oblique subrotundis inciso-dentatis, stipulis ovatis acutis integris, floribus fasciculatis, disco 5lobo staminifero. *Amer. bor.* (Geum agrimonioides Pursh.? Syst. 2. p. 543.)

*nivalis* Torr. 101. P. caule erecto sub-1floro, foliis pinnatis glabris ciliatis, foliolis subimbricatis ovatis 2-3fidis, laciniis acutis, petalis subrotundis calyce longioribus. *Montes scopulosi Amer. bor.*

*pulchella* R. Br. 102. P. caule paucifloro, foliis pinnatis 2jugis supra villosis subtus sericeis, foliolis pinnatifidis, inferioribus minoribus, laciniis lineari-lanceolatis, stylis basi glanduloso-dilatatis. *Ins. Melville.*

pag. 535.

Post n. 18. *microphylla* Don. 103. P. caulibus caespitosis humilibus 1floris foliisque 2pinnatifidis subtus sericeo-villosis, laciniis linearibus obtusis, petalis obovatis calyce longioribus, receptaculo villoso. *Nepal.*

*coriandrifolia* Don. 104. P. caulibus caespitosis ascendentibus paucifloris, foliis 2pinnatis subtus pilosiusculis, laciniis linearibus submucronatis, petalis obcordatis calyce longioribus, receptaculo villoso. *Nepal.*

pag. 536.

Post n. 29. *Loddigesii* * 105. P. caule erecto incano piloso, foliis 7-5natis supra hirsutis subtus incano-pilosis, foliolis pinnatifido-serratis, floribus corymbosis, petalis retusis calycem superantibus. *Sibir.* (P. vinosa Loddig. Ledeb.)

*normalis* Bess. 106. P. caule erecto foliisque 5nato-digitatis utrinque dense lanatis, foliolis pinnatifidis subtus candidis, stipulis oblongis incisis, pedunculis corymbosis, petalis calycem subsuperantibus. *Ad Tyram.*

P. *virgata* Lehm. (P. elongata Bess.) *Podolia.*

pag. 537.

Post n. 44. *pulchella* Richards. 107. P. caule diffuso abbreviato, foliis 7-5natis subtus niveo-tomentosis, foliolis obovatis apice inaequaliter serratis, pedunculis subternis, petalis obcordatis, receptaculo hirsuto. *Amer. arctic.*

pag. 539.

Post n. 68. *formosa* Don. 108. P. caule erecto foliisque 5-3natis sericeo-pilosis, foliolis spathulato-oblongis serratis venosis, stipulis ovatis integris, petalis obcordatis calycem multo superantibus. *Nepal.* (P. nepalensis Hook. exot. fl. t. 88.)

pag. 542.

Post n. 94. *atrosanguinea* Don. 109. P. caule ascendente paucifloro, foliis omnibus ternatis subtus niveo-tomentosis, foliolis obovatis inciso-serratis, stipulis subintegris, petalis obcordatis calycem superantibus. *Nepal.*

pag. 543.

Ad *Sieversiam* W.

*paradoxa* Don. 7. S. fruticosa, foliis fasciculatis 3-5partitis subtus ferrugineo-lepidotis, floribus corymbosis, aristis plumosis. *Mexico.* Linn. transact. 14. t. 22. f. 2.

*Rossii* R. Br. 8. S. acaulis glabra, foliis radicalibus interrupte pinnatis, foliolis 3lobis, scapo 1floro sub-2phyllo, aristis nudis. *Insf. Melville.*

pag. 547.

Ad *Rosam.*

*Woodsii* Lindl. — aculeis ramorum sparsis rectis, stipulis oblongis subintegerrimis.

pag. 548.

Ad R. *cinnamomeam* reducenda R. *turbinella* Sw. n. 83.

R. *laxa* Retz. — ramis pruinosis, aculeis caulinis sparsis duplicibus subreflexis.

pag. 549.

R. *livescentis* Bess. forte var.: R. *guttensteinensis* Jacqu. f. 110. R. germinibus oblongis utrinque constrictis pedunculisque geminis glabris, calycibus glandulosis petala longe superantibus, aculeis stipularibus patentissimis, foliis oblongis serratis livido-glaucis subtus versicoloribus petiolisque laevibus. *Volhynia.*

*pallens* Retz. 111. R. germinibus hemisphaericis pedunculisque glabris, laciniis calycis subaequalibus, foliolis ovalibus glaberrimis, aculeis ramorum duplicibus horizontalibus. *Suecia.*

*hemisphaerica* * 112. R. germinibus hemisphaericis brevissimis glabris, pedunculis aculeato-hispidis, aculeis ramorum duplicibus horizontalibus, foliolis minutis subrotundis petiolisque glaberrimis. *Patria?* In horto halensi colitur.

*mosquensis* * 113. R. germinibus globosis pedunculisque glabris, aculeis stipularibus rectiusculis, foliolis oblongis serratis petiolisque inermibus pubescentibus. *Ager mosquensis.*

*gorinkensis* Fisch. 114. R. germinibus subglobosis pedunculisque glaberrimis, ramis nitidis subinermibus, petiolis foliisque subtus pubescentibus. *Ager mosquensis.*

R. *ochroleuca* Sw., quam R. *spinosissimae* varietatem habui, differt omnino aculeis ramorum rectis, petiolis subinermibus.

pag. 551.

*dimorpha* Bess. 115. R. germinibus ovatis utrinque contractis pedunculisque confertis abbreviatis sparsim glanduloso-hispidis, calycibus confertim glandulosis, aculeis ramorum sparsis subrecurvis, petiolis aculeatis foliisque utrinque pubescentibus. *Podolia.* Ergo minimae est R. tomentosae var.

pag. 552.

R. *Czackiana* Bess. germina habet oblonga (non ovata) foliola subtus pubescentia duplicato-serrata margine (non subtus) glandulosa.

*floribunda* Bess. 116. R. germinibus elliptico-oblongis pedunculisque aggregatis glanduloso-pilosis, aculeis ramorum sparsis validis recurvis, petiolis aculeatis villosis, foliis lineato-rugulosis duplicato-serratis subtus margineque glandulosis pubescentibus. *Ad Borysthenem.*

pag. 554.

R. *turbinella* Sw. ad R. *cinnamomeam* n. 21,
R. *venosa* Sw. ad R. *caninam* n. 77. releganda.

# CLASSIS XIII.

pag. 557.

Post n. 1883. *Empedoclea* Hilar. Cal. polyphyllus imbricatus. Antherae 2loculares. Stigma capitatum. Germen 6spermum. Bacca? *Dillenieae.*

pag. 558.

Post n. 1893. *Entelea* R. Br. Cal. 4-5sepalus. Petala 4. Stam. omnia perfecta. Caps. echinata 5locularis, loculis polyspermis. *Tiliaceae.*

*Echinocarpus* Blum. Cal. 4partitus deciduus. Pet. 4, 5 incisa. Antherae cuspidatae. Stigma simplex. Caps. echinata lignosa 4valvis, intus pulpa farinacea farcta. *Bixeae.*

*Hasseltia* Kunth. Cal. 4partitus. Pet. 4. Antherae 2loculares. Glandulae 8 perigynae. Fructus subglobosus 1-2locularis, loculis 1-2spermis. *Bixeae.*

Post n. 1894. *Corynandra* Schrad. Cal. 4sepalus. Cor. 4petala. Filamenta clavata apice colorata. Antherae curvatae. Siliqua sessilis 2valvis polysperma. *Capparideae.*

Post n. 1900. *Porpa* Blum. Cal. 5partitus. Pet. 5, intus basi tomentosa. Stam. annulo membranaceo cincta. Stigma 3dentatum. Caps. 3locularis, loculis 1spermis.

1905. *Alegria* Sess. cum Lühea W. Mart. jungenda.

pag. 559.

Post n. 1911. inferendae:
*Luxemburgia* Hilar. n. 1465. p. 173.
et *Godoya* R. et P. n. 1612. p. 278.
*Cochlospermum* Kunth. *Bombaceis* potius accensendum.

Post n. 1923. *Caraipa* Aubl. Cal. 5partitus. Pet. 5. Antherae 2loculares apice glanduliferae. Stylus simplex, stigmate 3lobo. Caps. 3locularis, placenta centrali columnari 3alata. Semina solitaria compressa. *Ternströmieae.*

pag. 560.

Post n. 1936. *Micranthera* Chois. Flores dioeci. Cal. 4sepalus. Pet. 10. Antherae 2loculares. Stigma peltatum. Bacca 5locularis. *Guttiferae.*

pag. 561.

Post n. 1955. *Kuhlia* Kunth. Cal. campanulatus 6-8fidus clausus persistens, laciniis interioribus majoribus. Cor. 0. Antherae 2loculares. Stigma obtusum. Fructus 1locularis polyspermus. *Bixeae.*

Ad *Davillam* Vand. adde Pet. 1-6 caduca.

pag. 562.

Poſt n. 1977. *Trichoſpermum* Blum. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Antherae didymae. Stylus 0. Stigm. 2. Capſ. 2valvis hirſuta, placenta lineari. Sem. arillata ciliata.

Ad *Sauraviam* W. adde: Stam. baſi ſubcoalita. Styli 3, 5. Capſ. baccata intus mucilaginoſa. Placenta in quovis loculo 2fida.

pag. 564.

Ad *Wormiam* Rottb. adde: Sem. pulpa pellucida obvoluta.

Poſt n. 2015. *Geeria* Blum. Flores dioeci. Cal. 5ſepalus 2bracteatus. Cor. 5partita. Stam. baſi corollae adnata. Styli 3, 5 coaliti, ſtigmatibus acutis. Bacca 5locularis polyſperma. *Ternſtrömieae.*

pag. 565.

Poſt n. 2020. *Rollinia* Hilar. Cal. 3partitus. Cor. 1petala 6loba dorſo 3alata. Bacca compoſita. *Anoneae.*

Ad *Micheliam* add. Cal. bractea ſpathacea lateraliter dehiſcente cinctus.

*Sarcocarpon* Blum. Flores monoeci. Cal. 3bracteatus 3ſepalus. Petala 9-12, ordine ternario diſpoſita. Filamenta breviſſima. Antherae apice extrorſum adnatae. Fructus baccati 2ſpermi conglomerati.

Ad *Dilleniam*. Petala perſiſtentia. Stam. aequalia.

*Capellia* Blum. Cal. 5ſepalus. Pet. 5 decidua. Stam. exteriora breviora; interiora multo longiora 1ſerialia. Capſ. membranaceae intus dehiſcentes polyſpermae. *Dillenieae.*

*Aromadendron* Blum. Cal. 1phyllus ſpathaceus. Petala numeroſiſſima. Stamina ſubulata. Antherae extrorſum dehiſcentes. Capſ. 2ſpermae in fructum ligneum coaleſcentes. *Magnolieae.*

Poſt n. 2042. *Hydraſtis.* Cal. corollinus 3ſepalus. Nectaria 0. Caryopſes baccatae 1ſpermae coalitae. *Ranunculeae.*

---

pag. 567.

Ad *Swartziam* W.

Poſt n. 3. *parviflora* Cand. 10. Sw. foliis ſimplicibus breviſſime petiolatis ovatis acuminatis emarginatis, pedunculis ſub-3floris, petalo ſubrotundo ſimbriato calycem aequante. *Cayenn.*

*ochnacea* Cand. 11. Sw. foliis ſimplicibus ovato-ellipticis acutiuſculis, pedunculis 1floris. *Amer. auſtr.?*

Poſt n. 4. *aptera* Cand. 12. Sw. foliis ternatis ovato-ellipticis acuminatis emarginatis, petiolis teretibus, pedunculis 2-5floris. *Guiana.*

*myrtifolia* Sm. 13. Sw. foliis ternatis pinnatisque bijugis, foliolis oblongo-lanceolatis, petiolis marginatis, petalo

orbiculato calycem aequante, staminibus numerosissimis polyadelphis. *Caracas.*

Ad Sw. *pinnatam* W. adde: foliolis oblongis acuminatis, pedunculo subvilloso, racemis geminis, petalo orbiculato calycem excedente, staminibus plurimis. (S. brachystachya Cand.)

pag. 568.

Post n. 9. *tomentosa* Cand. 14. Sw. foliis pinnatis oblongis acutis subtus ramisque villosis, stipulis suborbiculatis, racemis multifloris, petalo orbiculato. *Guiana.* (Robinia Panacoco Aubl. Flores fructusque aliunde petitos esse, Cand. testatur. Ergo et Robinia tomentosa W. Syst. 8. 247. huc trahenda.)

*polyphylla* Cand. 15. Sw. foliis pinnatis multijugis glabris, petiolis teretibus, *racemis subternis gracilibus spicaeformibus*, petalo subrotundo. *Cayenn.*

Post *Doliocarpum:*

## Empedoclea Hilar.

*alnifolia* Hilar. *Brasil.* Frutex ramis ferrugineis, *foliis ellipticis* serratis venosis scaberrimis, floribus paniculatis albis.

pag. 569.

Ad *Papaver obtusifolium* Desf. adde patriam: *Sardiniam.*

pag. 570.

Ad *Stylophorum* Nutt.

*simplicifolium* * 4. St. capsulis oblongis *setosis*, foliis petiolatis oblongis obtusis integerrimis scapoque 1floro setoso-hirtis, flore cernuo. *Emodi montes.* (Papaver Don.)

*nepalense* * 5. St. capsula sphaerica *setis* plumosis dense tecta, foliis oblongis sessilibus indivisis hispidis, caule ramoso, floribus paniculatis. *Nepal.* (Meconopsis nepaulensis Cand., Papaver paniculatum Don.)

pag. 571.

Ad *Glaucium* Tourn.

*tricolor* Bernh. 7. Gl. foliis lyrato-pinnatifidis pilosiusculis, siliqua hirsuta, petalis contiguis, basi macula halonata. *Thuringia. Podolia.*

Ad *Calophyllum.*

*parvifolium* Chois. 8. C. foliis cordato-ovatis obtusiusculis brevissime petiolatis laevibus striato-venosis, ramis tortuosis, paniculis laxis paucifloris. *Ins. Moluc.* Act. soc. nat. paris. 1. 229.

*Cupanianus* Presl. 28. C. caule erecto, foliis petiolatis subcordato-ovatis margine fimbriatis rugosis subtomentosis, petiolis dilatatis sulcatis, pedunculis sub-3floris superne bracteatis, calycibus villosis. *Sicil.*

pag. 592.

Ad *Helianthemum* Tourn.

Ad H. *bicolor* et *arcuatum* Presl., illud ab H. *croceo* Pers., hoc ab H. *vulgari* Gärtn. discernere nequeo.

pag. 594.

Post *Weiheam* *:

## LUXEMBURGIA Hilar.

*speciosa* Hilar. 1. L. foliis spathulato-lanceolatis mucronatis serrato-ciliatis venosis, stipulis laciniato-ciliatis, floribus racemosis. *Brasil.* (Plectanthera floribunda Mart.) L. octandra Hilar. var.

*corymbosa* Hilar. 2. L. foliis longe petiolatis lanceolatis mucronatis serrato-ciliatis, stipulis pectinatis, corymbis paucifloris. *Brasil.* (Plectanthera ciliosa Mart., Luxemburgia polyandra Hilar.)

## GODOYA R. et P.

*gemmiflora* Mart. G. foliis oblongis obtusis obsolete serrulatis, racemis compositis elongatis, calycibus gemmaceis 10sepalis. *Brasil.* Mart. nov. gen. t. 74.

G. *obovata* et *spathulata* R. et P. quas p. 330. cum manca auctorum phrasi citavi, nec a se invicem nec a Martiana optime stabilita satis differre videntur.

pag. 596.

Ad *Cleyeram ochnaceam* Cand. (Ternströmia Lushia Don.)

Ad *Cochlospermum* Kunth.

C. *vitifolium* mutetur in *serratifolium* Cand. (Bombax hibiscifolium W. herb., Wittelsbachia insignis Mart. nov. gen. t. 55.)

*vitifolium* * 3. C. foliis 5fidis crenato-serratis utrinque glabris. *Nov. Hispan.* (Bombax vitifolium W. enum., Wittelsbachia Mart.)

pag. 597.

Ad *Delimam tripetalam* Blum. D. intermedia Blum. var.

pag. 598.

Ad *Bonnetiam* Schreb.

B. *meridionalis* Sw. 2. melius sic definitur: B. foliis alternis longe petiolatis stipulatis oblongis coriaceis remote costato-venosis, floribus racemosis, femininibus pendulis.

*venulosa* Mart. 3. B. foliis alternis breviter petiolatis oblongis obtusiusculis subtus venulosis, floribus racemosis, femininibus erectis. *Brasil.*

*anceps* Mart. 4. B. foliis alternis subsessilibus spathulatis obtusis venosis, pedunculis axillaribus ancipitibus bracteatis 3floris. *Brasil.* (B. stricta Mart., Kieseria stricta Nees.)

*corymbosa* * 5. B. foliis obovatis obtusis coriaceis glaberrimis glaucescentibus parallele venosis, paniculae corymbosae ramis dichotomis, calycibus glabris. *Brasil.* (Kielmeyera corymbosa Mart. nov. gen. t. 72.)

*coriacea* * 6. B. foliis oblongis obtusis basi attenuatis coriaceis glaberrimis parallele venosis, corymbo paucifloro terminali, calycibus extus pubescentibus. *Brasil.* (Kielmeyera coriacea Mart. nov. gen. t. 70.)

*variabilis* * 7. B. foliis obovato-oblongis obtusis coriaceis, pedunculis elongatis subcorymbosis, calycibus obtusis glabris. *Brasil.* (Kielmeyera variabilis Mart. nov. gen. t. 71.)

*petiolaris* * 8. B. foliis longe petiolatis oblongis obtusis, racemis paucifloris, calycibus orbicularibus glabris, stigmatibus ternis. *Brasil.* (Kielmeyera petiolaris Mart. nov. gen. t. 69.)

*rosea* * 9. B. foliis subsessilibus oblongis obtusis, floribus terminalibus subternis, calycibus rotundatis extus pubescentibus. *Brasil.* (Kielmeyera rosea Mart. nov. gen. t. 68.)

## Caraipa Aubl.

*parvifolia* Aubl. 1. C. foliis alternis ovatis acutis subtus incano-tomentosis, floribus racemosis. *Guiana.*

*grandifolia* Mart. 2. C. foliis alternis oblongo-lanceolatis longissimis cuspidatis supra nitidis subtus glaucescentibus, floribus racemosis. *Brasil.*

*densifolia* Mart. 3. C. foliis alternis ovato-oblongis utrinque glabris subtus glaucescentibus, floribus racemosis. *Brasil.* (C. glabrata Mart. var.)

*paniculata* Mart. 4. C. foliis oppositis petiolatis oblongis subtus ramisque ferrugineo-tomentosis, panicula terminali, petalis extus dimidiato-tomentosis. *Brasil.* Mart. nov. gen. t. 64.

### pag. 599.

Ad *Ascium* Schreb.

*anomalum* * 4. A. floribus subspicatis 8andris, cucullis pedicellatis hemisphaerico-galeatis, foliis oblongis obtusis mucronatis basi attenuatis subcoriaceis. *Amer. tropic.* (Norantea anomala Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 647. b.)

pag. 601.

Ad *Loasam palmatam* * (Treviran. in nov. act. nat. cur. 13. t. 12 Blumenbachia insignis Schrad.)

pag. 602.

Post *Heptacam* Lour.:

MICRANTHERA Chois.

*clusioides* Chois. *Guiana.* Arbor foliis oblongis acutis glaberrimis, floribus paniculatis bracteatis luteis. (Clusia longifolia Rich.)

Ad *Lecythin.*

Post n. 8. *Couratari* * 12. L. foliis petiolatis oblongis glabris coriaceis, floribus racemoso-spicatis, seminibus alatis. *Guiana.* (Couratari guianensis Aubl.)

pag. 606.

Ad *Maeruam* Forsk.

*angolensis* Cand. 3. M. floribus racemosis, corona lacero-multipartita, foliis ovalibus. *Afric. occid.*

*rigida* R. Br. 4. M. corymbis terminalibus paucifloris, corona lacero-multipartita, foliis obovatis rigidis. *Afr. med.* Denham. et Clapperton. it. p. 226.

pag. 607.

Post *Ryaniam* Vahl.:

KUHLIA Kunth.

*glauca* Kunth. 1. K. foliis basi dimidiata oblongis acutiusculis remote serratis subtus glaucis, floribus fasciculato-paniculatis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 7. t. 652.

*ulmifolia* Kunth. 2. K. foliis basi dimidiata oblongo-lanceolatis acuminatis grosse serratis utrinque concoloribus, floribus paniculatis. *Alpes Popayan.* Humb. nov. gen. 7. t. 653.

Ad *Flacourtiam* Commers.

Post n. 5. *flexuosa* Kunth. 8. Fl. ramulis flexuosis spinosis, foliis ovato-oblongis remote serratis membranaceis glabris nitidulis, floribus ♂ axillaribus aggregatis. *Mexico.*

*celastrina* Kunth. 9. Fl. spinis ramorum longis rectis, foliis obovato-subrotundis membranaceis crenatis glabris nitidulis, pedunculis axillaribus subgeminis, fructibus subgloboso-ellipticis. *Mexico.*

*prunifolia* Kunth. 0. Fl. trunco spinis horrido, ramis inermibus, foliis obovato-ellipticis obtusis coriaceis glabris nitidis glanduloso-crenatis, racemis axillaribus abbreviatis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gener. 7. t. 654.

Post n. 7. †*cordata* Kunth. 11. Fl. inermis, foliis cordatis acutis crenatis coriaceis glabris nitidis, floribus ♂ aggregatis, ♀ solitariis. *Peru.*

## pag. 608.

## DAVILLA Vand.

*rugosa* Poir. 1. D. scandens, foliis oblongis obtusis obsolete serratis hirsutis, floribus subpaniculatis digitatis. *Brasil.* (D. brasiliana Cand.) Lessert. ic. t. 71.

*angustifolia* Hilar. 2. D. scandens, foliis glabris oblongo-linearibus acutis integerrimis, costa venisque subtus pilosiusculis, floribus racemosis 5petalis digynis. *Brasil.*

*macrophylla* Hilar. 3. D. scandens, foliis oblongis acuminatis repandis subtus pubescentibus, floribus racemosis 5petalis. *Brasil.*

*brasiliana* Kunth. 4. D. arborescens, foliis oblongis obtusis parallele venosis coriaceis scabris, floribus fasciculato-paniculatis. *Nov. Granat. Brasil.*

*castaneaefolia* Hilar. 5. D. foliis oblongis acuminatis remote serratis parallele venosis aspero-pilosis, floribus racemosis digynis. *Brasil.*

*elliptica* Hilar. 6. D. foliis ellipticis obtusis integerrimis coriaceis subtus pubescentibus reticulatis, racemis compositis villosis, floribus digynis. *Brasil.* Hilar. pl. us. brasil. t. 23.

*flexuosa* Hilar. 7. D. foliis oblongis obtusis coriaceis glaberrimis integerrimis, pedunculis subracemosis, capsulis subternis. *Brasil.*

## pag. 610.

Ad *Curatellam.*

*Cambaiba* Hilar. 2. C. foliis ovato-oblongis obtusissimis repando-dentatis subtus tomentosis, floribus paniculatis. *Brasil.* Hilar. pl. us. brasil. t. 24.

Ad *Baueram* Andr.

*galioides* Sieb. 2. B. foliis ternis elliptico-linearibus integerrimis ciliatis, pedunculis elongatis. *Nov. Holl.*

## pag. 611.

Ad *Cliffortiam.*

Post n. 8. *serrata* Reichenb. 22. Cl. foliis spathulato-lanceolatis cuspidato-serratis glabris, stipulis persistentibus imbricatis ovatis, ramis flexuosis virgatis. *C. B. S.*

## pag. 612.

Post n. 15. *spicata* Reichenb. 23. Cl. caule simplici foliisque subverticillatis lanceolatis erectis hirsutis, spicis densis terminalibus foliosis. *C. B. S.* Olim Anthospermum habui, licet nusquam descripserim.

Post *Cliffortiam*:

## TRICHOSPERMUM Blum.

*javanicum* Blum. — *Java*. Arbor foliis alternis cordato-oblongis serrulatis subtus 2glandulosis, stipulis ovatis, cymis axillaribus.

Ad *Ablaniam* Aubl.

*digitata* * — 2. A. foliis digitatis glabris supra nitidis, foliolis oblongis serrulatis, floribus corymbosis. *Rio grande*. Sello.

Ad *Lacida*.

*foeniculacea* * — 2. L. foliis decompositis lineari-setaceis serrulatis, floribus solitariis spathaceis 3andris. *Nov. Granat.* (Marathrum foeniculaceum Humb. Syst. 2. p. 246.)

Ad *Homalium*.

*incanum* Pers. — 3. H. foliis spathulato-lanceolatis apice serratis incano-tomentosis, floribus 1gynis. *Peru.* (Pineda incana R. et P.)

*angustifolium* Sm. — 4. H. foliis lanceolatis subintegerrimis, racemis spicatis axillaribus, laciniis calycis interioribus obtusis. *Afric. occid.*

† *Napimoga* * — 5. H. foliis ovali-oblongis crenatis laevibus, spicis pedunculatis axillaribus interruptis filiformibus, corolla pubescente eglandulosa. *Guiana.* (Napimoga guianensis Aubl.)

pag. 613.

Ad *Sauraviam* W.

S. *excelsa* W. (Palava scabra Kunth.)
S. *gigantea* Cand. (Ternströmia racemosa Don.) *Nepal.*
S. *nepalensis* Cand. (S. micrantha Blum.) *Java.*
S. *bracteosa* Cand. (S. Reinwardtiana Blum.)
S. *bracteolata* Cand. (S. cuneata Blum.)
S. *serrata* Cand. (Palava glabrata R. et P. Apatelia Cand. Syst. 3. 340.)
S. *lanceolata* Cand. (S. spadicea Blum.) Nonne et Palava lanceolata R. et P. (Apatelia Cand. Syst. 3. 340.) ?*Peru.*

*Blumeana* * — 13. S. foliis cordato-oblongis acuminatis setaceo-serrulatis supra glabris subtus rufo-villosis, ramulis hirsuto-strigosis, pedunculis axillaribus trichotomis cymiferis petiolo brevioribus bracteatis, bracteis lato-lanceolatis. *Java.* (S. gigantea Blum.)

*Noronhiana* Blum. — 14. S. foliis ovato-oblongis acuminatis calloso-serratis utrinque strigoso-squamulosis, pedunculis axillaribus confertis 1floris nutantibus. *Java.*

*pendula* Blum. — 15. S. foliis oblongis glanduloso-serratis utrinque glabris, pedunculis axillaribus elongatis nutantibus 2-3floris, pedicellis sub-3floris umbellatis. *Java.*

*hirsuta* Blum. 16. S. foliis basi inaequali oblongis acuminatis supra scabris subtus ramulisque hirsutis, pedunculis axillaribus elongatis 3fido-umbellatis, bracteis spathulatis. *Java.*

*tomentosa* * 17. S. foliis obovato-lanceolatis argute denticulatis supra calloso-asperis subtus ramulisque albido-tomentosis, paniculis axillaribus bracteatis. *Nov. Granat. Quito.* (Palava tomentosa Kunth.)

*biserrata* * 18. S. foliis obovato-oblongis biserratis, racemis brachiatis, pedicellis 3floris. *Peru.* (Palava biserrata R. et P., Apatelia Cand. Syst. 3. 340.)

*cauliflora* Blum. 19. S. foliis ovato-oblongis acuminatis aristato-serratis supra glabris subtus strigoso-tomentosis dilute spadiceis, pedunculis 1floris in trunco aggregatis. *Java.*

pag. 614.

Ad *Hibbertiam* Salisb.

Post n. 14. *canescens* Sieb. 20. H. foliis spathulato-linearibus supra pilosis subtus glabris, ramis villosis, germinibus pubescentibus. *Nov. Holl.*

pag. 615.

Ad *Paeoniam peregrinam* Mill. P. *sessiliflora* Bot. mag. 2648. var.

pag. 618.

Ad *Delphinium.*

Post n. 26. *pauciflorum* Don. 48. D. foliis multipartitis glabris, laciniis linearibus acutis, pedunculis remotis elongatis, calcare abbreviato, petalis superioribus 2fidis, inferioribus obovatis unguiculatis. *Nepal.*

Post n. 31. *velutinum* Bertol. 49. D. petiolis basi dilatatis vaginantibus, foliis 5partito-multifidis utrinque cauleque villosis, laciniis linearibus, bracteis inferioribus flore longioribus. *Italia media.*

pag. 619.

Ad D. *ciliatum* Stev. D. scabrifolium et Carela Don. *Nepal.*

pag. 621.

Ad *Aconitum productum* Reichenb. (A. grandiflorum Pall. herb., delphinifolium β. sibiricum Cand.)

pag. 625.

Ad *Begoniam.*

Post n. 12. *elliptica* Kunth. 39. B. herbacea glabra, foliis inaequilatero-ellipticis acuminatis subintegerrimis 5nerviis venosis, corymbis dichotomis longe pedunculatis, capsulae ala exteriore ovato-deltoidea acuta ascendente. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 7. t. 641.

pag. 633.

Ad *Sagittariam.*

S. *guianensis* l. guayanensis.
Post n. 3. *palaefolia* Mart. 17. S. foliis obovatis obtusis multinerviis, angulis baseos obtusis, scapo sursum ancipiti angulato, floribus verticillatis hermaphroditis, fructibus obovatis striatis. *Brasil.*

pag. 634.

Post *Carpodonta:*

## ROLLINIA Hilar.

*longifolia* Hilar. 1. R. foliis oblongo-lanceolatis subtus calycibusque rufo-tomentosis. *Brasil.* (Anona dolabripetala Radd., xestropetala Syst. 2. p. 641.)

*fagifolia* Hilar. 2. R. foliis ovatis cuspidatis subtus pubescentibus, costa venisque rufo-villosis. *Brasil.*

*parviflora* Hilar. 3. R. foliis oblongis acuminatis subtus pubescentibus. *Brasil.*

pag. 635.

Ad *Guatteriam* R. et P.

Post n. 18. *cuneiformis* Blum. 21. Gu. foliis obovatis basi subcordatis glabris subtus glaucis, pedunculis 1floris petalisque subfalcatis elongatis, fructibus oblongis utrinque attenuatis. *Java.*

*lateriflora* Blum. 22. Gu. foliis oblongis acuminatis glabris, pedunculis solitariis 1floris, fructibus obovato-oblongis stipite brevioribus. *Java.*

*pallida* Blum. 23. Gu. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris subtus pallidis, pedunculis solitariis 1floris elongatis, fructibus stipitatis oblongis utrinque attenuatis pubescentibus. *Java.*

*australis* Hilar. 24. Gu. fruticosa, foliis oblongis acuminatis glabris, petalis subaequalibus obtusis. *Brasil.*

Post n. 19. *Gomeziana* Hilar. 25. Gu. arborea, foliis oblongis acuminatis subtus pilosis, petalis interioribus lanceolatis acutis. *Brasil.*

*macrophylla* Blum. 26. *Gu. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis subtus pubescentibus, pedunculis brevissimis paucifloris, petalis exterioribus brevioribus. *Java.*

*Bragma* Blum. 27. Gu. foliis oblongis acuminatis supra lucidis, venis subtus ramulisque tomentosis, pedunculis brevissimis 1floris, petalis interioribus brevioribus. *Ins. Javae vicinae.*

*pisocarpa* Blum. 28. Gu. foliis basi inaequali ovato-oblongis obtusiusculis, venis subtus ramulisque tomentosis, pedunculis 1floris, fructibus globosis subsessilibus. *Java.*

*ferruginea* Hilar. 29. Gu. foliis oblongis acutis subtus ferrugineo-pubescentibus, petalis interioribus latioribus bre-

vieribus. *Braſil.* Gu. eriopoda Cand. petala habet ſubaequalia.

*illoſiſſima* Hilar. 80. Gu. foliis oblongis acuminatis, venis ſubtus villoſiſſimis, pedunculis 2floris, petalis interioribus brevioribus. *Braſil.*

*utea* Hilar. 81. Gu. fruticoſa, foliis oblongis acuminatis ſubpubeſcentibus, petalis interioribus elongatis acutis. *Braſil.*

## pag. 636.

### Ad *Xylopiam.*

*randiflora* Hilar. 12. X. arborea, foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis, pedunculis breviſſimis 2floris, petalis exterioribus linearibus, interioribus triquetris baſi 2auriculatis. *Braſil.*

*ericea* Hilar. 13. X. arborea, foliis lanceolatis acuminatis ſubtus ſericeis, pedunculis breviſſimis 3floris, petalis exterioribus linearibus obtuſis, interioribus triquetris. *Braſil.* Hilar. pl. uſ. braſil. t. 33.

## pag. 637.

### Ad *Unonam.*

*'ananga* * 31. U. foliis inaequaliter ovato-oblongis acuminatis glabris, pedunculis axillaribus 1-multifloris demum foliofis, pedicellis ſubcorymboſis, petalis lanceolatis, fructibus ovalibus ſtipitatis. *Java.* (U. odorata Blum.)

*lliptica* Blum. 32. U. foliis ſubſeſſilibus ſubcordato-oblongis acutis glabris, pedunculis axillaribus 1floris bracteatis, petalis lineari-lanceolatis obtuſiuſculis. *Java.*

*'toralis* Blum. 33. U. ramis ſubſcandentibus, foliis ovato-oblongis coriaceis glabris, pedunculis 1floris petiolo longioribus, fructibus ovalibus medio coarctatis breviter ſtipitatis. *Java.*

*nacrophylla* Blum. 34. U. foliis ovato-oblongis acuminatis coriaceis glabris, pedunculis 1floris ſubaxillaribus, fructibus ovalibus 2ſpermis breviter ſtipitatis. *Java.*

*uaveolens* Blum. 35. U. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris, pedunculis uncinatis multifloris, petalis linearibus ſericeis, fructibus oblongis utrinque attenuatis breviter ſtipitatis. *Java.*

*I. odorata* Dun. (U. virgata Blum.)

*I. nitidiſſima* Dun. (U. fulgens Labill. nov. Caled. t. 56.)

## pag. 638.

Poſt n. 20. *biglandulofa* Blum. 36. U. fruticoſa, foliis ſubcordatis ovato-lanceolatis margine 2glanduloſis ſubtus glaucis, pedunculis 1floris folio brevioribus, fructibus moniliformibus ſtipitatis. *Java.*

Poſt n. 25. *ſubcordata* Blum. 37. U. foliis ſubſeſſilibus ſubcordato-oblongis acuminatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis ſolitariis 1floris, baccis globoſis ſtipitatis 2ſpermis. *Java.*

*fibirica* Patrin. 7. A. glaberrima, petalis numerofis obovatis apice crenulatis calycem multo fuperantibus, foliorum laciniis abbreviatis incifis. *Sibir.* (A. ircutiana Fifch.?)

## pag. 646.

### Ad *Ranunculum.*

Poft n. 8. *Agerii* Bertolon. 148. R. foliis glabris, radicalibus cordatis fublobato-dentatis, fequentibus 3partitis, laciniis cuneatis obtufe dentatis incifis, caule fimplici fub-1floro, calyce reflexo. *Ager bononienfis Ital.* Opufc. fcientif. di Bologn. 3. p. 182. t. 6.

## pag. 647.

R. *cortufaefolius* W. (R. heucheraefolius Presl. *Sicil.*)

Ad R. *millefoliatum* del. fyn. Bertolonii.

Poft n. 22. *fcaber* Presl. 149. R. foliis decompofitis multifidis fcabris, laciniis lineari-oblongis obtufis, calyce pubefcente reflexo, caule erecto foliofo multifloro appreffe pubefcente, radice grumofa. *Sicil.*

## pag. 648.

Poft n. 31. *cordifolius* * 150. R. foliis longe petiolatis cordatis crenatis, infimis orbiculatis, caule afcendente gracili glaberrimo, pedunculis 1floris, floribus oligandris, fepalis petalisque fubternis. *Monte Video.* (Cafalea afcendens Hilar.)

## pag. 649.

R. *bonarienfis* Poir. melius fic: R. foliis inferioribus petiolatis cordato-ovatis obtufis crenatis, fuperioribus fubfeffilibus ovatis, caule ramofo, fepalis petalisque minoribus ternis, floribus oligandris. *Buenos Ayres.* (Cafalea ficarifolia Hilar.)

*phyteumaefolius* * 151. R. glaberrimus erectus, foliis inferioribus cordatis obtufis integerrimis, fuperioribus oblongis fubdentatis, fummis linearibus, petalis calycem fubaequantibus. *Brafil.* (R. bonarienfis Perf., heterophyllus Sm., Cafalea phyteumaefolia Hilar.)

R. *flagelliformis* Sm. — floribus minutis oligandris. (Cafalea Hilar.) *Brafil.*

*javanicus* Blum. 152. R. foliis omnibus petiolatis cordato-ovatis crenatis, fummis lanceolatis trifidisve, pedunculis oppofitifoliis 1floris, petalis calyce duplo longioribus. *Java.*

*fontanus* Presl. 153. R. caule afcendente fiftulofo, foliis dentatis, inferioribus petiolatis cordato-ovatis obtufis, fuperioribus lineari-oblongis in petiolum attenuatis, pedunculis oppofitifoliis, petalis calycem fuperantibus. [illegible] *Sicil.*

Poſt n. 46. *hydrophilus* Gaudich. 164. R. caule repente radicante, foliis radicalibus orbiculato-ovatis longiſſime petiolatis, pedunculis 1floris. *Inſ. Falkland.*

pag. 650.

R. *apiifolius* Perſ. — calycibus coloratis, petalis minimis nectaria referentibus. (Aphanoſtemma Hilar.)

pag. 651.

Poſt n. 65. *Sabinii* R. Br. 155. R. foliis 3partitis, radicalibus longe petiolatis, laciniis ellipticis, lateralibus ſemibifidis, caulinis ſeſſilibus linearibus, calycibus hirſutis petala retuſa ſubaequantibus. *Inſ. Melville.*

*arcticus* Richardſ. 156. R. foliis glaberrimis, radicalibus longe petiolatis haſtatis 5partitis, laciniis 3-4fidis obtuſis, caulinis linearibus partitis, caule ſimpliciſſimo 1floro, calyce villoſo reflexo petalis obtuſiſſimis breviori. *Amer. arctic.*

*Purſhii* Richardſ. 157. R. caule repente foliisque petiolatis glaberrimis, depreſſis ternatim decompoſitis, laciniis divaricatis linearibus acutis, elevatis ſubuniformibus, laciniis cuneatis apice inciſo-dentatis, calycibus glaberrimis reflexis corolla nervoſa brevioribus. *Amer. arctic.*

Poſt n. 72. *affinis* R. Br. 158. R. caule erecto 1-2floro pubeſcente, foliis radicalibus petiolatis pedato-multifidis, caulinis ſubſeſſilibus digitatis, laciniis linearibus, fructibus recurvo-roſtratis. *Inſ. Melville.*

Poſt n. 73. 74. *angulatus* Presl. 159. R. caule ramoſo appreſſe piloſo, foliis radicalibus longe petiolatis cordato-ſubrotundis angulato-lobatis dentatis, caulinis 3partitis inciſo-dentatis, fructibus roſtratis glaberrimis. *Sicil.*

pag. 652.

R. *Villarſii* Cand. (R. inſularis Viv.)

pag. 653.

R. *geranioides* Humb. habitat et in *Java*. Blum. flor. jav. p. 2.

pag. 654.

R. *acris*. (R. ſiculus Presl.)

pag. 655.

R. *nepalenſis* Cand. (R. trilobatus Don.)

pag. 656.

Poſt n. 127. *ſeſſiliflorus* * 160. R. caule proſtrato hirſuto, foliis piloſis, radicalibus ſuborbiculatis, ſuperioribus 3partitis inciſis ciliatis, ſummis ſubtriangulari-

bus, floribus subsessilibus oppositifoliis oligandris, sepalis petalisque subternis. *In paludibus ad fl. Platam.* (Casalea sessiliflora Hilar.)

pag. 657.

R. *Philonotis* Retz. (R. pratensis Presl.)

pag. 658.

Ad † *Trollium.*

*Ledebourii* Reichenb. 6. Tr. sepalis 5 patentibus, nectariis 10-12 linearibus stamina superantibus. *Sibir.* Reichenb. ic. t. 272.

*pumilus* Don. 7. Tr. sepalis patentibus subrotundo-ovalibus, staminibus nectaria 12 lineari-lingulata duplo superantibus. *Emodi montes.*

pag. 659.

Ad *Caltham.*

Post n. 1. *Emodorum* * 14. C. caule ascendente dichotomo, ramis 2floris, foliis longe petiolatis sagittato-cordatis crenatis, angulis posticis subtruncatis dentatis, fructibus longe rostratis. *Emodi montes.* (C. himalensis Don.)

*arctica* R. Br. 15. C. caule repente, foliis reniformibus repandis crenatis, fructibus imbricatis recurvo-rostratis. *Ins. Melville.*

pag. 660.

Post *Caltham:*

HYDRASTIS.

*canadensis* *Amer. bor.* Herba e radice tuberosa lutea, foliis binis ternisve petiolatis palmatis inciso-serratis, flore solitario pedunculato rubescente, fructibus rubris Rubo similibus. (Warneria canadensis Mill.)

pag. 662.

Ad *Anemonem.*

A. *pensylvanica.* (A. borealis Richardſ.)

*Hudsoniana* Richardſ. 37. A. foliis villosis, involucri ternatim decompositis breviter petiolatis, radicalibus multipartitis, laciniis palmatis linearibus, pedunculis binis, sepalis 5-8 ovatis acutiusculis. *Amer. bor.*

*elongata* Don. 38. A. foliis glabris, involucri binis basi connatis 3lobis inciso-dentatis, inferioribus 3partitis, laciniis cuneatis inciso-lobatis, pedunculis ternis simplicibus, mediano pilosis, sepalis 5 ovalibus, germinibus glabris rostratis. *Nepal.*

*obtusiloba* Don. 39. A. foliis villosissimis, involucri ternis 3fidis, inferioribus cordatis 3lobis, lobis cuneatis inci-

ſo crenatis, ſepalis obovatis, germinibus piloſis roſtratis. *Nepal.*

pag. 663.

Poſt n. 36. *polyanthes* Don. 40. A. foliis villoſiſſimis, radicalibus longe petiolatis cordatis 3partitis, lobis late cuneatis 3lobis inciſo-dentatis, involucro 3phyllo 3partito, laciniis 3fidis pinnatifidisve, pedunculis umbellatis, ſepalis obovatis, germinibus glabris. *Nepal.*

pag. 664.

Ad *Clematidem.*

Cl. *nepalenſis* Cand. (Cl. montana Don.)

pag. 665.

Poſt n. 7. *ſmilacina* Blum. 80. Cl. foliis ovatis coriaceis glabris integerrimis 5nerviis. *Java.*

*glanduloſa* Blum. 81. Cl. foliis ovatis glanduloſo-dentatis glabris 5nerviis, pedunculis paniculatis 3fidis, floribus monoecis. *Java.*

Cl. *montana* Buchan. (Cl. anemonaeflora Don.)

pag. 667.

Poſt n. 36. *campeſtris* Hilar. 82. Cl. caule ſcandente 5gono foliisque ternato-pinnatis pubeſcentibus, foliolis ovato-lanceolatis acutis, pedunculis axillaribus ſolitariis, terminalibus ſubternis, ſepalis patulis villoſis. *Braſil.*

pag. 669.

Poſt n. 64. *triloba* Hilar. 83. Cl. foliis ternatis glabris, foliolis 3fidis acuminatis, pedunculis 3fidis 2bracteatis. *Braſil.*

pag. 671.

Ad *Thalictrum.*

Poſt n. 15. † *javanicum* Blum. 53. Th. caule ſubtetragono ſtriato, foliolis orbiculatis glabris ſubtus glaucis 3fidis, panicula dichotoma corymboſa erecta. *Java.*

# CLASSIS XIV.

pag. 675.

Poft n. 2061. *Stenarrhena* Don. Cal. ½. Cor. ⅗, lab. fup. galeato, labii infer. lobo medio maximo. Antherae longiffimae 1loculares. Stigma 2fidum.

pag. 676.

Poft n. 2078. *Perilla.* Cal. 5fidus, lacinia fuprema breviffima. Cor. ⅘, lab. fup. emarginato, lobis labii inf. fubaequalibus. Filamenta diftantia corolla breviora. Styli 2 connexi.

pag. 677.

Poft n. 2089. *Pycnoftachys* Hook. Cal. dentibus 5 fpinulofis, finubus involutis. Cor. lab. fup. 4crenatum, infer. integrum cucullatum. Stam. declinata approximata.

*Glechon* *. Cal. tubulofus 5-dentatus, ore villofiffimo. Cor. ringens, lab. fup. fornicato, dentibus ad latera faucis: lab. infer. indivifum.

pag. 678.

Poft n. 2118. *Caffelia* Nees. Cal. campanulatus 5fidus perfiftens. Cor. infundibuliformis, limbo 5lobo. Antherae in fundo corollae, filamentis breviffimis. Capf. reticulata 2locularis 2fperma, receptaculo feminum duplici feptiformi, altero margine libero.

pag. 679.

Poft n. 2125. *Afaphes* *. Cal. duplex involucratus, exter. campanulatus truncatus ore fpinulofus, interior tubulofus, dentibus 5 fpinulofis. Cor. tubo curvato, limbo 4lobo. Stam. tubo inferta. Antherae 2loculares. Stigma peltatum.

Ad n. 2140. *Hemiphragma* add. Wallich.

pag. 680.

Poft n. 2149. inferatur *Vrolikia* e fyft. 5. p. 149.

Poft n. 2158. *Campyleia* Thuars. Cal. cylindricus angulatus 5dentatus. Cor. tubo incurvo, limbo fub-2labiato 4lobo. Capf. compreffa ovalis ftylo coronata 2valvis 2locularis polyfperma.

pag. 682.

Poft n. 2189. *Sopubia* Hamilt. Cal. campanulatus 5dentatus. Cor. campanulata aequaliter 5loba. Stam. exferta. Antherae 2partitae, loculis fterilibus tubulofis.

Stigma indiviſum. Capſ. 2locularis 2valvis polyſperma. Diſſepimentum parallelum continuum.
Ad n. 2196. *Chelone.* Capſ. 2-(non 6-) locularis.

pag. 683.

n. 2204. *Sibthorpia*, hinc exul, in Cl. V. collocata eſt.

pag. 685.

n. 2235. *Didymocarpus* Jack., hinc exul, in Cl. II. collocatus eſt.
n. 2236. *Aeſchynanthus* Jack. ſemina habet utrinque comoſa, non ariſtata.
n. 2239. *Parentucellia* Viv. ad R. Brown. eſt Euphraſia.
*Sinningia* Nees. Cal. 5angularis, angulis alatis. Cor. 2labiata. Rudimentum filamenti quinti. Glandulae 5, cum filamentis alternae. Capſ. ſubcarnoſa 5angularis, placentis duabus 2fidis.

pag. 686.

Poſt n. 2251. *Abelia* R. Br. Involucrum 2-multiflorum. Cal. ſuperus foliaceus. Cor. infundibuliformis 5loba. Germen 3loculare, loculis 2 abortientibus.
n. 2254. *Melianthus* melius *Rutaceis* Juſſ. acceaſendus.

---

pag. 687.

Ad *Lumnitzeram* Jacqu.

*caesia* * 10. L. ramis glabriuſculis teretibus, foliis ovatis dentato-crenatis, pedunculis ſubverticillatis baſi bracteatis. *Patria?*

*carnoſa* * 11. L. ramis glabriuſculis 4gonis, foliis ovatis ſubcoriaceis dentato-crenatis, verticillis racemoſis nudis. *Monte Video.*

*rubicunda* * 12. L. caule fruticoſo, foliis longe petiolatis ovalibus ſerratis ramuliſque tomentoſis, verticillis remotis paucifloris, bracteis minimis, tubo corollae calycem ſetaceo-dentatum ter ſuperante. *Nepal.* (Plectranthus rubicunda Don.)

*virgata* * 13. L. caule ſuffruticoſo, foliis elliptico-oblongis obtuſis dentatis utrinque piloſis, verticillis remotis paucifloris, dentibus calycis infer. inaequalibus mucronatis. *Nepal.* (Plectranthus virgata Don.)

pag. 688.

Ad *Ocimum.*

Poſt n. 11. *flammeum* Sims. 28. O. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis incanis, verticillis ſub-6floris, ſtaminibus longe exſertis. *China.* Bot. mag. 2452.

*Coetſa* * 29. O. foliis ovatis acutis ſerratis piloſis ſubtus canaſcentibus, pedicellis oppoſitis 3fidis paucifloris ſpicato-racemoſis, calycibus piloſis. *Nepal.* (Plectranthus Don.)

*ternifolium* * 30. O. foliis ternis oblongo-lanceolatis acuminatis ferratis hirfutiffimis fubtus tomentofis, fpicis ternis verticillatis multifloris, calycibus undique lanatis. *Nepal.* (Plectranthus Don.) Pl. ternatus Sims. e *Madagafcar* huc?

pag. 689.

Ad *Plectranthum.*

Pl. *mollis* *. (Pl. cordifolius Don.)
*coloratus* Don. 29. Pl. caule fruticofo, ramis falcatis, foliis ellipticis acutis ferratis hifpidis, verticillis multifloris contiguis fpicatis, calycibus cylindricis fauce bimaculatis, bracteis ovatis coloratis. *Nepal.*

pag. 692.

Ad *Meliffam.*

Poft n. 4. *coccinea* * 6. M. foliis obovatis integerrimis glabris fubtus punctatis, pedunculis axillaribus fubfolitariis, corollis clavatis pendulis. *Florida.* (Cunila coccinea Hook. exot. fl. t. 163.)

pag. 697.

Ad *Thymum.*

Poft n. 35. *origanifolius* Don. 55. Th. caule erecto ramofo villofo, foliis fubrotundo-ovatis acutis ferratis utrinque hirfutis, verticillis multifloris, floribus pedicellatis, dentibus calycis inaequalibus plumofis. *Nepal.*

pag. 698.

Poft n. 43. *megapotamicus* * 56. Th. caule erecto herbaceo, foliis linearibus convolutis afpero-punctatis, pedunculis confertis folia fubfuperantibus. *Rio grande.* Sello.
Poft n. 44. *biflorus* Don. 57. Th. caule fuffruticofo filiformi decumbente pilofo, foliis elliptico-ovatis obtufis integerrimis marginatis nervofis fubtus punctatis nudiufculis, pedunculis oppofitis fub-3floris, calycis cylindrici fulcati dentibus fetaceis. *Nepal.*
*piperitus* Don. 58. Th caule fruticofo erecto ramofo, foliis ovatis obtufis fubcrenulatis pilofiufculis, pedunculis oppofitis 3floris, calycis dentibus fubulatis. *Nepal.*
*repens* Don. 59. Th. caule repente 4gono, foliis cordatis crenatis nervofis hirfutis, corymbis fubfeffilibus 5floris, dentibus calycis fuperioribus ovatis obtufis. *Nepal.* (Clinopodium repens Roxb.)
*parviflorus* Requien. 60. Th. caule decumbente caefpitofo, foliis fubrotundis glabris, pedunculis 3floris, corolla regulari. *Corfica.*

pag. 699.

Ad Th. *Calaminthan.* Th. *glandulofus* Requien. var.

*nepetoides* Don. 61. Th. caule erecto foliisque cordato-ovatis obtusis crenatis villosis, pedunculis multifloris, bracteis subulatis, calycibus basi ventricosis. *Nepal.* (Glechoma erecta Roxb.)

pag. 700.

Ad *Gardoquiam* R. et P.

*capitata* 13. G. capitulis ovatis longe pedunculatis, bracteis calycibusque spinosis pilosis, foliis fasciculatis lineari-oblongis margine revolutis integerrimis cauleque ramoso hispidis. *Rio grande.* Sello.

*origanoides* Reichenb. 14. G. capitulis pedunculatis bracteatis, foliis obovatis apice subdentatis venoso-lineatis pubescentibus. *Ins. Trinit.*

*spicata* 15. G. spicis terminalibus villosis, foliis subfasciculatis spathulatis subintegerrimis asperis. *Rio grande.* Sello.

Post *Lepechiniam* W.:

STENARRHENA Don.

*lanata* Don. *Nepal.* Herba simplex villosissima, foliis subsessilibus lanceolatis acutis crenulatis rugosis subtus niveo-lanatis, verticillis distantibus, bracteis integerrimis, floribus rubris.

pag. 701.

Ad *Scutellariam.*

Post n. 1. *scordifolia* Fisch. 39. Sc. caule erecto simplici sursum pubescente, foliis cordato-ellipticis subcrenatis pubescentibus punctatis, floribus axillaribus oppositis solitariis. *Sibir.*

*barbata* Don. 40. Sc. caule erecto simplici foliisque ovato-oblongis obtusis inferioribus serratis glabris, floribus solitariis, corollis villosis. *Nepal.*

*repens* Hamilt. 41. Sc. caule suffruticoso decumbente ramosissimo, foliis cordatis acutis inciso-serratis hirsutis, floribus axillaribus solitariis secundis, corollis tomentosis. *Nepal.*

pag. 702.

Post n. 17. *scandens* Hamilt. 42. Sc. caule erecto volubili foliisque ovatis acuminatis serrato-crenatis glabris, racemis axillaribus secundis multifloris, bracteis cordatis integerrimis pedicellos superantibus. *Nepal.*

Post n. 19. *indica* 43. Sc. racemis spicatis terminalibus, bracteis linearibus, tubo corollae filiformi, foliis cordatis obtusis crenatis pubescentibus subtus purpureis, caule simplici. *China. Ind. or. Nepal.* (Scutellaria sinica Plukn. t. 441. f. 1., sed nequaquam Serratula amara Rumph., quae Gratiola amara Roxb.)

pag. 703.

Post n. 85. *Feldberti* Mart. 44. Sc. foliis cordato-ovatis dentatis supra pilosis subtus cauleque pubescentibus, racemis terminalibus trichotomis foliosis, labio corollae inferiori emarginato. *Brasil.*

Ad *Prostantheram* Labill.

Post n. 1. *empetrifolia* Sieb. 18. Pr. foliis linearibus cuspidatis revolutis glabris, ramulis villosis, calycibus ciliatis. *Nov. Holl.*

pag. 705.

Ad *Aiugam.*

Post n. 7. *integrifolia* Don. 15. A. hirsutissima, caule erecto, foliis inferioribus spathulato-oblongis repando-crenatis in petiolum attenuatis, verticillis 10floris, laciniis calycis ovato-lanceolatis acutis. *Nepal.*

A. *decumbens* Thunb. provenit et in *Nepal.*

pag. 706.

Ante n. 18. *lobata* Don. 16. A. surculis reptantibus, foliis longe petiolatis cordatis obtusis inciso-lobatis, floribus verticillato-spicatis secundis, laciniis calycis lineari-lanceolatis acutis bractea brevioribus. *Nepal.*

Ad *Anisomelem* R. Br.

A. *nepalensis* * (Nepeta versicolor Trevir.)

† *australis* * 7. A. foliis 3fidis cauleque glabriusculis, cymis axillaribus paucifloris erectis, calycibus pubescentibus. *Nov. Holl.* (Teucrium australe Sieb.)

pag. 710.

Ad *Teucrium.*

*quadrifarium* Hamilt. 80. T. hirsutissimum, foliis petiolatis cordato-ovatis acutis inaequaliter crenatis, spicis elongatis oppositis multifloris, bracteis stipitatis cordatis acuminatis integerrimis coloratis decussatis, caule stricto tomentoso. *Nepal.*

*laxum* Don. 81. T. foliis petiolatis ovato-oblongis acuminatis serratis utrinque pilosiusculis, racemis spicatis secundis multifloris, bracteis calyce hispido brevioribus. *Nepal.*

pag. 712.

*Westringia rosmariniformis* Sm. (Cunila fruticosa W.)

pag. 713.

Post *Leucosceptrum* Sm.:

## PERILLA.

*elata* Don. 1. P. fruticosa, foliis ellipticis acutis crenatis supra scabris subtus ramulisque tomentosis, spicis terminalibus paniculatis, calycibus tomentosis. *Nepal.*

*fruticosa* Don. 2. P. fruticosa, foliis oblongis utrinque attenuatis serratis pubescentibus, spicis linearibus paniculatis decussatis, bracteolis minutis subulatis, calycis hispidi dentibus subulatis. *Nepal.*

*leptostachya* Don. 3. P. fruticosa, foliis longe petiolatis ovatis utrinque attenuatis inciso-serratis pubescentibus, spicis linearibus solitariis, bracteis subulatis calycem tomentosum aequantibus. *Nepal.*

*ocimoides* 4. P. herbacea elata hirsuta, foliis ovatis acuminatis serratis, spicis secundis, bracteis ovatis acuminatis flore longioribus. *Ind. orient.* (Melissa maxima Arduin.)

*polystachya* Don. 5. P. herbacea glabra, foliis ovatis acuminatis serratis, spicis numerosis, bracteis lanceolatis acuminatis flores subaequantibus, calycibus hispidis. *Nepal.*

pag. 716.

Ad *Origanum vulgare*. O. normale Don. var.

pag. 721.

Ad *Hyssopum*.

Post n. 5. *lophanthoides* Don. 6. H. foliis ovatis acutis crenatis pubescentibus, pedunculis axillaribus capillaceis *multifloris paniculatis folia superantibus*, dentibus calycis ovatis obtusis. *Nepal.*

Post *Elsholtziam* W.:

## PYCNOSTACHYS Hook.

*coerulea* Hook. *Madagascar.* Herba erecta glabra, caule 4gono, foliis lanceolatis subserratis, spicis densis, floribus coeruleis. Hook. exot. fl. t. 202.

## GLECHON *.

*thymoides* * *Rio grande Amer. austr.* Suffrutex erectus, foliis obovatis obtuse dentatis venosis glabriusculis, floribus axillaribus subsessilibus subsolitariis.

pag. 722.

Ad *Mentham*.

A M. *stellata* Lour. M. *verticillata* Roxb. Don. haud differre videtur.

Post n. 4. *blanda* Wallich. 36. M. spicis cylindricis gracilibus, calycibus pubescentibus corollam aequantibus, staminibus inclusis nudis, foliis petiolatis rhombeo-ovatis grosse dentatis subtus punctatis glabris. *Nepal.* Cand. ic. hort. genev. t. 8.

pag. 723.

*macrostachya* Tenor. 37. M. verticillis spicatis continuis elongatis, calycibus glabriusculis, staminibus corollam aequantibus, stylo exserto, foliis sessilibus subcordato-ovatis dentatis rugosis villosiusculis. *Neapol.* Ergo removeatur e syn. M. rotundifoliae.

† *origanoides* Tenor. 38. M. floribus capitato-spicatis, bracteis confertis ovatis integerrimis, staminibus corolla longioribus, foliis subcordato-ovatis obtusis serratis, caule hirto. *Neapol.*

*urticaefolia* Tenor. 39. M. floribus verticillato-spicatis, infimis subcapitatis pedunculatis, bracteis cuspidatis inciso-dentatis, staminibus corolla brevioribus, foliis ovato-ellipticis conduplicatis divergenti-dentatis hirsutis, caule hirto. *Neapol.*

pag. 725.

Ad *Galeopsin Tetrahit* var. G. *bifida* Bönninghaus. fl. monaster. p. 178., lacinia media labii inf. bifida postice lineis duabus aureis notata.

pag. 726.

Ad *Lamium.*

L. *rugosum* Ait., lobo medio lab. inf. corollae obcordato variegato. *Europ. med. et austr.* Reichenb. ic. t. 217. (L. maculatum Sm. engl. bot. 2550. Hornem. fl. dan. 1649. fl. hal., L. longiflorum Tenor.?)

*maculatum*, foliis cordatis acutis inaequaliter dentatis medio albo-vittatis cauleque pilosiusculis, verticillis 6-10floris, lobo medio labii infer. obovato inciso-crenato. *Italia.* Reichenb. ic. t. 215.

*flexuosum* Tenor. 20. L. foliis cordato-ovatis acutis grosse inaequaliter dentatis pilosiusculis, caule flexuoso elato deorsum piloso, verticillis sub-10floris, calycibus aristatis tubum corollae aequantibus, lobo medio lab. inf. replicato. *In sepibus Italiae, Saxoniae et Palatinatus.* Tenore. Zeyher. Ergo removeatur e syn. L. maculati. L. laevigatum Reichenb. ic. t. 216. huc potius pertinet, cum verum L. laevigatum L. et glabros habeat caulem calycesque et hos multo breviores tubo corollae et dentes corollae latiores lanceolatos nec setaceos, lobum medium denique labii infer. patentem nec latere replicatum. A b. Aitonio accepta exemplaria magnopere differunt et statura minore.

pag. 727.

Ad *Lamium amplexicaule* L. L. intermedium et moluccellaefolium Fries. varr.

pag. 731.

Ad *Hyptin atrorubentem* Poit. H. racemosa Zuccagn. Bertolon. negli opusc. scient. di Bologn. 4. p. 388.

pag. 734.

Ad *Stachya.*

St. *hirta.* (St. divaricata Viv. append. ad fl. cors.)
Post n. 24. *marrubiifolia* Viv. 54. St. hirta, caule brachiato, foliis cordatis subrotundis crenatis, floralibus ovato-ellipticis apice spinulosis, verticillis laxis 6floris, corollae galea loboque labii infer. medio emarginato. *Corsica.*

pag. 738.

Ad *Ballotam.*

*cinerea* Don. 3. B. foliis ovatis obtuse serratis subtus cauleque cinereo-tomentosis, pedunculis axillaribus oppositis 3-6floris, laciniis calycis foliaceis spathulatis corolla longioribus. *Nepal.*

pag. 739.

Ad *Betonicam.*

Post n. 7. *laevigata* Don. 10. B. spica oblonga, floribus confertis incurvis, dentibus calycis longissimis aristatis, foliis cordato-ovatis serratis cauleque glabris. *Nepal.*

Ad *Marrubium.*

M. *leonuroides* Desr. potius ad M. *astracanicum* Jacqu., quam ad M. *catariaefolium* Desr.
M. *peregrinum* melius sic: M. caule ramosissimo, ramis patentibus, foliis oblongis basi attenuatis dentatis rugoso-venosis sericeo-tomentosis, bracteis dentibusque calycis subulatis divergentibus. M. creticum Mill., paniculatum Desr. et remotum Kit. e synonymis reiicienda.
*creticum* Mill. 17. M. caule ramosissimo, ramis divaricatis, foliis oblongo-lanceolatis rugoso-venosis albo-tomentosis, dentibus calycis rectis, duobus minoribus. *Creta. Austria. Ager halensis.* (M. peregrinum Jacqu.) Reichenb. ic. t. 288.

pag. 740.

Post n. 8. *paniculatum* Desr. 18. M. caule ramoso, foliis oblongis dentatis canescentibus, dentibus calycis subdenis erectis. *German. Hungar.* (M. remotum Kit.) Reichenb. ic. t. 300.

† *mollissimum* Don. 19. M. caule ramoso, foliis ovalibus obtusis crenatis utrinque sericeo-lanatis, dentibus denis brevissimis, alternis minoribus, galea corollae villosissima, genitalibus exsertis. *Nepal.*

pag. 741.

Ad *Phlomida.*

Post n. 9. *Bruguierii* Desf. 24. Phl. suffruticosa tomentosa, foliis ovato-oblongis subcrenatis, verticillis contiguis, bracteis laciniisque calycis elongatis dense tomentosis. *Persia.*

pag. 742.

Ad *Leucada* R. Br.

Post n. 2. *helianthemifolia* Desf. 18. L. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis integerrimis subtus revolutis tomentosis, verticillis approximatis terminalibus. *Ind. or.* Mém. du mus. 11. t. 1.

pag. 743.

Ad L. *cephaloten* * (L. capitata Desf.)

Post n. 11. *lamiifolia* Desf. 19. L. caule rufo-villoso, foliis breviter petiolatis cordato-ovatis crenatis supra rufo-sericeis subtus stellato-villosis, verticillis terminalibus, dentibus calycis subulatis elongatis. *Ind. or.*

† *marrubioides* Desf. 20. L. foliis ovato-oblongis crenatis cauleque pubescentibus, verticillis multifloris, bracteis linearibus. *Ceilon.*

*lanceaefolia* Desf. 21. L. foliis oppositis lanceolatis integerrimis venosis subtus canescentibus, verticillis densifloris, dentibus calycis abbreviatis. *Ind. or.*

*ternifolia* Desf. 22. L. foliis ternis subsessilibus lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, verticillis approximatis terminalibus. *Ind. or.*

pag. 744.

Ad L. *bifloram* R. Br. L. *procumbens* Desf. e *Bengal.*

pag. 748

Ad *Verbenam.*

Post n. 13. *Pseudo-Gervão* Hilar. 46. V. caule suffruticoso, foliis ovato-oblongis acuminatis serratis glabris, spica solitaria laxa, bracteis calyce brevioribus. *Brasil.* Hilar. fl. brasil. t. 40.

*rigida* * 47. V. caule herbaceo simplici, foliis subsessilibus oblongo-lanceolatis grosse dentatis rigidis asperis, cymis terminalibus compositis, laciniis calycis setaceis elongatis. *Rio grande.* Sello.

*megapotamica* * 48. V. caule herbaceo erecto pubescente, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis serratis basi cuneatis glabriusculis, capitulis terminalibus, brac-

teis minutis ciliatis, calyce elongato glabro. *Rio grande*. Sello.

pag. 751.

Ad *Lippiam*.

L. *montevidensis* * (Lantana Selloi Link. et Ott. ic. hort. berol. t. 50.)

pag. 752.

Post n. 17. *megapotamica* * 27. L. capitulis hemisphaericis terminalibus, bracteis late ovatis integerrimis, foliis ovatis serratis subtus ad venas pilosiusculis, caule erecto herbaceo. *Rio grande*. Sello.

*Echinus* * 28. L. capitulis globosis longe pedunculatis, pedunculis hirsutis 2spinosis, bracteis setaceis, calycibus multisetis, foliis ovato-oblongis dentatis cauleque procumbente hirsutissimis. *Brasil.* (Zapania Echinus Mart. nov. act. nat. cur. 11. t. 5.)

pag. 754.

Post *Hebenstreitiam*:

CASSELIA Nees.

*serrata* Nees. 1. C. caule fruticoso erecto ramoso, foliis oblongis grosse serratis. *Brasil.* Mart. nov. act. nat. 11. t. 6.

*integrifolia* Nees. 2. C. caule herbaceo simpliciusculo, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis. *Brasil.* Mart. nov. act. nat. 11. t. 6.

Ad *Tamoneam muticam* Pers. (T. spicata Aubl., Leptocarpus chamaedryfolius Link.)

pag. 758.

Ad *Clerodendron*.

Post n. 9. *macrophyllum* Sims. 35. Cl. foliis oppositis subsessilibus late ovatis acuminatis serratis subtus tomentosis, floribus paniculatis. *Ins. Mascaren.* Bot. mag. 2536.

pag. 760.

Post n. 30. *lividum* Lindl. 36. Cl. foliis oblongis repando-crenatis utrinque lividis, costa subtus petiolisque hirsutis, cymis pedunculatis axillaribus, calycibus pentagonis inflatis coloratis. *China*. Bot. reg. 945.

pag. 761.

Ad *Petream oblongam* * (P. racemosa Mart. in nov. act. cur. 11. p. 72.)

Post *Petream*:

## ASAPHES *.

*nepalensis* * *Nepal.* Herba erecta villosa, foliis oppositis oblongis obtusis integerrimis basi vaginantibus, floribus verticillatis rubris. (Morina persica Don.)

### pag. 769.

Ad *Linderniam*.

† *micrantha* Don. 3. L. caule erecto simplici glabro, foliis linearibus obtusis integerrimis, pedunculis capillaribus 1floris. *Nepal.*

### pag. 771.

Ad *Conobeam* Aubl.

*punctata* Mart. 5. C. caule basi radicante ascendente, foliis ovatis acutis serratis punctatis supra scabris, floribus axillaribus geminis brevissime pedunculatis. *Brasil.*

Ad *Rhinanthum orientalem*. (Rh. bifidus Don.) *Nepal.*

### pag. 772.

*Alectorolophus hirsutus* Allion. differt omnino calycibus hirsutis, maxime vero seminibus solidis haud marginatis.

### pag. 773.

Post *Bartsiam*:

## CAMPYLEIA Thuars.

*coccinea* Hook. *Ins. Mascaren.* Herba parasitica scabra simplex, foliis linearibus rigidis, floribus axillaribus sessilibus coccineis. Hook. exot. fl. t. 203.

### pag. 774.

*Castilleia pallida* * dilabitur in duas species:

*septentrionalis* Lindl. C. glabra, foliis lineari-lanceolatis integerrimis 3nerviis, spica paniculata, calyce piloso. *Labrador.* (Bartsia pallida Mx.)

*sibirica* Lindl. C. tomentosa, foliis radicalibus linearibus acuminatis, superioribus ovato-lanceolatis 3nerviis, spica simplici, calyce villoso. *Sibir.* (Bartsia pallida L.) Cf. Bot. reg. 925.

### pag. 776.

Ad *Euphrasiam*,

Post n. 20. *simplex* Don. 32. E. caule stricto simplici, foliis petiolatis scabris, calycibus acutis pilosis, labio infer. corollae maximo. *Nepal.*

pag. 777.

*Ad Pedicularem.*

P. *longiflora* Rudolph. (P. tubiflora Fisch. Stev., siphonantha Don.) Habitat in *Imao* et *Emodis*.

*teucriifolia* M. B. Stev. 58. P. galea falcata acuminata corollam claudente, calyce inaequaliter bifido, floribus congestis longe bracteatis, foliis oblongis duplicato-serratis utrinque tomentosis. *Ins. Curil.* Mém. de Mosc. 6. t. 10. f. 1.

pag. 778.

Post n. 5. *brevifolia* Don. 59. P. galea porrecta rostrata emarginata labium inferius longe superante, calyce inaequaliter 5fido serrato, floribus verticillato-spicatis, foliis oppositis vel quaternis pinnatifidis cauleque villosis. *Emodi montes.*

Post n. 9. *proboscidea* Stev. 60. P. galea ovata acuminata margine villosa, calyce campanulato 2labiato 5dentato, spica elongata, foliis pinnatifidis argute serratis. *Sibir.*

*macrantha* * 61. P. galea falcata acuta subhorizontali labium inferius aequante, calycibus obtusis bracteatis, floribus remotiusculis, foliis 3pinnatifidis glabris. *Davuria.* (P. grandiflora Fisch. Stev.)

P. *compacta* W. calycem potius habet 5dentatum subinflatum (haud obtusum).

P. *Romanzovii* Chamiss. galeam potius habet porrectam quam abbreviatam, folia quaterna. Habitat et in *insul. Aleut.* (P. Chamissonis Stev. mém. de Mosc. 6. t. 4.)

Post n. 13. *nasuta* M. B. Stev. 62. P. galea arcuata brevissime rostrata emarginato-2dentata, calyce pubescente 5fido, floribus congesto-spicatis, foliis 2pinnatifidis, caule subaphyllo. *Ins. Curil.*

pag. 779.

Ad P. *euphrasioidem* Steph. pertinere P. *ramosam* Wormsk. Stev. mém. de Mosc. 6. p. 42.

*adunca* M. B. Stev. 63. P. galea falcata obtusiuscula basi 2dentata hiante, calyce foliaceo serrulato, floribus terminalibus congestis, foliis alternis 2pinnatifidis. *Sibir. Camschatca.* Mém. de Mosc. 6. t. 5. f. 2.

*macrodon* Richardf. 64. P. galea obtusissima ad faucem 2dentata, calyce 2lobo dentato, floribus axillaribus sessilibus, foliis pinnatifidis crenulatis. *Ad sinum Hudson.*

Post n. 26. *Wlassoviana* Stev. 65. P. galea obtusissima infra medium subbidentata, calyce subserrato, floribus solitariis axillaribus bracteatis, foliis alternis pinnatifidis. *Sibir.* Mém. de Mosc. 6. t. 9.

pag. 780.

P. *alopecuroides* Adam., haud Stev. (P. Langsdorffii Stev. mém. de Mosc. 6. t. 9. f. 2.) Male galea dicitur edentula, ipso pictore dentes delineante.

Ad P. *comosam* pertinere P. rubentem Steph., achillaeifoliam Ej. et fasciculatam Bellard. Steven.
In charactere P. *caucasicae* M. B. deleatur (calycibus) *subulatis*.

pag. 781.

Post n. 45. *amoena* Adam. 66. P. galea recta obtusa lobis labii infer. breviore, calyce 5fido, verticillis paucifloris remotis, foliis quaternis pinnatifidis, laciniis distantibus linearibus serratis. *Sibir. Camtschatca.* Mém. de Mosc. 6. t. 7.

pag. 788.

*Digitalis micrantha* Roth. ad *sinum neapolitanum* lecta, D. *australis* nomine a Tenorio missa.

pag. 797.

*Linaria aphylla* * del. quae *Utricularia capensis*, v. supra p. 16.

pag. 799.

*Mimulus pilosiusculus* Kunth. (M. parviflorus Lindl. in bot. reg. 874.) *Chili.*

pag. 800.

Ad *Toreniam.*

*diffusa* Don. 6. T. caule diffuso pilosiusculo, foliis ovatis acutis serratis asperis, floribus terminalibus solitariis breviter pedunculatis, calyce spathaceo 3fido 5alato. *Nepal.*

Ad *Vandelliam.*

*nummularifolia* Don. 3. V. caule simplicissimo 4gono, foliis sessilibus cordato-subrotundis serratis, pedunculis folio brevioribus, laciniis calycis linearibus acutis. *Nepal.*

pag. 801.

Ad *Herpestim* Gärtn.

*connata* * 17. H. caule erecto ramoso foliisque connatis ovatis crenulatis nervosis glabris, floribus alternis sessilibus 3bracteatis. *Nepal.* (Cybbanthera connata Hamilt. Don.)

pag. 802.

Post n. 10. *glechomoides* * 18. H. caule herbaceo ascendente, foliis obovatis crenatis glabriusculis, pedunculis axillaribus oppositis, calycibus pilosissimis. *Itio grande.* Sello.

pag. 803.

Ad *Mazum* Lour.

*surculosus* Don. 3. M. acaulis hirsutus, surculis procumbentibus, foliis longe petiolatis cuneatis dentatis basi sinuatis pilosis, racemis rar... alibus pilosis, laciniis calycis rotundatis. *Nepal.*

pag. 804.

Ad *Centrantheram* R. Br.

C. *nepalensis* Don. eadem cum C. *hispida* R. Br.

Ad *Büchneram*.

Post n. 3. *hispida* Hamilt. 33. B. simplicissima hispida, foliis radicalibus spathulatis integerrimis 3nerviis, caulinis lanceolatis obtusis, floribus alternis, bracteis acuminatis calycem subaequantibus. *Nepal.*

*cruciata* Hamilt. 34. B. simplex scabra, foliis radicalibus obovatis dentatis 3nerviis, caulinis lineari-lanceolatis integerrimis, spica abbreviata 4fariam imbricata, bracteis lanceolatis calycem aequantibus. *Nepal.*

*angustifolia* Don. 35. B. simplex scabra, foliis linearibus integerrimis, inferioribus oppositis, floribus alternis remotis, bracteis flores superantibus. *Nepal.*

pag. 810.

Post *Scymeriam* Pursh.:

SOPUBIA Hamilt.

*trifida* Hamilt. *Nepal.* Herba aspera, foliis oppositis linearibus angustissimis sub-3fidis, floribus pedunculatis purpureis.

Ad *Angeloniam* Humb.

A. *salicariaefolia* Humb. (A. campestris Nees.) *Brasil.*

*procumbens* Mart. 2. A. foliis elliptico-lanceolatis argute serratis basi ciliatis, pedunculis axillaribus folio brevioribus, caule procumbente. *Brasil.* (Physidium procumbens Schrad., Schelveria arguta Nees.)

*integerrima* * 3. A. foliis sparsis lanceolatis integerrimis, pedunculis racemosis, caule erecto. *Rio grande.* Sello.

Ad *Stemodiam*.

Post n. 2. *muraria* Roxb. Don. 14. St. hirsutissima, foliis petiolatis ovatis acutis serratis, pedunculis solitariis, laciniis calycis ovatis mucronatis, corolla villosa. *Nepal.*

*grandiflora* Hamilt. Don. 15. St. hirsutissima viscosa, foliis petiolatis ovatis acutis grosse serratis, floribus oppositis breviter pedunculatis, bracteis maximis ovatis crenatis, laciniis calycis rotundatis. *Nepal.*

pag. 813.

Ad *Chelonem*.

Post n. 10. *alpina* * 17. Ch. glaberrima, foliis oblongo-lanceolatis denticulatis, pedunculis multifloris, corolla subregulari, antheris hirsutis. *Montes scopulosi Amer. bor.* (Pentstemon Torr.)

Post n. 13. *Digitalis* * 18. Ch. caule elato stricto, foliis amplexicaulibus lanceolatis acutis serratis glabris, panicula terminali trichotoma multiflora, corolla glanduloso-pubescente. *Ditio Arcansa Amer. bor.* (Pentstemon Nuttall. Bot. mag. 2587.)

pag. 814.

Ad *Caprariam.*

Post n. 6. *pusilla* Torr. 7. C. pubescens subramosa, foliis oppositis petiolatis cordatis repando-dentatis, pedunculis axillaribus elongatis 1floris. *Montes scopulosi Amer. bor.*

pag. 815.

*Sibthorpia* hinc exul, jam supra p. 63. melius collocata.

pag. 821.

Ad *Ruelliam.*

Post n. 18. *curviflora* Nees. 81. R. caule fruticoso glabro, foliis petiolatis lanceolatis acutis venoso-lineatis integerrimis, pedunculis terminalibus elongatis sub-1floris, laciniis calycis linearibus ciliatis, corolla ringente. *Brasil.*

pag. 823.

Post n. 48. *anisophylla* Wallich. 82. R. caule erecto herbaceo, foliis alternis oblongo-lanceolatis acuminatis elongatis serratis, stipulis oppositifoliis linearibus integerrimis stipitatis, pedunculis sub-3floris. *Nepal.* Hook. exot. fl. t. 191.

pag. 824.

Post n. 52. *persicifolia* Lindl. 83. R. caule herbaceo glabro nodoso, foliis lanceolatis acuminatis elongatis serratis venosis laevibus, pedunculis basilaribus corymbiferis erectis, corollae limbo 5lobo. *Bengal* Bot. reg. 955.

Post n. 60. *capitata* Don. 84. R. caule fruticoso ramoso, foliis lanceolatis acuminatis denticulatis utrinque pilosiusculis, spicis capitatis, bracteis calycibusque obtusis. *Nepal.*

pag. 825.

Post n. 70. *rotundifolia* Don. 85. R. caule erecto ramoso pubescente, foliis subrotundo-ovatis acutiusculis crenatis, spica abbreviata, bracteis acuminatis, intermediis latissimis flore brevioribus. *Nepal.*

pag. 826.

Ad *Aphelandram* R. Br.

A. *nitida* Nees. nov. act. nat. cur. 11. p. 51. varietas levis A. *cristatae.*

*marginata* Nees. 2. A. fruticosa glabra, foliis oblongis retusis margine cartilagineo-ciliatis, spica terminali, bracteis ovato-lanceolatis calyce brevioribus corollaque pubescentibus. *Brasil.*

Ad *Aetheilema* R. Br.

*longifolium* * 4. Ae. caule erecto, foliis oblongis acuminatis integerrimis reflexis, spicis axillaribus abbreviatis. *Senegambia.* (Phaylopsis longifolia Bot. mag. 2433.)

pag. 827.

Ad *Lepidagathidem* W.

*incurva* Hamilt. 3. L. caule herbaceo erecto foliisque integerrimis acutis asperis, inferioribus ovato-oblongis, superioribus lanceolatis elongatis, spicis terminalibus subquaternis densis secundis, bracteis ovato-lanceolatis mucronatis villosissimis, corollis incurvis. *Nepal.*

pag. 828.

Ad *Hygrophilam* R. Br.

*brasiliensis* * 4. H. fruticosa hirsuta, foliis oblongis integerrimis, altero minori, spicis terminalibus secundis villosis, bracteis dorsalibus ovatis cuspidatis trinerviis. *Brasil.* (Dicliptera tetrandra Nees.)

Ad *Thunbergiam.*

*coccinea* Wallich. 4. Th. volubilis glabra, foliis subhastato-cordatis acuminatis *5nerviis, inferioribus repandis*, racemis pendulis, bracteis integerrimis caducis. *Bengal.* Hook. exot. fl. t. 195.

*alata* Hook. 5. Th. volubilis villoso-sericea, foliis sagittato-cordatis repandis, petiolis marginatis, pedunculis 1floris, bracteis calyce majoribus. *Afric. or.* 5-6° lat. austr. Hook. exot. fl. t. 177.

*angulata* Hook. 6. Th. scandens glabra, foliis subhastato-cordatis basi angulatis, petiolis teretibus, pedunculis 1floris, bracteis ciliatis. *Madagascar.* Hook. exot. fl. t. 166.

pag. 829.

Ad *Bignoniam.*

Post n. 3. *pallida* Lindl. 70. B. arborescens, foliis oppositis ovali-oblongis utrinque rotundatis glabris subtus reticulatis, pedunculis axillaribus solitariis erectis subbifloris lepidotis. *Ins. Carib.* Bot. reg. 965.

pag. 832.

Post n. 61. *megapotamica* * 71. B. foliis quinatis glabris, foliolis petiolatis obovato-oblongis integerrimis, pedunculis 2fidis axillaribus cymosis, calycibus 5dentatis, corolla pubescente. *Rio grande.* Sello.

pag. 835.

Ad *Spathodeam* P. B.

Post n. 5. *montana* * 14. Sp. arborescens, foliis quinato-digitatis lanceolatis subtus ramisque 4gonis lepidotis, panicula terminali fulvo-farinacea. *Brasil.* (Zeyheria montana Mart. nov. gen. t. 159.)

pag. 836.

Ad *Eccremocarpum scabrum* R. et P. Bot. reg. 939.
*Incarvillea parasitica* Roxb. est Aeschynanthus Jack.

pag. 837.

Ad *Martyniam*.

*lutea* Lindl. 6. M. caule annuo tereti glanduloso-pilose, foliis cordato-orbiculatis dentatis, calyce 2bracteato, fructibus longe rostratis. *Brasil.* Bot. reg. 934.

*spathacea* * 7. M. caule perenni herbaceo viscoso-villoso, foliis cordato-deltoideis acutiusculis angulato-dentatis, floribus racemosis, calyce 1bracteato infra fisso campanulato. *Brasil.* (Craniolaria 1bracteata Nees et Mart. in nov. act. nat. cur. 11. t. 4. Holoregmia viscida Nees.)

*Didymocarpus* Jack., exul, jam supra p. 13. 14. sub *Henckelia* * militat.

pag. 838.

Ad *Aeschynanthum* Jack.

*grandiflorus* * 3. Ae. caule fruticoso, foliis lanceolatis carnosis enerviis, umbella multiflora, stylo exserto. *Ad arbores, Bengal.* (Incarvillea parasitica Roxb., Trichosporum grandiflorum Don.)

*parviflorus* * 4. Ae. caule fruticoso, foliis ellipticis acuminatis nervosis, umbella pauciflora, stylo incluso. *Ad truncos arborum, Nepal.* (Trichosporum parviflorum Don.)

pag. 839.

Ad *Gesneram*.

Post n. 18. *barbata* Mart. 27. G. herbacea, foliis oppositis oblongis acuminatis petiolatis subcrenatis subtus scabris, pedunculis subsolitariis, corolla extus villosa. *Brasil.*

pag. 840.

Ad *Besleriam*.

Post n. 6. *flavo-virens* Mart. 20. B. fruticosa, foliis oppositis oblongis utrinque attenuatis denticulatis glabris, pedunculis axillaribus confertis bifido-cymosis. *Brasil.*

pag. 841.

*Parentucelliam floribundam* Viv. libyc. t. 21. f. 2. esse Bartsiam latifoliam Sm. p. 773. asseverant R. Brownius et Meratus. (Bulletin des scienc. nat. 1825. Febr. p. 225.)

## SINNINGIA Nees.

*Helleri* Nees. *Brasil.* Planta suffruticosa, foliis petiolatis oppositis cordato-ovatis serratis pubescentibus, floribus racemosis viridi-flavicantibus. Annal. des scienc. nat. 6. p. 297., Gloxinia Schottii Mikan. del. brasil. fasc. 4.)

pag. 843.

Post *Linnaeam*:

ABELIA R. Br.

*chinensis* R. Br. *China.* Frutex decumbens, ramis virgatis, foliis oppositis petiolatis ovatis acutiusculis crenato-serratis, floribus thyrsoideis involucratis. Abel's journ. in China, p. 377.

pag. 844.

Ad *Gloxiniam* Herit.

*macrophylla* Mart. 3. Gl. subacaulis, foliis sessilibus cordato-oblongis obtusis crenatis utrinque hirsutis, calycibus acutis, limbi corollae lobis retusis. *Brasil.* (Gl. hirsuta Lindl. in bot. reg. 1004.)

---

# CLASSIS XV.

pag. 848.

Ad *Eutrema* R. Br. add. Septum apice fenestratum vel obsoletum.

Post id: *Oreas* Chamiss. Silicula lanceolata compressa plana 1locularis. Semina plura funiculis elongatis pendula. Cotyledones incumbentes.

Ad *Brayam* Sternb. Cotyledones incumbentes R. Br. Hook.

Post eam: *Platypetalum* R. Br. Silicula ovalis polysperma, valvis convexis. Cotyledones incumbentes. Stylus brevissimus. Calyx subpatens. Petalorum laminae dilatatae.

Post n. 2313. *Oudneya* R. Br. Cal. clausus basi saccatus. Stigmata connata, apicibus distinctis. Siliqua linearis rostrata, valvis 1nerviis. Semina 1seriata.

---

pag. 855.

Ad *Raphanum Raphanistrum*. R. fugax Presl. var.

*albiflorus* Presl. 8. R. siliquis 1locularibus 1-3spermis stylo brevioribus, foliis simpliciter lyratis, radice bienni. *Sicil.*

pag. 858.

Ad *Biscutellam raphanifoliam* Poir. B. laxiflora Presl.

pag. 862.

Ad *Alyssum maritimum* Lam. (Lobularia Desv., Koniga R. Br. in Denham. et Clappert. it. p. 214.)

† *arenarium* Presl. 43. A. caule suffruticoso procumbente, foliis lineari-lanceolatis acutis subincanis, siliculis ellipticis subinflatis pilosiusculis 1-spermis stylo brevi mucronatis. *Sicil.*

pag. 863.

Ad *Hutchinsiam rotundifoliam* R. Br. (H. pygmaea Viv.)

pag. 864.

Ad *Iberidem semperflorentem.* (I. humilis Presl.)

pag. 865.

Ad *Iberim linifoliam.* (I. tenuifolia Presl.)

pag. 866.

Ad *Lepidium suffruticosum.* (L. lanceolatum Presl.)

pag. 867.

Ad *Lepidium hirtum* Hook. (Lepia Bonanniana Presl.)

pag. 868.

Ad *Lepidium Piscidium* Forst. (L. owaihiense Chamiss.)

pag. 869.

Post n. 48. *humifusum* Requien. 51. L. caule prostrato superne pubescente, foliis inferioribus lyratis, superioribus sagittatis integerrimis, petalis calycem triplo superantibus, siliculis glabris. *Corsica.*

pag. 871.

Ad *Farsetiam parviflorum* * (Cotyledones conduplicatae. R. Brown ad Denham. it. p. 213.) Cf. Linn. philos. bot. §. 170.

Ad *Farsetiam libycam* * (Koniga R. Brown ad Denham. it. p. 214.)

pag. 872.

Ad *Drabam.*

Post n. 5. *Sauteri* Hopp. 56. Dr. foliis spathulatis rigidis ciliatis, scapo glabro, staminibus corolla brevioribus, siliculis ovalibus glabris stylo brevi coronatis. *Alp. noric.*

pag. 874.

Ad Dr. *Wahlenbergii* Hartm. Dr. laevigata Hopp. Koch. var.

Dr. *stellata* Jacqu. mutetur in Dr. *frigidam* Saut. Synonyma omnia deleantur: sola apposita Dr. *carinthiaca* Hopp. Koch. Siliculae sunt astylae. Omnis haec species varietas est Dr. *hirtae* L., quod optime jam monuit Wahlenb. fl. lappon. p. 175.

*austriaca* Crantz. 57. Dr. foliis obovatis 2dentatis stellato-pubescentibus, scapo 1phyllo, siliculis patulis glabris stylo coronatis. *Austria.* (Dr. stellata et hirta Jacqu., saxatilis Koch.)

[Nec Drabam laevigatam, nec Redowskiam sophiaefoliam Chamiss. et Schlechtend. in Linnaea, 1. p. 25. 33., utpote magnopere dubias, recipere ausim.]

pag. 878.

Ad *Thlaspi montanum* L. Thl. scapiflorum Viv. var.

Ad Thl. *alpestre* L. (Thl. rivale Presl.)

## Classis XV.

pag. 880.

Post *Eutrema* R. Br.:

### Oreas Chamiss.

*involucrata* Chamiss. *Ins. Aleut.* Herba perennia, foliis longe petiolatis erectis spathulatis glabris, scapo folia subsuperante, floribus subracemosis bracteatis albis.

pag. 881.

Post *Brayam:*

### Platypetalum R. Br.

*purpurascens* R. Br. *Ins. Melvill.* Herba simplex, foliis spathulatis succulentis glabriusculis, floribus corymbosis purpurascentibus.

Ad *Nasturtium* R. Br.

*heterophyllum* Don. 28. N. caule erecto ramoso foliisque denticulatis glabris, inferioribus lyratis, superioribus ellipticis, corymbis multifloris, siliquis teretibus pedicellos superantibus. *Nepal.*

pag. 882.

Ad N. *diffusum* Cand. (N. heterophyllum Blum.)
Ad N. *micranthum* Cand. (N. sparsum Don.)

pag. 884.

Ad *Pteronevron* Cand.

Pt. *carnosum* Cand. cum *Cardamine glauca* * Syst. 2. p. 888. jungit Treviranus in nov. act. nat. cur. 18. p. 191.

*decurrens* Blum. 3. Pt. foliis pinnatis, foliolis ovatis repando-dentatis subciliatis basi decurrentibus. *Java.*

*javanicum* Blum. 4. Pt. foliis ternatis, foliolis ovato-oblongis inciso-dentatis, lateralibus basi inaequalibus. *Java.*

pag. 886.

Ad *Cardaminem.*

C. *resedaefolia* L. (C. debilis Don.) *Nepal.*

Post n. 13. *Nasturtii* * 43. C. caule procumbente ramoso foliisque glabris, inferioribus ternatis, foliolo impari maximo subrotundo obsolete 3lobo, superioribus simplicibus obovatis 3lobis. *Nepal.* (C. nasturtioides Don.)

In C. *Bocconi* Viv. fuscipienda magnopere haereo. Nasturtium enim rotundo thalictri folio Bocc. mus. t. 116. (non 118.) satis bene C. thalictroidem Allion. refert, neque siliquas deflexas habet, quas Vivianius indicat.

pag. 887.

Post n. 27. *flaccida* Chamiss. 44. C. caule prostrato ramoso, sarmentis radicantibus, foliis pinnatis sparse hirsutiusculis, foliolis petiolatis angulato-dentatis, pedicellis subpatulis, inferioribus bracteatis, siliquis erectis. *Chili.*

*maritima* Portenschl. 45. C. caule diffuso foliisque pinnatis subcarnosis viridibus glabris, foliolis petiolatis obovatis 3lobis, siliquis lanceolatis stylo tereti coronatis. *Dalmatia.* Treviranus in nov. act. nat. cur. 18. p. 190.

Post n. 33. †*polyphylla* Don. 46. C. foliis pinnatis subtus cauleque erecto simplici pilosiusculis, foliolis opposītis lanceolatis obtuse serratis mucronulatis, racemo multifloro pubescente. *Nepal.*

†*purpurea* Chamiss. 47. C. foliis pinnatis cauleque erecto paucifoliis parce hirsutiusculis, foliolis subrotundis, impari maximo sub-3lobo, floribus racemosis, siliquis stylo coronatis. *Asia arctica versus Cacciam.*

pag. 888.

C. *glauca* * v. supra ad *Pteroneuron.*

pag. 889.

Ad *Arabim.*

A. *ciliata* R. Br. (A. madonia Presl.)

pag. 891.

Post n. 26. *owaihensis* Chamiss. 51. A. foliis repando-dentatis scabriusculis, radicalibus petiolatis lyrato-pinnatis sub-3jugis, caulinis subnullis, caule ascendente glabro a basi fere florifero, siliquis erecto-patentibus pedicellos triplo superantibus. *Ins. Sandwich.*

pag. 892.

A. *Thaliana* L. (Sisymbrium Thalianum Monnard. Gay.) Cotyledones incumbentes.

pag. 893.

Post n. 49. *longisiliqua* Presl. 52. A. caule simplicissimo foliisque pube furcata subcanescentibus, radicalibus oblongo-lanceolatis dentatis, caulinis ovato-lanceolatis integerrimis, pedicellis erecto-appressis siliqua multo brevioribus. *Sicilia.* Flores purpurascentes. A. purpurascens Presl. var.

Post *Arabim:*

## OUDNEYA R. Br.

*africana* R. Br. *Numidia* et *Afric. med.* Planta suffruticosa ramosissima glaberrima, foliis sessilibus oblongo-linearibus obtusis integerrimis, floribus racemosis purpureis. (Hesperis nitens Viv. libyc. t. 5. f. 2 Syst. 2. p. 900.)

pag. 895.

*Cheiranthus ochroleucus* Hall. fil. melius *Erysimum* ochroleucum Cand. Monnard.

pag. 896.

Ad *Matthiolam* R. Br.

Post n. 3. *patens* Presl. 22. M. caule herbaceo diffuso ramoso foliisque lanceolatis integerrimis stellato-tomentosis, siliquis teretibus patentibus muricato-glandulosis tomentosis. *Sicil.*

pag. 899.

*Malcolmia* R. Br. Licet ipse stator hujus generis (hort. kew. 4. p. 121.) Malcomiam scribat, quod omnes repetunt, credo tamen sphalma subesse, simile *Moenchiae* et *Mathiolae*. Gul. *Malcolm* hortulanus fuit Londinensis 1771, cujus indices exstant.

pag. 900.

*Hesperis nitens* Viv. exsul supra jam *Oudneya* R. Br. dicta.

pag. 903.

*Sisymbrium pannonicum* Jacqu. in agro Francofurtensi ad Viadrum invenit Steinkopf.

pag. 905.

Ad *Erysimum helveticum* Cand. (E. Bonannianum Presl.)
Ad E. *canescens* Roth. (E. crassistylum Presl.)

pag. 906.

Ad *Erysimum hieracifolium*. E. *Marschallianum* Andrz. varietas memorabilis.

*robustum* Don. 37. E. caule stricto angulato foliisque lanceolatis mucronatis dentatis utrinque subsericeis, siliquis ascendentibus pubescentibus pedicellos multo superantibus. *Emodi montes.*

*violaceum* Don. 38. E. caule stricto simplicissimo foliisque sagittato-lanceolatis acutis denticulatis pilosis, racemo congesto, siliquis patulis. *Emodi montes.* Flores purpurei.

pag. 907.

*Erysimum asperum* Cand. melius *Cheiranthus asper* Nuttall.
Ad E. *cuspidatum* Cand. E. glabrum Presl. sic. Sinapis tetraëdra Presl. del. prag.)

*Maclovianum* Gay. 39. E. foliis lanceolatis denticulatis glaucis apice barbatis, calycibus deciduis, siliquis glaberrimis stylo multo longioribus. *Ins. Falkland.* (Brassica magellanica Gaudich., macloviana Urv.)

pag. 910.

Ad *Brassicam*.

Post n. 8. *villosa* Biron. 34. Br. suffruticosa villosa, foliis omnibus petiolatis lyratis dentatis, floribus paniculatis, laciniis calycis erectis, siliquis sub-4gonis. *Sicil.*

pag. 911.

Post n. 25. *rectangularis* Viv. 35. Br. glabra, foliis rectangulo-pinnatis, foliolis sessilibus lineari-lanceolatis profunde serratis, extimis confluentibus, rostro siliquam glabram aequante. *Corsica.*

O 4

pag. 912.

Ad *Sinapim laevigatam.* (Sinapis virgata Presl. delic. prag., Erucastrum virgatum et oleraceum Presl. fic.)

*panormitana* * 27. S. filiquis glabris torofis appreffis roftro longioribus, caule fubramofo bafi hifpido, foliis petiolatis lanceolatis denticulatis fcabris. *Ad Panormum Sicil.* (Hirfchfeldia integrifolia Presl.)

pag. 913.

Ad *Sinapim albam* L. (Bonannia officinalis Presl.)
Ad S. *disfectam* Lag. (Bonannia disfecta Presl.)
Ad S. *heterophyllam* Lag. (Hirfchfeldia inflexa Presl.)

pag. 918.

Ad *Heliophilam.*

Poft n. 29. *ftricta* Sims. 35. H. foliis hirfutis, inferioribus lanceolatis pinnatifidis, fuperioribus linearibus integerrimis, filiquis ftrictis mucronatis pubefcentibus. *Afric. auftr.* Bot. mag. 2526.

AD

# VOLUMEN III.

# CLASSIS XVI.

pag. 3.

## DIANDRIA.

*Crenias* *. Cal. 0. Cor. 0. Spatha fiſſa. Stamina 3, baſi connata, lateralia ſterilia, medium bifidum, cruribus 2antheriferis. Stigmata 3. Capſ. 2locularis 2valvis.

Ad **Momordicam** 1. Antherae flexuoſae didymae.

pag. 4.

Poſt n. 2346. *Salomonia* Lour. huc e ſyſt. 1. p. 5. n. 26. Cal. 5fidus, laciniis aequalibus. Petalum 3lobum, lobis lateralibus falcatis, intermedio cucullato genitalia includente. Filamenta in vaginam ſtyli coalita. Antherae 4 1loculares, circa ſtigma conglutinatae. Capſ. 2locularis, loculis 1ſpermis. *Polygaleae*.

pag. 5.

Poſt n. 2369. *Aglaia* Lour. Flores polygami. Cal. 5dentatus. Petala 5 in globum conniventia. Stam. 5 in urceolum connata intus antherifera. Bacca exſucca 1-2ſperma. *Aurantia*.

pag. 6.

Poſt n. 2373. *Gynoſtemma* Blum. Flores dioeci. Cal. 10ſepalus, duplici ſerie. Cor. 0. Antherae 2loculares. Stigmata 3, 4. Drupa baccata globoſa 3-4ſperma. *Meniſpermeae*.

Poſt n. 2376. *Euphronia* Mart. Cal. inferus 5partitus perſiſtens. Filamenta baſi complanata. Cor. 0? Capſ. 3locularis 3valvis, ſeminibus ſolitariis.

## HEXANDRIA.

*Aphanamixis* Blum. Cal. 5ſepalus imbricatus. Pet. 3. Stamina in globum connata. Antherae 3gonae. Stigma ſimplex. Capſ. 2-3locularis. Sem. ſolitaria axillata. *Melieae*.

*Schizochiton* * (Chiſocheton Blum.) Cal. urceolatus ſubintegerrimus. Pet. 4 linearia. Tubus conicus 6fidus intus antherifer. Capſ. 2-3locularis. Sem. ſolitaria arillata. *Melieae*.

Poſt n. 2383. *Cytinus* huc e ſyſt. 2. p. 171. Flores monoeci. Cal. corollinus tubuloſus 4lobus 2ſquamatus. Columna

solida antherifera. Stigma capitatum sulcatum. Caps. 8locularis polysperma. Hook. exot. fl. t. 153.

pag. 7.

*Trichiliae* capsula est 3-4locularis.

*Didymochiton* Blum. Cal. 5sepalus imbricatus. Pet. 5 cum tubo staminifero arcte connata. Stigma capitatum. Bacca corticata, abortu 2-3locularis. Sem. solitaria exarillata. *Meliceae.*

pag. 8.

Post n. 2401. *Parkia* R. Br. Cal. tubulosus 5. Petala 5 inaequalia. Legumen in loculos transversos farina farctos divisum.

*Amaria* Seb. Mut. Cal. cylindricus 5fidus latere dehiscens. Pet. 5 obovata patentia carinata. Stamina 10 in tubum coalita. Stylus filiformis, stigmate capitato. Legumen pedicellatum longissimum 2valve, polyspermum.

*Schotia* Jacqu. Cal. 5partitus coloratus. Pet. 5 unguiculata. Stam. basi in tubum coalita. Germen pedicellatum. Legumen 2-4spermum. Sem. basi arillata.

Post n. 2407. *Amphinomia* Cand. Cal. ventricosus persistens 5fidus. Pet. 5 spathulata unguiculata. Stylus 1 lateralis. Fructus leguminosus 2valvis polyspermus.

*Omphalobium* Gärtn. Cal. 5partitus persistens. Pet. 5 unguiculata. Stam. basi subcoalita. Caps. leguminosa sub-1sperma. Sem. ad suturam fixa basi arillata. (*Connarus* proximus habet stylos plures, folliculos vix dehiscentes, sem. basi fixa arillata.)

pag. 12.

Post n. 2465. *Calpandria* Blum. Cal. 4sepalus inaequalis persistens. Pet. 4. Filamenta infer. distincta, summa in tubum cylindricum intus antheriferum coalita. Stigma semi-3fidum. Caps. lignosa 3locularis, valvis septiferis. Sem. solitaria. *Melicae.*

*Sphaerostema* Blum. Flores dioeci. Cal. 3sepalus bracteatus. Petala sub-9, triplici serie disposita. Stamina disco globoso imposita, filamentis connatis. Baccae spicatae distantes 2spermae. *Anoneae.*

Post n. 2471. *Cordyla* Lour. Cal. inferus campanulatus 4fidus. Cor. 0. Filamenta basi in orbem coalita. Bacca pedicellata 1locularis 6sperma. *Leguminosis aff.*

---

pag. 14.

# DIANDRIA.

## CRENIAS *.

*Scopulorum* * *Ad scopulos scaturiginum Brasil.* Plantula submersa caespitosa erecta ramosa foliosa, foliis imbrica-

tis amplexicaulibus, fubfemiorbicularibus bilobis denticulatis. (Mniopfis featuriginum Mart.) Linnaeus *Mniopfis* nomen genericum reprehenfurus fuiffet: phil. bot. §. 225. 227.

pag. 16.

n. 26. *ilicifolia* 1. filifolia.

pag. 19.

Ad *Bradleiam* Gärtn.

Br. *philippica* Cav. Br. zeylanica Labill. nov. Caled. t. 76.?

*glauca* Labill. 7. Br. foliis elliptico-oblongis utrinque rotundatis undulato-repandis mucronatis fubtus glaucis, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris. *Nov. Caledon.*

*macrophylla* Labill. 8. Br. foliis late obovato-ellipticis obtufis coriaceis, pedunculis ♀ aggregatis. *Nov. Caledon.*

pag. 25.

Poft *Matthiffoniam* Radd.:

SALOMONIA Lour.

*petiolata* Don. 1. S. foliis petiolatis cordatis acutis integerrimis glabris 3nerviis, alis carinae aequalibus, capfulis truncatis denticulatis, caule diffufe ramofo. *China auftr. Nepal.* (S. cantonienfis Lour., edentula Cand.)

*feffilifolia* Don. 2. S. foliis feffilibus ovalibus mucronulatis, alis carina brevioribus, capfulis lunatis duplici ferie fpinulofo-ciliatis, caule fimplici recto. *Nepal.* (S. oblongifolia Cand.)

pag. 30.

Ad *Vifeniam* Houtt.

Poft n. 8. *Ulmariae* * 19. V. caule virgato, foliis cordato-ovatis acutis dentato-ferratis fupra glabriusculis fubtus pubefcentibus, panicula terminali cymofa. *Rio grande.* (Melochia ulmarioides Hilar.)

*fericea* * 20. V. foliis cordatis inaequaliter ferratis fericeis, panicula terminali. *Brafil.* (Melochia Hilar.)

V. *corchorifolia* * (Melochia corchorifolia L., Riedlea corchorifolia Cand., radiata Blum.)

pag. 31.

Poft n. 18. *graminifolia* * 21. V. foliis linearibus elongatis remote ferratis glabris, panicula terminali, caule fimplici. *Brafil.* (Melochia graminifolia Hilar. fl. brafil. t. 31.)

Ad *Waltheriam.*

W. *corchorifolia* Perf. eft potius fyn. W. *ellipticae* Cav., quam *eriocladae* Cand.)

W. *glabriuscula* Hilar. pertinet ad W. *glabram* Poir. Patria et *Braſil.*

*ferruginea* Hilar. 10. W. arboreſcens, foliis oblongis acutis ſerrulatis *ſupra villoſis ſubtus ferrugineo-tomentoſis*, capitulis axillaribus breviter pedunculatis, petalis calyce brevioribus. *Braſil.*

*cinereſcens* Hilar. 11. W. fruteſcens, foliis ſubimbricatis cordato-ſubrotundis groſſe ſerratis utrinque cinereo-tomentoſis, capitulis terminalibus. *Braſil.*

*viſcoſiſſima* Hilar. 12. W. ſuffruticoſa viſcoſiſſima, foliis ſubcordato-oblongis acuminatis utrinque villoſo-tomentoſis, panicula folioſa, floribus glomeratis. *Braſil.*

*maritima* Hilar. 13. W. ſuffruteſcens, foliis ſubimbricatis ovatis obtuſis inciſo-ſerratis utrinque piloſis glanduloſo-tuberculoſis, capitulis terminalibus. *Braſil.*

*Douradinha* Hilar. 14. W. *ſuffruteſcens*, *foliis cordato-ſubrotundis* obtuſis glaucis utrinque tomentoſis, capitulis terminalibus. *Braſil.* Hilar. pl. uſ. braſ. t. 34.

*lanata* Hilar. 15. W. ſuffruticoſa, foliis ovatis acutiuſculis plicatis inaequaliter ſerratis villoſis, ſuperioribus lanatis incano-glaucis, capitulis terminalibus. *Braſil.*

*gracilis* Hilar. 16. W. ſuffruticoſa, foliis ovatis obtuſis plicatis, inferioribus piloſis, ſuperioribus tomentoſis, capitulis terminalibus. *Braſil.*

*communis* Hilar. 17. W. ſuffruticoſa hirſuta, *foliis ſubcordato-ovatis* obtuſis, capitulis terminalibus. *Braſil.*

pag. 32.

Ad *Erodium.*

E. *Bocconi* Viv. magnopere dubium. Bocconi enim Geranium *minimum muſ.* t. 128. eſt Erodium *chamaedryoides* Herit. Deſcriptio tamen Viviani differt.

pag. 33.

Poſt n. 16. *geoides* Hilar. 43. E. caule herbaceo proſtrato hirſuto, foliis *ternatis*, foliolis *ovatis* lobatis inciſo-dentatis, ſtipulis ovatis cuſpidatis, umbellis paucifloris. *Ad fl. Platam.*

E. *cuneatum* Viv. ad gruinum Ait. pertinere *videtur.*

pag. 34.

Poſt n. 27. *hiſpidum* Presl. 44. E. caule proſtrato retrorſum hiſpido, foliis 2pinnatifidis utrinque incano-pubeſcentibus, laciniis linearibus acutis, ſtipulis ovatis ſcarioſis, pedunculis multifloris, petalis calycem ſubaequantibus. *Sicil.* (Geranium laciniatum Bivon.)

pag. 40.

Ad *Paſſifloram.*

P. *glauca* Ait. (P. amethyſtina Mikan.) *Braſil.*

pag. 41.

Poſt n. 68. *aurantia* Forſt. 85. P. foliis baſi cuneatis bilobis obtuſis glabris, petiolis 2glanduloſis, pedunculis ſolitariis, glandulis ſtipitatis, corona duplici, inter. tubuloſo-conica apice 10dentata. *Nov. Caledon.* (Murucuja Perſ. Syſt. 3. p. 43. Diſemma Labill. nov. Caled. t. 79.)

pag. 43.

*Murucuja aurantia* Perſ. deleatur.

pag. 45.

Ad *Feuillaeam.*

F. *cordifolia* L. foliis cordatis acutis baſi angulatis coriaceis glabris, *paniculis axillaribus, corollae lobis rotundis.*

*tamnifolia* Kunth. 5. F. foliis profunde cordatis acuminatis integerrimis membranaceis utrinque incano-tomentoſis, paniculis axillaribus ramoſiſſimis gracilibus, laciniis corollae acuminatis. *Ad fl. Magdalen.* Humb. nov. gen. 7. t. 640.

pag. 48.

Poſt *Leoniam* R. et P.:

AGLAIA Lour.

*odorata* Lour. 1. A. foliis ſub-2jugis obovato-oblongis obtuſis racemisque compoſitis glabris, caule fruticoſo. *China. Cochinchina.* (Camunium ſinenſe Rumph. amboin. 5. t. 18. f. 1. Jack. in Mal. miſc. 1. 33., Opilia odorata * Syſt. 1. 766.)

*odoratiſſima* Blum. 2. A. foliis ſub-2jugis oblongis obtuſiuſculis ſubtus paniculisque pyramidatis tenuiſſime lepidotis. *Java.*

†*polyſtachya* Wallich. 3. A. foliis paucijugis baſi obliquis oblongo-lanceolatis glaberrimis, racemis paniculatis axillaribus. *Silhet, prov. Ind. or.*

*Sulingi* Blum. 4. A. foliis ſub-3jugis elliptico-oblongis obtuſiuſculis paniculisque corymboſis glabris. *Java.*

*elliptica* Blum. 5. A. foliis ſub-3jugis elliptico-oblongis ſubtus paniculisque laxis elongatis ruſo-tomentoſis. *Java.*

*ſpecioſa* Blum. 6. A. foliis ſub-4jugis oblongo-lanceolatis acutis ſubtus paniculisque ruſo-lepidotis. *Java.*

*decandra* Wallich. 7. A. foliis ſub-6jugis oblongis acuminatis utrinque paniculisque axillaribus pubeſcentibus, floribus 10andris, fructibus 5ſpermis. *Nepal.*

*argentea* Blum. 8. A. foliis multijugis cordato-oblongis acuminatis ſubtus argenteo-lepreſis, paniculis elongatis divaricatis. *Java.*

pag. 49.

Post *Clutiam:*

## GYNOSTEMMA Blum.

*pedatum* Blum. 1. G. foliis pedato-palmatis, laciniis ovato-oblongis grosse serratis, panicula axillari. *Java.*

*simplicifolium* Blum. 2. G. foliis ovato-oblongis acuminatis serrulatis glabris, racemis paniculatis. *Java.*

pag. 50.

Post *Jürgensiam:*

## EUPHRONIA Mart.

*hirtelloides* Mart. *Brasil.* Arbor foliis alternis petiolatis ovato-oblongis subtus tomentosis, floribus racemosis. Mart. nov. gen. t. 75.

## HEXANDRIA.

## APHANAMIXIS Blum.

*grandifolia* Blum. *Java.* Arbor excelsa, foliis impari-pinnatis multijugis, foliolis oppositis oblongis, paniculis elongatis axillaribus.

## SCHIZOCHITON *.

*patens* * 1. Sch. foliis pinnatis oblongis, paniculis patentibus ramosissimis. *Java.* (Chisocheton Blum.)

*divergens* * 2. Sch. foliis pinnatis oblongis, paniculis divaricatis virgatis. *Java.* (Chisocheton Blum.)

pag. 64.

Ad *Guaream.*

*excelsa* Bonpl. 5. Gu. foliis 2-3jugis ovalibus obtusis coriaceis supra glabris subtus ad axillas venarum villosis, paniculis axillaribus subsimplicibus abbreviatis, *Nov. Hispan.* Humb. nov. gen. 7. p. 227.

*densiflora* * 6. Gu. foliis 5-8jugis subtus pubescentibus, foliolis alternis basi obliqua oblongis acuminatis, racemis confertis axillaribus. *Java.* (Epicharis Blum.)

*cauliflora* * 7. Gu. foliis multijugis subtus villosis, foliolis oppositis oblongis acuminatis, racemis confertis lateralibus. *Java.* (Epicharis Blum.)

*sericea* Blum. 8. Gu. foliis multijugis subtus ad costam pubescentibus, foliolis oblongis acuminatis, racemis confertis lateralibus. *Java.* (Epicharis sericea Blum.) E. altissima Blum., arbor 140 pedes alta, floribus ignotis, varietas videtur.

Ad *Alchorneam* Sw.

*castaneaefolia* Adr. Juss. 2. A. foliis lanceolatis acutis mucronato-serratis utrinque glabris, floribus spicato-paniculatis.

*Ad Orinocum.* (Hermesia W. Humb. aequinoct. 1. t. 46. Syst. 2. p. 246.)

Ad *Myristicam moschatam* Thunb. Hook. exot. fl. t. 155. 156.

pag. 66.

Ad *Lansium domesticum* Jack. (Cipadessa fruticosa Blum.)

Ad *Heyneam* Roxb.

*quinquejuga* * 2. H. foliis abrupte pinnatis 5-7jugis, foliolis ovato-oblongis subtus ad venas paniculisque virgatis rufo-tomentosis. *Java.* (Trichilia rufinervis Blum.)

† *multijuga* Blum. 3. H. foliis sub-6jugis, foliolis oblongis utrinque basi inaequaliter attenuatis, racemis axillaribus solitariis. *Java.*

pag. 67.

Ad *Trichiliam.*

Post n. 1. *excelsa* * 20. Tr. foliis impari-pinnatis 4jugis basi inaequalibus ovato-oblongis acuminatis, paniculis axillaribus coarctatis, floribus 8andris, capsulis globosis. *Java. Ins. freti Malacc.* (Melia excelsa Cand., Dysoxylon excelsum Blum.)

*arborescens* * 21. Tr. foliis impari-pinnatis oblongis utrinque attenuatis, racemis compositis axillaribus, floribus 10andris. *Java.* (Goniocheton Blum.)

*bijuga* Labill. 22. Tr. foliis abrupte pinnatis 2jugis, foliolis oblongis undulatis glabris, paniculis laxis folio brevioribus. *Nov. Caledon.*

*montana* Kunth. 23. Tr. foliis impari-pinnatis sub-2jugis oblongis acuminatis glabris subtus reticulatis, paniculis axillaribus subsimplicibus petiolo longioribus. *Alp. nov. Granat.* Humb. nov. gen. 7. p. 226.

pag. 68.

Ad Tr. *moschatam* Sw. dele syn. Andrewsii.

Tr. *alliacea* Forst. *Ins. Molucc. Java.* (Dysoxylon alliaceum et longifolium Blum.)

Post n. 8. *macrocarpa* * 24. Tr. foliis alternatim pinnatis oblongis, floribus paniculatis, capsulis globosis. *Java.* (Dysoxylon macrocarpon et laxiflorum Blum.)

*similis* * 25. Tr. foliis opposite pinnatis inaequaliter oblongis obtusiusculis, floribus paniculatis, capsulis globosis. *Java.* (Dysoxylon simile Blum.)

*odorata* Andr. 26. Tr. foliis opposite impari-pinnatis 4jugis glabris, foliolis ovato-oblongis undulatis, racemis axillaribus glomeratis, staminibus 2fidis distinctis. *Ins. Carib.* Hook. exot. fl. t. 128.

Tr. *emetica* Vahl. gaudet floribus 10andris.

*mollissima* * 27. Tr. foliis suboppositae pinnatis subtus paniculisque divaricatis villosis, foliolis ovato-oblongis obtusiusculis, floribus 8andris. *Java.* (Dysoxylon mollissimum Blum.)

# Classis XVI.

pag. 69.

Poſt *Trichiliam*:

## Didymochiton Blum.

*nutans* Blum. *Java*. Frutex, foliis impari-pinnatis oblongo-lanceolatis ſubtus ad coſtam pubeſcentibus, ſpicis paniculatis axillaribus nutantibus, floribus glomeratis.

pag. 70.

Ad *Chorifiam infignem* Kunth. (Ch. ventricoſa Nees et Mart. nov. act. nat. cur. 11. t. 20.)

*Philotheca auſtralis* Rudg. foliis lineari-teretiuſculis obtuſis.

*Reichenbachii* Sieb. 2. Ph. foliis confertis lineari-filiformibus acutis punctato-aſperis, floribus terminalibus. *Nov. Holl.*

pag. 71.

Ad *Geranium*.

Poſt n. 12. *arachnoideum* Hilar. 63. G. caule decumbente ramoſo dupliciter villoſo, foliis 7partitis, laciniis anguſte lanceolatis 3fidis, pedunculis filiformibus elongatis, fructibus villoſis. *Braſil.*

pag. 72.

G. *erioſtemon* Fiſch. habitat in *alpibus Nepal.* Don. fl. nepal. p. 208.

pag. 74.

Poſt n. 44. *multifidum* Don. 64. G. acaule, foliis profunde 5partitis ſubtus piloſis, laciniis multifidis linearibus obtuſis, ſcapo 4gono aſcendente apice ſubtrichomo villoſo. *Nepal.*

pag. 75.

Ad G. *rotundifolium* L. G. albicans Hilar. var.

Ad *Browneam* Jacqu.

*racemoſa* Jacqu. 5. Br. foliis abrupte pinnatis 4jugis glabris, foliolis obovato-oblongis acuminatis integerrimis baſi hinc glanduliferis, floribus racemoſis, calyce exteriori tomentoſo, ſtaminibus corollam ſubſuperantibus. *Caracas.*

pag. 76.

Poſt *Browneam*:

## Parkia R. Br.

*africana* R. Br. *Afric. occid.* Arbor foliis 2pinnatis multijugis glabris, foliolis linearibus obtuſis, petiolo communi baſi glandulifero, floribus ſpicatis. (Mimoſa

biglobosa Jacqu., taxifolia Pers., Inga biglobosa W., senegalensis Cand.)

## AMARIA Seb. Mut.

*petiolata* Seb. Mut. 1. A. foliis petiolatis cordatis, floribus terminalibus. *Nov. Granat.*

*sessilifolia* Seb. Mut. 2. A. foliis subamplexicaulibus oblongis, pedunculis axillaribus multifloris. *Nov. Granat.*

## HUC SCHOTIA Jacqu. e vol. 2. p. 326.

*latifolia* Jacqu. 1. Sch. foliis abrupte pinnatis 3-4jugis obovatis obtusis, stipulis minutis subulatis deciduis, corolla 4petala, leguminibus 2-4spermis. *Afric. austr.* Hook. exot. fl. t. 159. (Omphalobium Schotia Jacqu. fil. ecl. 2. t. 126. ined.) Calyx non coloratus.

*speciosa* Jacqu. 2. Sch. foliis abrupte pinnatis lucidis, foliolis ovali-lanceolatis mucronatis, stipulis subulatis, corolla 5petala. *Afric. austr.* (Guajacum afrum L., Theodora speciosa Medic.)

*tamarindifolia* Afzel. 3. Sch. foliis abrupte pinnatis sub-8jugis, foliolis ellipticis retusis altero margine excavatis. *Afric. austr.* Bot. mag. 1153. (Sch. alata Thunb.?)

*stipulata* R. Br. 4. Sch. foliis 5jugis foliolis oblongis acutis cuspidatis, stipulis dimidiato-ovatis falcatis mucronatis. *Afric. austr.*

*simplicifolia* Vahl. Cand. 5. Sch. foliis simplicibus ovalibus emarginatis nitidis 3nerviis venoso-reticulatis, racemo terminali subvilloso. *Patria?*

[Huc *Metrocynia* Thuarsii e Madagascar pertinere videtur.]

pag. 78.

## CONNARUS L. Cand.

*monocarpus* L. 1. C. foliis ternatis coriaceis glaberrimis, foliolis oblongis acuminatis venosis, ramis glandulosis, panicula terminali rufo-pubescente. *Ceylon.*

*pubescens* Cand. 2. C. foliis impari-pinnatis bijugis supra glabris subtus ferrugineo-pubescentibus, foliolis ovalibus acutis, extremo maximo, paniculis axillaribus terminalibusque. *Guiana.* Act. soc. hist. nat. paris. 2. t. 15. ? Rourea frutescens Aubl., Robergia Schreb. Syst. 2. 459.

*santaloides* Vahl. 3. C. foliis pinnatis sub-3jugis glaberrimis, foliolis ovatis acuminatis reticulato-venosis, pedunculis axillaribus aggregatis. *Ind. or.* (Aegiceras minus Gärtn. de fruct. 1. p. 216. t. 46. excl. syn. Rumph.)

† *mimosoides* Vahl. 4. C. foliis pinnatis sub-10jugis glabris, foliolis oblongis emarginatis, racemis axillaribus. *Ins. Nicobar.*

## Classis XVI.

### Omphalobium Gärtn.

* *Fructibus solitariis.*

† *Foliis ternatis.*

*indicum* Gärtn. 1. O. foliolis subrotundo-ovatis acutiusculis glaberrimis venoso-reticulatis coriaceis, paniculis axillaribus terminalibusque. *Ceilon. Ins. Molucc.* (Rhus zeylanicus Burm. zeyl. t. 89. Connarus asiaticus L., Omphalobium Gaudichaudii Cand.)

*africanum* Cand. 2. O. foliolis oblongis acuminatis glaberrimis membranaceis venosis, paniculis axillaribus terminalibusque. *Afric. occid.* (Connarus africanus Lam., Cav. diss. t. 221.) O. Lamberti Cand. idem videtur.

†† *Foliis impari-pinnatis.*

*pinnatum* Cand. 3. O. foliolis 2jugis ovali-oblongis acutis utrinque glaberrimis, venis apice confluentibus, panicula terminali, petalis basi biappendiculatis, germinibus tomentosis. *Ind. or.* (Connarus pinnatus Lam. Cav. diss. t. 222.)

*Patrisii* Cand. 4. O. foliolis 3-4jugis ovali-oblongis acutis coriaceis glaberrimis venosis, ramis glandulosis, panicula terminali. *Cayenna.* Act. soc. hist. nat. par. 2. t. 16. A.

*Thonningii* Cand. 5. O. foliolis sub-2jugis ellipticis acutis submembranaceis glaberrimis, panicula terminali, germinibus hirsutis. *Guinea.*

*Smeathmanni* Cand. 6. O. foliolis sub-2jugis ovali-oblongis acutis coriaceis supra nitidis subtus ferrugineo-villosis, panicula terminali, germinibus subpubescentibus. *Afric. occid.*

*Perrottetii* Cand. 7. O. foliolis 2-3jugis oblongis utrinque attenuatis supra nitidis subtus ferrugineo pubescentibus, panicula terminali, fructibus glabratis. *Guiana.*

** *Fructibus aggregatis.*

*villosum* Cand. 8. O. foliis ternatis oblongis utrinque attenuatis supra glabris subtus paniculaque terminali fructibusque ferrugineo-villosis. *Afric. occid.* (Cnestis trifolia Lam.)

*pentagynum* Cand. 9. O. foliis ternatis glabris coriaceis subrotundo-ovatis 5nerviis, paniculis axillaribus terminalibusque, fructibus villosis. *Madagascar.* (Connarus pentagynus Lam. Cav. diss. t. 223.)

Post *Serraeam* *:

### Amphinomia Cand.

*decumbens* Cand. *C. B. S.* Herba decumbens hirsuta, foliis ternatis obovatis, capitulis pedunculatis. (Hermannia triphylla L., Connarus decumbens Thunb. in Röm. arch. 1. t. 1.)

## Classis XVI.

pag. 79.

Ad *Pentapetem phoeniceam*. P. angustifolia Blum. var.

Ad *Dombeyam* Cav.

† *diversifolia* * 11. D. foliis oblique cordatis sinuato-lobatis integerrimis, junioribus peltatis 3-5lobis. *Java.* (Pterospermum diversifolium Blum.)

pag. 80.

Ad *Pterospermum* Schreb.

*lanceaefolium* Roxb. 3. Pt. foliis inaequilateris oblongis acuminatis integerrimis subtus incano-tomentosis, pedunculis petiolos multo superantibus. *Java.*

Ad *Helicterem.*

H. *baruensis* L. (H. brasiliensis Mikan.) *Brasil.*

Post n. 4. *viscida* Blum. 15. H. foliis cordato-subrotundis acuminatis sub-3lobis inaequaliter serratis subtus stellato-villosis viscidis, pedunculis axillaribus multifloris reflexis, fructibus oblongis hirsutissimis. *Java.*

*javensis* Blum. 16. H. foliis obsolete cordatis lanceolatis crenulatis supra glabris subtus glaucis ramulisque pubescentibus, pedunculis axillaribus geminis multifloris. *Java.*

pag. 81.

H. *hirsuta* Lour. et *angustifolia* L. habitat et in *Java.*

*Sterculia lanceolata* Cav. habitat et in *Java.*

pag. 82.

Post n. 15. *subpeltata* Blum. 28. St. foliis subpeltatis ovato-oblongis acuminatis integerrimis subtus arachnoideo-tomentosis, racemis simplicibus, fructibus oblongis utrinque attenuatis. *Java.*

St. *macrophylla* Vent. (St. cordata Blum.)

pag. 84.

Ad *Halesiam.*

*parviflora* Mx. 3. H. foliis ovato-oblongis acutis utrinque petiolisque pubescentibus, racemis subcompositis pendulis, floribus 8andris. *Amer. bor.* Bot. reg. 952.

Ad *Nepenthem.*

*Gymnamphora* Reinw. 4. N. foliis petiolatis oblongis subtus ad costam asperis, cantharis radicalibus aphyllis nervoso-reticulatis ovatis superne cristatis. *Java.*

# Classis XVI.

## pag. 88.

### Ad *Malvam*.

Post n. 11. *ruderalis* Blum. 68. M. foliis ovato-lanceolatis acutis grosse serratis subtus ramulisque strigosis, floribus axillaribus glomeratis, capsulis 8mucronatis. *Java*.

*timorensis* Blum. 69. M. foliis subcordato-ovatis grosse dentatis utrinque ramisque stellato-hispidis, floribus spicatis, capsulis apice barbatis muticis. *Timor*. *Java*.

## pag. 90.

M. *circinata* Viv. ad M. *nicaeensem* All. referenda.

Post n. 41. *tomentella* Presl. 70. M. caule prostrato foliisque cordato-orbiculatis obtusis 5angularibus dentatis stellato-tomentosis canescentibus, pedunculis petiolo brevioribus. *Sicil*.

*hirsuta* Presl. 71. M. caule erecto ramoso hirsutissimo, foliis cordato-orbiculatis denticulatis utrinque tomentosis, inferioribus subangulatis, superioribus 5lobis obtusis, pedunculis quaternis hirsutis erecto-patulis petiolo triplo brevioribus, capsulis rugulosis tomentosis. *Sicil*.

† *Bivoniana* Presl. 72. M. caule erecto foliisque cordato-orbiculatis obtuse angulatis dentatis stellato-pubescentibus, pedunculis aggregatis brevissimis, fructiferis deflexis, capsulis tomentosis. *Sicil*.

† *ribifolia* Viv. 73. M. stellato-pubescens, foliis inferioribus cordatis 5lobis, superioribus palmato-5fidis, laciniis obtusis crenatis, pedunculis solitariis folia superantibus, petalis calycem triplo superantibus. *Corsica*.

## pag. 95.

Ad *Gossypium herbaceum*. (G. javanicum Blum.)

## pag. 96.

### Ad *Thespesiam* Corr.

Th. *populnea* Corr. — foliis 7nerviis subtus lepidotis, pedunculis petiolos aequantibus.

*macrophylla* Blum. 3. Th. foliis cordatis acuminatis 5nerviis subcoriaceis, pedunculis petiolo brevioribus. *Java*. *Ins. Molucc*. (Novella litorea Rumph. amboin. 2. t. 74.)

*altissima* * 4. Th. foliis oblongis retusis integerrimis, pedunculis lateralibus multifloris, staminibus subliberis. *Java*. (Esenbeckia Blum.)

### Ad *Urenam*.

Post n. 4. 5. *repanda* Blum. 19. U. foliis subrotundis repando-dentatis subtus 1glandulosis glaucis pubescentibus, caule stellato-pubescente, involucro calycem superante. *Java*.

† *tomentosa* Blum. 20. U. foliis late ovatis angulatis serratis sub-5nerviis 1glandulosis tomentosis subtus canescentibus, summis ovato-lanceolatis 3nerviis, involucro calycem subaequante. *Java.*

pag. 101.

Ad *Hibiscum.*

H. *Lampas* Cav. et in *Java.* H. callosus Blum. var.

pag. 102.

H. *longifolius* W. (H. Pseud-Abelmoschus Blum.)

pag. 104.

H *lasiocarpus* Cav. habitat ad *fl. Platam.*

*racemosus* Lindl. 86. H. pube stellato-hispida pruriente, foliis longe petiolatis 5fidis acutis serratis tomentosis, racemis terminalibus, involucro calycem aequante petalis multo breviori. *Nepal.* Bot. reg. 917.

*mauritianus* * 87. H. humilis suffruticosus pubescens, foliis longe petiolatis subcordato-subrotundis obtusis sub-3lobis repando-dentatis, pedunculis subsolitariis. *Ins. Mascaren. Ind. or.* (H. ficulneoides Lindl. in bot. reg. 938.)

*venustus* Blum. 88. H. foliis cordato-subrotundis semi-3lobis acutis grosse dentatis subtus stellato-tomentosis, pedunculis petiolo brevioribus, involucro sub-5phyllo, capsulis 5gonis hispidissimis. *In hortis Javae.*

*virgatus* Blum. 89. H. foliis lineari-lanceolatis acuminatis apice remote dentatis, infimis obovatis 3lobis, pedunculis folio brevioribus, involucro 8-10phyllo. *In hortis Javae.*

pag. 105.

Post n. 56. *unicaulis* Cand., 90. H. caule simplici villosissimo, foliis profunde cordato-subrotundis angulatis sinuato-denticulatis supra hirsutis subtus candido-villosissimis, pedunculis *solitariis petiolo brevioribus*, involucri foliolis spathulatis calycem aequantibus, capsula hispidissima. *Patria?*

*fugax* Mart. 91. H. foliis subsessilibus oblongis acuminatis subtus ramisque tomentosis, pedunculis 1floris folio brevioribus. *Brasil.*

pag. 106.

*hispidus* Mill. Bot. reg. 806. var. H. *Trioni.*

Post n. 78. *similis* Blum. 92. H. foliis cordato-orbiculatis acuminatis crenulatis subtus albidis stellato-tomentosis 3-5glandulosis, involucro 10fido. *Java.*

## Classis XVI.

### pag. 112.

Ad *Sidam*.

Post n. 85. *viscidula* Blum. 177. S. foliis cordato-subrotundis acuminatis dentatis subtus stellato-villosis, ramis viscidis, pedunculis petiolo brevioribus. *Java*.

### pag. 116.

Post n. 87. *centrota* * 178. S. caule procumbente ramoso hispido, foliis inferioribus 5lobis, superioribus hastato-3fidis glabris, laciniis acutis integerrimis, pedunculis folia superantibus, capitulis 2aristatis setoso-aculeatis. *Patria?* Hort. hal. 1826. (S. hastata ex hort. anglic.)

### pag. 119.

S. *Sonneratia* Cav. (S. cistiflora Blum.) *Java*.

### pag. 121.

Post n. 158. *elongata* Blum. 179. S. foliis cordatis grosse dentatis utrinque glabris, petiolis stipulisque pilosis, racemis axillaribus paucifloris foliatis, calycibus campanulatis. *Java*.

*atropurpurea* Blum. 180. S. foliis cordato-subrotundis acuminatis crenatis supra pubescentibus subtus tomentosis, stipulis foliaceis inaequaliter cordatis, panicula terminali, capsulis acuminatis calycem superantibus. *Java*.

*sundensis* * 181. S. foliis cordato-subrotundis acuminatis dentatis subtus incano-tomentosis, stipulis setaceis, floribus racemoso-paniculatis. *Java*. (S. sundaica Blum.)

### pag. 122.

Post n. 171. *digitata* * 182. S. radice tuberosa, caule herbaceo foliisque palmato-digitatis glaucis, laciniis linearibus elongatis integerrimis, pedunculis axillaribus 1floris longissimis. *Ditio Arcansa Amer. bor.* (Callirrhoë digitata Nuttall. in Journ. of Philadelph. 2. p. 181. Nuttallia Hook. exot. fl. t. 171.)

*pedata* * 183. S. herbacea glabra, foliis pedatis, laciniis lanceolatis incisis, pedunculis longissimis subcorymbosis. *Ditio Arcansa Amer. bor.* (Nuttallia pedata Hook. exot. fl. t. 172.)

### pag. 124.

Ad *Bombax*.

Ad B. *orientale* * Eriodendron anfractuosum Blum.

*Sumauma* * 10. B. foliis 7-5natis glabris, foliolis oblongis acuminatis integerrimis, floribus solitariis, petalis spathulatis elongatis extus fulvo-lanatis, antheris 5 anfractuosis. *Brasil.* (Eriodendron Mart.)

Poſt n. 7. *parviflorum* Mart. 11. B. foliis 5-3natisque coriaceis, foliolis ſpathulatis emarginatis, pedunculis calycibusque glabris, petalis calyce longioribus tomentoſis, fructibus glabris. *Braſil.*

*pubeſcens* Mart. 12. B. foliis 5-3natisque coriaceis pubeſcentibus, foliolis obovatis emarginatis, pedunculis calycibus petalisque tomentoſis, germinibus glabris. *Braſil.*

*retuſum* Mart. 13. B. foliis 5-3natisque glabris, foliolis obovatis retuſis, pedunculis calycibusque glabris, petalis elongatis germinibusque tomentoſis. *Braſil.*

†*Mungaba* Mart. 14. B. foliis 3natis glabris, foliolis oblongis acuminatis integerrimis, calyce cupulari, petalis coriaceis reflexis, ſtaminibus polyadelphis apice 2fidis. *Ad fl. Amazonum.*

pag. 125.

Ad *Carolineam.*

*tomentoſa* Mart. 5. C. foliis 9natis tomentoſo-hirtis coriaceis, foliolis obovatis obtuſis, calyce baſi multiglanduloſo, petalis erectis ſtamina aequantibus. *Braſil.*

Ad *Gordoniam.*

Poſt n. 1. *excelſa* Blum. 6. G. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſerrulatis, pedunculis axillaribus 1floris folio brevioribus. *Java.* (Schima excelſa Reinw.)

Ad G. *Wallichii* Cand. G. Chilaunea Don. — Schima Noronhae Reinw. var. *Java.*

pag. 126.

Poſt n. 4. *ſemiſerrata* * 7. G. foliis ſubtrapezoideis baſi cuneatis latere latiori verſus apicem ſerratis coriaceis glabris, floribus terminalibus congeſtis polypetalis. *Braſil.* (Wikſtrömia fruticoſa Schrad., Lindleya Nees., Haemocharis ſemiſerrata Mart.)

*tomentoſa* * 8. G. foliis ſubſeſſilibus obovato-oblongis ſubintegerrimis ſubtus tomentoſis, ramis hirſutis, floribus ſolitariis terminalibus. *Braſil.* (Haemocharis Mart.)

Ad *Camelliam.*

Ad C. *Kiſſi* Wall. (C. Keina Don.)

*oleifera* Abel. 4. C. foliis elliptico-oblongis acutis ſerratis coriaceis nitidis, floribus ſolitariis, calycibus ſericeis deciduis, petalis 2lobis. *China.*

*euryoides* Lindl. 5. C. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſerratis ſubtus ſericeis, ramis piloſis, pedunculis lateralibus 1floris ſquamoſis. *China.* Bot. reg. 983.

pag. 127.

Poſt *Meſuam:*

## CALPANDRIA Blum.

*lanceolata* Blum. *Java.* Frutex foliis ſimplicibus lanceolatis ſerratis, floribus ſolitariis geminisve lateralibus.

SPHAEROSTEMA Blum.

*axillare* Blum. 1. Sph. foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis, pedunculis axillaribus 1floris petiolum aequantibus, filamentis exterioribus liberis. *Java.*

*elongatum* Blum. 2. Sph. foliis ovatis acuminatis tenuissime denticulatis, pedunculis axillaribus 1floris petiolos longe superantibus, filamentis omnibus connatis. *Java.*

pag. 129.

Ad *Ingam.*

Post n. 16. *candida* Kunth. 69. I. aculeata, foliis conjugato-pinnatis, foliolis 2jugis oblique obovatis utrinque rotundatis submucronatis subcoriaceis glabris, capitulis axillaribus subglobosis longe pedunculatis, leguminibus circinatis. *Quito.*

Post n. 18. *Catarrhactae* Kunth. 70. I. foliolis dimidiato-ovato-lanceolatis acuminatis membranaceis glabris, petiolo communi glandulifero, pedunculis axillaribus geminis, leguminibus circinatis, caule scandente. *Ad Orinocum.*

Ad I. *quassiaefoliam* W. (I. lucida Kunth.)

Post n. 25. *sapida* Kunth. 71. I. foliolis 2jugis oblongis utrinque attenuatis membranaceis glaberrimis supra nitidis, petiolo communi alato glanduloso, leguminibus subarcuatis. *Ad fl. Magdalen.*

pag. 130.

Post n. 32. *Bonplandiana* Kunth. 72. I. foliolis 5jugis subcordato-oblongis acutis glabris supra nitidis, petiolo communi alato glanduloso, spicis sessilibus, corollis sericeis, leguminibus glabris. *Nov. Granat.*

Ad I. *rhoifoliam* W. (I. ornifolia Kunth.)

pag. 131.

Ad I. *nobilem* W. (I. Humboldtiana Kunth. *Nov. Granat.*)

pag. 132.

Ad I. *Saman* W. (I. salutaris Kunth.)

pag. 136.

Ad *Acaciam* W.

Post n. 51. *spirorbis* Labill. 189. A. petiolis falcato-lanceolatis obtusis 3nerviis, spicis axillaribus binis, leguminibus cochleatis. *Nov. Caledon.*

pag. 137.

Post n. 70. *Thibaudiana* Cand. 190. A. foliis partialibus 4-propriis 7-9jugis basi obliquis subrhombeo-ovatis subtus petiolisque villosis, glandula petiolari ses-

fili. *Amer. auftr.* (Sophora obliqua Perf. Syft. 1. 346.)

*Rohriana* Cand. 191. A. foliis partialibus 4-propriis 10jugis trapezoideis obtufis glabris, cofta flavido-villofa, petiolo communi glandulifero, fpicis axillaribus pedunculatis folitariis folia aequantibus. *Amer. auftr.* (Mimofa nigricans Vahl.)

Ad A. *muricatam* W. (A. granulofa Labill. nov. Caledon. t. 86.)

*fulgens* Labill. 192. A. ramis teretibus cinereis, petiolis glanduliferis, foliis partialibus 2-propriis 3jugis oblongis utrinque attenuatis fubtus cinereis, fpicis axillaribus folitariis. *Nov. Caledon.*

pag. 138.

*Aleurites laccifera* W. deleatur: redit enim ut varietas *Crotonis aromatici* p. 869.

pag. 139.

Poft n. 89. *multiflora* Kunth. 193. A. petiolis pubefcentibus eglandulofis, foliis partialibus 3-propriis 8jugis oblique oblongis nervofo-venofis glabris, capitulis fafciculatis in racemos digeftis. *Nov. Granat.*

pag. 141.

A. *brachyloba* et *glandulofa* W. (Darlingtonia Cand.)

pag. 143.

A. *fafciculata* Kunth. hinc ad p. 146. poft n. 178. transferenda: ejus loco ponatur:

*fubtilifolia* Kunth. 194. A. fpinis ftipularibus rectis, petiolis glanduliferis, foliis partialibus 5-10-propriis multijugis linearibus obtufis fubtus pubefcentibus, fpicis axillaribus folitariis. *Nov. Granat.*

pag. 146.

Poft n. 178. *riparia* Kunth. 195. A. aculeis fparfis uncinatis, petiolis glanduliferis fubaculeatis, foliis partialibus 12-propriis multijugis linearibus ciliatis, capitulis axillaribus folitariis, leguminibus apice uncinatis. *Nov. Granat.*

pag. 147.

Poft n. 186. *Arrufula* Don. 196. A. aculeis fparfis recurvis, petiolis aculeatis medio glanduliferis, foliis partialibus propriisque multijugis oblique linearibus obtufis ciliatis, capitulis pedunculatis fubaggregatis. *Nepal.*

Poft *Acaciam*:

## CORDYLA LOUR.

*africana* Lour. *Afric. or.* Arbor foliis pinnatis glabris, pedunculis multifloris, ftaminibus longis croceis, fructibus efculentis.

# CLASSIS XVII.

pag. 150.

*Soulamea* Lam. del. fupra in Cl. VI. collocata.

pag. 151.

n. 2498. *Heylandia* Cand. Cal. 5fidus. Carina oblique truncata acuta. Stylus refractus. Legumen compressum 1fpermum.

*lia* Thunb. n. 2518. huc transferatur, ab Heylandia carina obtufa ftyloque non refracto diverfa.

pag. 152.

ft n. 2524. *Carmichaëlia* R. Br. Cal. cyathiformis 5dentatus. Vexillum latum ftriatum. Legumen fub-5fpermum compreffum, futuris (replo R. Br.) poft valvarum lapfum fuperftitibus.

oft n. 2530. *Carpopogon* Roxb. Cal. $\frac{4}{5}$. Vexillum abbreviatum incumbens ovatum. Alae conniventes. Carina elongata.

*Dichilos* Cand. Cal. $\frac{2}{5}$, laciniis profunde partitis. Vexillum carina brevius. Legumen lineare 8fpermum.

pag. 153.

Poft n. 2546. *Pueraria* Cand. Cal. campanulatus 2labiatus, lab. fup. fubintegro, inf. 3fido. Carina obtufa. Vexillum obovatum. Legumen fubftipitatum compreffum ftylo coronatum.

Poft n. 2557. *Parochetus* Hamilt. Cal. 4fidus nudus. Vexillum incumbens 2lobum. Carina obtufa alis tecta. Legumen gibbofum.

*Odonia* Bertol. Cal. 4partitus fubaequalis. Alae fuperne 1dentatae. Carina 2partita. Legumen 4-8fpermum.

*Dumafia* Cand. Cal. cylindricus truncatus 2bracteatus. Stylus medio dilatatus. Legumen oligofpermum.

*Sabinea* Cand. Cal. campanulatus truncatus. Carina obtufiffima. Stylus filiformis cum ftaminibus circinatus incurvus. Legumen ftipitatum compreffum.

Poft n. 2558. *Caragana* Lam. Cal. tubulofus 5dentatus. Pet. fubaequalia. Legumen feffile fubcylindricum polyfpermum.

*Corynitis* *. (Corynella Cand.) Cal. fubbilabiatus 5dentatus, dentibus patulis fubulatis. Carina obtufa. Stylus clavaeformis. Legumen compreffum polyfpermum.

*Halimodendron* Cand. Cal. campanulatus 5dentatus. Carina obtufa. Stylus filiformis. Legumen inflatum fubcoriaceum oligofpermum.

pag. 154.

Poſt n. 2564. *Pachyrrhizos* Rich. Cal. 4lobus, lobo ſuper. latiori emarginato. Vexillum baſi biplicatum. Legumen compreſſum elongatum.

Poſt n. 2569. *Hymenoſpron* *. Cal. campanulatus ſemi-4fidus, lacinia ſuprema aſcendente. Vexillum reflexum. Stigma ſubclavatum. Diſcus urceolatus. Legumen compreſſum utrinque ad ſuturam alato-marginatum.

Poſt n. 2575. *Prieſtleya* Cand. Cal. 5dentatus. Vexillum ſubrotundum. Alae planae ſubfalcatae. Carina biceps, dorſo incurvo. Legumen ſeſſile compreſſum.

Poſt n. 2581. *Nevrocarpon* Desv. Cal. campanulatus 5fidus bracteatus. Vexillum 2lobum complicatum, alas carinamque amplectens. Legumen ſtipitatum 4gonum, valvis 1nerviis.

*Brongniartia* Kunth. Cal. ⅔ 2bracteatus. Vexillum orbiculatum alas carinamque ſubaequans. Diſcus annularis. Legumen ſtipitatum ſubcultriforme angulatum.

pag. 155.

Poſt n. 2600. *Amicia* Kunth. Cal. campanulatus 5fidus, laciniis 2 ſuperioribus maximis rotundatis, 2 lateralibus minutis, inferiore oblonga concava. Vexillum alas carinamque ſuperans. Legumen compreſſum 5articulatum.

*Pictetia* Cand. Cal. bracteatus 5fidus, dentibus ſuper. brevioribus obtuſis. Vexillum complicatum carina obtuſa. Legumen ſtipitatum oligoſpermum ſubarticulatum.

---

pag. 159.

Ad *Fumariam*.

Poſt n. 6. *Mundtii* * 8. F. caule erecto foliisque 2pinnatifidis cirroſis ſubtus glaucis, lobis obtuſis, racemis oppoſitifoliis, fructibus compreſſis marginatis 1nerviis. *Afric. auſtr.* (Diſcocapnos Mundtii Schlechtend.)

pag. 160.

Ad *Corydalida*.

C. *Halleri* W. (C. denſiflora Presl.)

*perſica* Schlechtend. 38. C. foliis ternis ternatis, foliolis cuneiformibus argute inciſis, bracteis integris ovatis, capſulis nutantibus. *Hyrcania.* S. G. Gmelin.

pag. 162.

Poſt n. 26. *Cracca* Schlechtend. 39. C. caule ſcandente, foliis bipinnatifidis, laciniis obovatis integris inciſisve,

petiolis cirriferis, bracteis lanceolatis pedicellos aequantibus, filiquis pendulis polyfpermis. *C. B. S.*

Poft n. 36. *fcandens* * 40. C. caule fcandente, foliis 2pinnatis fubtus glaucis, foliolis ovalibus mucronulatis, petiolis 2partitis divaricatis, ramulo altero cirrifero, corymbis fimplicibus oppofitifoliis. *Nepal.* (Diclytra Don.)

## pag. 164.

### Ad *Polygalam.*

Poft n. 21. *denfiflora* Blum. 120. P. foliis lineari-lanceolatis mucronatis margine revolutis ciliatis, infimis obovatis, racemis fupraxillaribus abbreviatis denfifloris, alis falcatis capfula orbiculari longioribus. *Java.*

## pag. 165.

Poft n. 35. *framinea* Presl. 121. P. caule erecto fubramofo, foliis lanceolato-linearibus acutiffimis, bracteis deciduis, alis ovato-ellipticis 3nerviis corolla capfulaque feffili duplo longioribus. *Sicil. Ad Brundifium.* Boccon. muf. t. 99.

*elongata* Presl. 122. P. caule afcendente, foliis ferrulatis, infimis obovatis, fuperioribus oblongis, alis ellipticis corolla brevioribus. *Sicil.*

## pag. 167.

Poft n. 57. *arillata* Hamilt. 123. P. fruticofa ramofa, foliis oblongis acuminatis fubtus ramulisque pubefcentibus, racemis oppofitifoliis, alis obovato-oblongis, ftigmate 2dentato, capfulis fubbaccatis margine alatis. *Nepal.*

Ad P. *leptaleam* Cand. (P. discolor Hamilt. Don.)

## pag. 171.

Poft n. 114. *triphylla* Hamilt. 124. P. caule herbaceo apice trichotomo, ramis triphyllis, foliis petiolatis ovatis acutis ferrulatis glabris, alis obovatis, petali lobis lateralibus falcatis apice truncatis 2dentatisque. *Nepal.*

## pag. 174.

### Ad *Monninam* R. et P.

Ante n. 1. *vitellina* * 21. M. arborea ramofiffima, foliis oblongis acutis, racemis compofitis folia fuperantibus. *Java.* (Jackia Blum.)

*excelfa* * 22. M. arborea, foliis elliptico-oblongis undulatis, racemis compofitis confertis. *Java.* (Jackia Blum.)

*longifolia* * 23. M. fruticofa, foliis oblongis acuminatis, racemis compofitis folio brevioribus. *Java.* (Jackia Blum.)

pag. 176.

Ad *Spartium.*

Sp. *nudum* W. habitat et in *Sardinia.*

pag. 177.

Post n. 11. *sessilifolium* * 27. Sp. ramis gracilibus striatis, foliolis sessilibus subfiliformibus sericeis, spicis elongatis interruptis bracteatis, leguminibus ovalibus pubescentibus. *Asia minor.* (Genista sessilifolia Cand.)

Sp. *thebaicum* Delil. (Crotalaria Cand.)

Sp. *Cupani* * (Genista Salzmanni Cand. Sp. gymnopterum Viv. *Corsica.*)

*acanthocladon* * 28. Sp. ramis oppositis spinescentibus, foliolis sessilibus linearibus sericeis complicatis, floribus suboppositis interrupte spicatis, leguminibus pubescentibus. *Graecia. Asia minor.* (Genista acanthoclada Cand.)

*ephedroides* * 29. Sp. ramis rigidis spinescentibus, foliis paucis sessilibus linearibus sericeis, racemis terminalibus subspicatis strictis. *Sardinia. Corsica.* (Genista ephedroides Cand. legumin. t. 36.)

*cuspidosum* Burch. 30. Sp. ramis teretibus divaricatis spinosis, foliolis oblongis, floribus alternis. *Afric. austr.* (Genista Cand.)

*dalmaticum* * 31. Sp. ramis angulatis spinosis foliisque linearibus pilosis, spinis ramosis patentibus, racemis terminalibus, leguminibus hirsutis. *Ins. Cressa in mari adriatico.* (Genista Bartling.)

pag. 183.

Ad *Ononida.*

Ad O. *viscosam.* O. brachycarpa et breviflora Cand. varr.

pag. 185.

Ad *Anthyllida.*

*chilensis* Cand. 19. A. foliis pinnatis cauleque decumbente herbaceo hirsutis, foliolis oblongis subaequalibus, leguminibus rectis hirtis. *Chili.* (Lotus subpinnatus Lag. Syst. 3. p. 279.)

Post *Anthyllida:*

## HEYLANDIA Cand.

*hebecarpa* Cand. 1. H. foliis semiamplexicaulibus cordato-ellipticis obtusis ramulisque virgatis hirsutis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus, leguminibus hirtis. *Ceylon.* Cand. legum. t. 34.

*leiocarpa* Cand. 2. H. foliis breviter petiolatis cordato-subrotundis obtusis hirsutis, pedunculis axillaribus solitariis abbreviatis, leguminibus glabris. *Ind. or.* (Hallia hirta W.)

*latebrosa* Cand. 3. H. foliis petiolatis ovatis ferrulatis glabris, floribus pedunculatis axillaribus geminis bractea cymbiformi occultis, leguminibus pubescentibus. *Ind. or.* (Hedysarum latebrosum L. mant., Lespedezia Perf.)

† *Perrottetii* * 4. H. foliis lineari-subulatis paucissimis, ramis virgatis calycibusque hirsutis, racemis confertis, leguminibus villosis. *Senegambia.* (Crotalaria Cand.)

Ad *Borboniam.*

*obcordata* * 9. B. foliis sessilibus obovatis mucronatis lineatis, stipulis subulatis calyces sessiles solitarios aequantibus, leguminibus villosis. *Senegambia.* (Podaliria obcordata Poir., Requienia Cand. legum. t. 37.)

*sphaerosperma* * 10. B. foliis sessilibus obovatis mucronatis, stipulis subulatis calyce brevioribus, leguminibus pubescentibus. *Afric. austr.* (Requienia Cand.)

pag. 186.

*Borbonia ericaefolia* L. *Priestleiae* Cand. potius adnumeratur.

Ad *Hoveam.*

*elliptica* Cand. 5. H. foliis elliptico-oblongis emarginatis supra lucidis subtus subpubescentibus, pedunculis folio brevioribus geminis. *Nov. Holland. versus Africum.*

*chorizemaefolia* Cand. 6. H. foliis oblongo-lanceolatis sinuato-spinosis mucronatis coriaceis glabris, stipulis spinescentibus, calycibus villosis. *Nov. Holland. versus Notum.*

Ad *Goodiam.*

*simplicifolia* * 3. G. foliis simplicibus lanceolatis, racemis axillaribus paniculatis. *Nov. Holl.* (Platychilum Celsianum Delaun. herb. amat. t. 187. Cand.)

pag. 187.

Ad *Aspalathum.*

A. *Hystrix* Thunb. A. microcarpus Burch. var.

*frankenioides* Burch. 67. A. foliis fasciculatis teretibus obtusiusculis pilosis, ramis villosis, floribus subsolitariis axillaribus terminalibusque sericeis. *Afric. austr.*

pag. 189.

Post n. 45. *suffruticosus* Cand. 68. A. foliis subfasciculatis lineari-subulatis subpubescentibus erectis, pedunculis elongatis racemosis. *C. B. S.*

pag. 190.

Post n. 57. *cymbaeformis* Cand. 69. A. foliis fasciculatis teretibus hirsutis, floribus subsolitariis axillaribus termi-

nalibusque, calycibus cymbaeformibus obtusis. *C. B. S.* (A. uniflorus Lam.)

Ad *Nissoliam.*

N. *arborea.* (Machaerium acuminatum Kunth.)

pag. 191.

Ad *Amerimnum.*

Post n. 3. *strigulosum* Kunth. 8. A. inerme, ramis ferrugineo-tomentosis, foliis subcordato-ovatis obtusis utrinque strigillosis, racemis axillaribus solitariis petiolos superantibus. *Ad Orinocum.*

Post n. 5. *polystachyon* * 9. A. fruticosum, foliis multijugis ovatis, racemis paniculatis. *Mexico.* (Viborquia Ort. dec. 5. t. 9. Varennea Cand.)

pag. 192.

Ad *Pterocarpum.*

Pt. *Ecastaphyllum* Berg. (Ecastaphyllum Brownei Rich. Pers. Hecastophyllum Kunth.)

*dubius* * 11. Pt. foliis simplicibus subcordato-oblongis acutiusculis reticulatis pellucido-lineolatis, fructibus reniformibus rugulosis. *Caracas.* (Hecastophyllum dubium Kunth.)

Post n. 6. *pubescens* * 12. Pt. foliis pinnatis 3jugis membranaceis subtus pubescentibus, foliolis ellipticis acutis, stipulis falcatis, ramis fructibusque orbiculatis tomentosis. *Mexico.* (Amphymenium pubescens Kunth.)

pag. 193.

Ad *Dalbergiam.*

Post n. 7. *amorphoides* * 15. D. arborea ramosissima, foliis petiolatis submultijugis membranaceis pubescentibus pellucido-punctatis, foliolis parvis ellipticis mucronatis, racemis terminalibus pedunculatis. *Mexico.* (Eysenhardtia amorphoides Kunth. in Humb. nov. gen. 6. t. 592.)

*punctata* * 16. D. arborea, foliis pinnatis sub-3jugis glabris supra nitidis pellucido-punctatis, foliolis oblongis obtusis membranaceis, racemis compositis. *Caracas.* (Lonchocarpus punctatus Kunth.)

*guineensis* * 17. D. arborea, foliis pinnatis sub-3jugis coriaceis glabris, foliolis ovalibus acutiusculis, racemis paniculatis, calycibus fructibusque sericeis, staminibus monadelphis. *Guinea.* (Robinia violacea P. B., Lonchocarpus formosianus Cand.)

*macrophylla* * 18. D. arborea, foliis pinnatis 4jugis epunctatis glabris, foliolis oblongis acuminatis supra nitidis, racemis subspicatis, calycibus fusco-tomentosis. *Ad fl. Magdalen.* (Lonchocarpus macrophyllus Kunth.)

pag. 194.

I. *domingensis* Pers. (Lonchocarpus violaceus Cand.)

Ad *Deguelliam* Aubl.

*rborescens* * 2. D. arborescens, foliis pinnatis 2jugis lanceolatis nitidis parallele venulosis, petiolo marginato, pedunculis paucifloris. *Nov. Granat.* (Riveria nitens Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 659.)

Ad *Andiram* Lechen.

*xcelsa* Kunth. 2. A. foliis 6jugis glabris, foliolis ovato-oblongis acutis membranaceis reticulatis, paniculis terminalibus, calycibus urceolatis subtomentosis. *Mexico.*

*paria* Kunth. 3. A. foliis 6jugis glaberrimis supra nitidis, foliolis ovato-oblongis acuminatis, stipulis geminis subulatis, paniculis terminalibus ferrugineo-tomentosis. *Ad fl. Magdalen.*

Ad *Cylistam* Ait.

*olystachya* Cand. 5. C. labio calycis inf. 3dentato, pedunculis racemosis villosis. *Afric. occ.* Cand. legum. p. 382.

pag. 195.

Ad *Halliam* Thunb.

ost n. 2. *angustifolia* Cand. 8. H. caule filiformi, foliis linearibus acutis glabris, stipulis lanceolatis petiolo longioribus, pedunculis 1floris folio brevioribus. *Afric. austr.*

d H. *cordatam* Thunb. (Rafnia cordata Mart. Thunb.)

I. *hirta* W. ad *Heylandiam* reducta.

I. *sororia* W. (Eleiotis Cand.)

Ad *Glycinem.*

ost n. 1. *simplicifolia* Kunth. 36. Gl. suffruticosa diffusa, foliis petiolatis cordato-lanceolatis mucronatis glabris, stipulis nervosis, pedunculis axillaribus sub-3floris, calycibus appresso pilosis bracteatis. *Ad Orinocum.*

ost n. 3. *diffusa* Kunth. 37. Gl. procumbens diffusa, foliis breviter petiolatis supra pubescentibus subtus glanduloso-punctatis, foliolis lanceolatis mucronatis venosis, corymbis axillaribus abbreviatis, leguminibus pilosis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 6. t. 572.

*inita* Kunth. 38. Gl. suffruticosa erecta, foliis brevissime petiolatis ramisque longissime villosis, foliolis lineari-lanceolatis elongatis mucronatis, stipulis lanceolatis cuspidatis striatis, pedunculis paucifloris abbreviatis, leguminibus rufo-hirsutis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 6. t. 573.

*sa* Kunth. 39. Gl. suffruticosa erecta, foliis coriaceis reticulato-rugosis ramisque rufo-hirsutis, foliolis elliptico-oblongis obtusis mucronatis, stipulis lan-

ceolatis, racemis axillaribus abbreviatis. *Nov Granat.* Humb. nov. gen. 6. t. 574.

*pulchella* Kunth. 40. Gl. ſuffruticoſa, foliis villoſis, foliolis ovato-lanceolatis acutis, pedunculis brevibus axillaribus ſub-6floris. *Nov. Granat.*

pag. 196.

Poſt n. 13. *Lamarckii* Kunth. 41. Gl. volubilis, foliis pubeſcentibus punctatis, foliolis lateralibus ſubrotundo-ovatis inaequilateris, racemis laxifloris longiſſimis, *leguminibus 2ſpermis. Cuba. Jamaica.* (Dolichos minimus L. Syſt. 3. p. 251.)

*macrophylla* Kunth. 42. Gl. volubilis, foliis glanduloſo-punctatis ramisque triangularibus villoſis, foliolis ſubcordatis 3nerviis, intermedio rhombeo-ovato, lateralibus inaequilateris, racemis multifloris, calycibus ſericeis. *Cuba.*

*malacophylla* * 43. Gl. volubilis, foliolis ovatis acutiuſculis villoſis reſinoſo-punctatis, racemis breviter pedunculatis folio brevioribus, vexillo obcordato. *Afr. or.* (Gl. mollis Hook. exot. fl. t. 201.)

Poſt n. 17. *meniſpermoides* * 44. Gl. volubilis, foliolis reniformibus pubeſcentibus, ſtipulis ovatis, racemis ſubſeſſilibus paucifloris, *laciniis calycis* lanceolatis 3nerviis. *Nov. Hiſpan.* (Rhynchoſia meniſpermoidea Cand.)

pag. 197.

Gl. *ſagittata* Humb. del., reditura ſub *Rudolphia.*

pag. 198.

Ad *Pſoraleam.*

Poſt n. 3. *lathyrifolia* Balb. 54. Pſ. foliis ovali-oblongis ciliatis, ſtipulis coalitis 2fidis, caule decumbente diffuſo, floribus axillaribus ſubſeſſilibus ſubſolitariis. *Patria?*

Poſt n. 7. *faſcicularis* Cand. 55. Pſ. foliis ſubternatis linearibus acuminatis, pedunculis axillaribus faſciculatis 1floris. *C. B. S.* (Lotus tenuifolius Burm.)

*Mutiſii* Kunth. 56. Pſ. foliolis oblongo-lanceolatis integerrimis glabris, nervo medio petiolis ramisque piloſis, ſpicis axillaribus denſifloris folio brevioribus, calycibus appreſſo-piloſis. *Nov. Granat.* (Indigofera mexicana Mutis. L. ſuppl. Syſt. 3. 274.)

pag. 199.

Ad Pſ. *melilotoidem* Mx. Pſ. eglanduloſa Ell.

pag. 200.

Poſt n. 41. *macroſtachys* Cand. 57. Pſ. foliis ternato-pinnatis pubeſcentibus, foliolis ovatis mucronatis, petiolis glanduloſo-ſcabris, pedunculis axillaribus fo-

lia superantibus, spicis ramosis hirsutissimis. *Ora occid. Amer. bor.*

pag. 201.

Ps. *tetraphylla* Poir. est Turpinia Pers.

Post n. 51. *multijuga* Ell. 58. Ps. caule ramoso glabriusculo, foliis 9-10jugis pubescentibus, foliolis oblongo-lanceolatis obtusis, spicis oblongis, bracteis exilibus membranaceis eglandulosis. *Carolina austr.*

pag. 202.

Ad *Lespedeziam* Mx.

*eriocarpa* Cand. 14. L. foliolis obovatis retusis reticulatis supra glabris subtus strigillosis, racemis fasciculatis subsessilibus, leguminibus hirsutis calycem excedentibus. *Nepal.* (Aspalathus cuneata Don.)

pag. 205.

Post *Dorycenium:*

CARMICHAËLIA R. Br.

*australis* R. Br. *Nov. Zeeland.* Frutex ramosissimus, ramis ancipitibus, foliis ternato-pinnatis glabris, foliolis obcordatis, floribus racemosis violaceis. Bot. reg. 912. (Lotus arboreus Forst., Achyronia arborea Syst. 3. 285.)

pag. 206.

Ad *Melilotum.*

*suaveolens* Ledeb. 25. M. leguminibus sub-2spermis ovatis mucronatis rugulosis, vexillo alas carinamque superante, racemis laxis, stipulis subulatis, foliolis oblongo-lanceolatis apice dentatis, caule elato. *Sibir.*

pag. 207.

M. *sibirica* Poir. (Medicago sibirica Cand.)

pag. 208.

M. *cretica* Desr. (Pocockia Ser. Cand.)

pag. 209.

Ad *Trifolium.*

Post n. 16. *amabile* Kunth. 111. Tr. floribus fasciculatis ebracteatis, dentibus calycis acutis subaequalibus, leguminibus rugulosis, foliolis subrotundis denticulatis venosis glabris, caule caespitoso erecto, ramis pubescentibus. *Mexico.* Humb. nov. gen. 6. t. 593.

*Burchellianum* Ser. Cand. 112. Tr. capitulis longe pedunculatis, laciniis calycis foliaceis 1nerviis tubo corollae longioribus, foliolis obcordatis argute dentatis glabris, stipulis lanceolatis elongatis obtusiusculis nervosis. *Afric. austr.*

*africanum* Ser. Cand. 113. Tr. capitulis longe pedunculatis, laciniis calycis 4gonis tubum corollae aequantibus, foliolis obovatis serrulatis pilosis, stipulis lanceolatis elongatis acutis nervosis. *Afric. austr.* Burchell.

pag. 210.

Ad Tr. *campestre* Schreb. (Tr. agrarium C. C. Gmel. et pseudo-procumbens Ej. var.)

pag. 211.

Ad Tr. *carolinianum* Mx. (Tr. umbellatum Ser. Cand.)

pag. 213.

Post n. 53. *praetutianum* Guffon. 114. Tr. capitulis globosis solitariis bracteatis, dentibus calycis corolla brevioribus, foliis lanceolatis denticulatis glaucis hirsutis, stipulis membranaceis nervosis, caule suffruticoso. *Samnium Italiae.* (Sav. bot. etrusc. 4 p. 16. n. 7.)

pag. 218.

Ad Tr. *grandiflorum* Ledeb. (Tr. eximium Fisch.) Tr. nanum Torr. ad montes scopulosos Amer. bor. var.

Ad Tr. *uniflorum*. Tr. *Buxbaumii* Sav.

pag. 222.

Ad *Cytisum tomentosum* Andr. (Goodia polysperma Cand.)

pag. 225.

*Cytisi dubii.*

Post n. 39. *orientalis* Loif. 45. C. caule erecto hirsuto, foliis subsessilibus ternatis villosis, foliolis linearibus acutis, floribus subterminalibus paucis leguminibusque glabris, calycibus sub-5fidis. *Asia minor.*

*africanus* Loif. 46. C. ramis erectis hirsutis, foliis petiolatis ternatis, foliolis linearibus pilosis, umbellis terminalibus pedunculatis. *Afric. bor.*

Post *Cytisum:*

## CARPOPOGON Roxb.

*volubilis* Roxb. *Ind. or.* Herba volubilis, foliis ternatis ovatis glabriusculis, pedunculis 8floris, floribus atropurpureis. Hort. hal. 1826.

DI-

## DICHILOS Cand.

*lebeckioides* Cand. 1. D. suffruticosum erectum glabriusculum, foliis ternatis linearibus, floribus terminalibus pedunculatis subsolitariis pendulis. *Afric. austr.* Cand. legum. t. 35.

*hypotrichum* * 2. D. scandens, foliis ternatis subtus strigilloso-villosis, foliolis oblongis, stipulis lanceolatis, pedunculis elongatis sub-2floris, leguminibus sericeo-villosis. *Afric. austr.*

### pag. 226.

Ad *Adenocarpum volgensem* * (Calophaca wolgarica Fisch. Cand.)

Ad *Lupinum.*

Post n. 4. *rupestris* Kunth. 30. L. suffruticosus procumbens, foliis subseptenis lanceolatis acutis subtus sericeis, racemis pedunculatis, floribus subverticillatis 1bracteatis, calycibus sericeis. *Alp. Quito.*

*Smithianus* Kunth. 31. L. fruticulosus ramosissimus, foliolis exiguis spathulatis sericeo-hirsutis, racemis pedunculatis, floribus subverticillatis, calycis 2bracteati labio inf. integro, leguminibus hirsutis. *Alp. Quito.*

### pag. 227.

Post n. 15. *elegans* Kunth. 32. L. herbaceus erectus villosus, foliolis lanceolatis acutis subtus sericeis, stipulis setaceis, racemis elongatis, floribus subverticillatis, calycis bracteati labio inf. integro, leguminibus hirsutis. *Mexico.*

*montanus* Kunth. 33. L. herbaceus tomentosus, foliolis lanceolato-linearibus acutis subtus appresso pilosis, stipulis lanceolatis, racemis elongatis, floribus subverticillatis, calycis bracteati villosi labio inf. integro, leguminibus hirsutis. *Nov. Hispan.*

*microcarpus* Sims. 34. L. foliolis lineari-lanceolatis subtus pubescentibus, racemi pedicellis verticillatis, calycibus ebracteatis $\frac{1}{2}$, leguminibus rhombeis mucronatis 2spermis. *Chili.* Bot. mag. 2413.

### pag. 228.

Ad *Piscidiam puniceam* Cav. (Aeschynomene miniata Ort., Daubentonia punicea Cand.)

### pag. 229.

Ad *Piscidiam longifoliam* W. (Daubentonia Cand.)

Ad *Lebeckiam.*

Post n. 7. *Burchellii* * 10. L. caule subscandente gracili, foliis ternatis remotis longe petiolatis, foliolis lineari-lanceolatis longe acuminatis, stipulis semisagittatis, pedunculis 2floris axillaribus elongatis. *Afric. austr.* (Otoptera Burchellii Cand. legum.

t. 42. Nil vulgatius in papilionaceis quam alas basi esse appendiculatas s. hinc dentatas.)

Ad *Rafniam amplexicaulem* Thunb. (Vascoa Cand.)

pag. 230.

*Sarcophyllum carnosum* Thunb. habet flores laterales sparsos flavos. Bot. mag. 2502.

pag. 231.

*Platylobium reticulatum* Sieb. ad *Chorizema* Cand.

Ad *Bossiaeam* Vent.

*rotundifolia* Cand. 10. B. ramis compressis foliosis, foliis obovato-subrotundis mucronatis glaberrimis. *Nov. Holl.*

Ad B. *microphyllam* R. Br. (Platylobium microphyllum Sims. bot. mag. 863., obcordatum Vent.)

pag. 233.

Ad *Tephrosiam* Pers.

*hypargyra* Cand. 41. T. caule suffruticoso erecto angulato villoso, foliis 2-4jugis supra glabris subtus argenteo-sericeis, foliolis infimis subrotundis, reliquis ovali-oblongis, terminali maximo, pedunculis axillaribus, staminibus monadelphis, leguminibus pubescentibus. *Ind. or.*

*sophoroides* Cand. 42. T. caule fruticoso, foliis 2-4jugis elliptico-oblongis acuminatis glaberrimis, racemis axillaribus. *Nepal.*

*Senna* Kunth. 43. T. caule fruticoso erecto, foliis 4jugis obovato-oblongis retusis glaucescentibus pubescentibus, racemis oppositifoliis, floribus fasciculatis, leguminibus pubescentibus. *Nov. Granat.*

*venustula* Kunth. 44. T. caule fruticoso elato, foliis 6jugis lanceolatis obtusis mucronatis pubescentibus subtus incanis, racemis oppositifoliis, floribus fasciculatis, leguminibus subcultriformibus pubescentibus. *Cumana.*

*fruticosa* Cand. 45. T. caule fruticoso scandente, foliis 5jugis ovato-oblongis acutis glabris, racemis paniculatis abbreviatis, leguminibus oblongis compressis villosis. *Ind. or.*

*brachystachys* Cand. 46. T. caule fruticoso, foliis 7jugis ellipticis obtusis subtus pubescentibus, racemis paniculatis. *Nepal.*

*suberosa* Cand. 47. T. caule fruticoso, foliis 8jugis elliptico-oblongis mucronulatis subtus pubescentibus, racemis axillaribus. *Bengal.* (Robinia Roxb.)

*candida* Cand. 48. T. caule fruticoso, foliis 10jugis elliptico-oblongis mucronulatis subtus sericeis, racemis axillaribus, leguminibus stylo elongato coronatis. *Bengal.* (Robinia Roxb.)

*Mariana* Cand. 49. T. caule suffruticoso villoso, foliis 4jugis oblongis subtus argenteo-sericeis, stipulis lanceolatis

elongatis villosis, racemis abbreviatis subsessilibus, leguminibus villosis. *Ins. Marian.*

*leucantha* Kunth. 50. T. caule fruticoso erecto pubescente, foliis sub-8jugis oblongo-linearibus obtusis mucronatis subtus canescentibus, racemis terminalibus subgeminis, leguminibus tomentosis. *Nov. Hispan.* Humb. nov. gen. 6. t. 577.

*emarginata* Kunth. 51. T. arborescens, foliis multijugis oblongo-linearibus profunde emarginatis supra appresse pubescentibus subtus argenteo-sericeis, racemis terminalibus, floribus fasciculatis, leguminibus tomentosis. *Ad Orinocum.*

Ad T. *mimosoidem* Pers. *Dalbergia Barclaii* Hook. exot. fl. t. 188. e *Madagascar.*

Post n. 24. *oroboides* Kunth. 52. T. caule fruticoso ramoso, foliis multijugis linearibus incano-pubescentibus, pedunculis sub-1floris apice foliatis, leguminibus pubescentibus. *Mexico.* Humb. nov. gen. 6. t. 578. 579.

*astragalina* Kunth. 53. T. caule fruticoso tomentoso, foliis 8-9jugis oblongis obtusis subtus leguminibusque incano-tomentosis, floribus sparsis pedunculatis. *Quito.*

pag. 235.

Post *Teramnum:*

## PUERARIA Cand.

*tuberosa* Cand. 1. P. radice tuberosa, caule fruticoso scandente, foliis ternatis ovatis acutis supra pubescentibus subtus sericeis, racemis terminalibus elongatis, leguminibus villosis. *Bengal.* (Hedysarum tuberosum Roxb. W.)

*Wallichii* Cand. 2. P. caule fruticoso, foliis ternatis ovatis acutis supra glabris subtus pubescentibus, racemis axillaribus compositis folia aequantibus. *Nepal.* Cand. legum. t. 43.

pag. 236.

Ad *Crotalariam.*

Cr. *genistoides* Lam. (Cr. spartioides Cand.)

Post n. 9. *tenuifolia* Roxb. 84. Cr. ramis angulatis dense tomentosis, foliis lineari-oblongis obtusis sericeo-villosis, stipulis subulatis deciduis, racemis laxis elongatis, vexillo subtus discolore. *Coromandel.*

*alata* Hamilt. Roxb. 85. Cr. ramis alatis, foliis breviter petiolatis ovalibus retusis tomentosis, racemis paucifloris, bracteis ovatis acutis stipitatis. *Nepal.*

*tuberosa* Hamilt. Don. 86. Cr. caule suffruticoso decumbente, foliis lanceolatis acutis margine revolutis subtus ferrugineo-tomentosis, floribus axillaribus subsessilibus, leguminibus pilosissimis. *Nepal.*

*nitens* Kunth. 87. Cr. caule suffruticoso ramoso, ramis subangulatis sericeis, foliis obovato-oblongis obtusis sub-

tus splendentibus, racemis terminalibus multifloris, leguminibus glabris. *Nov. Granat.*

*acuminata* Cand. 88. Cr. foliis linearibus acuminatis subtus ramisque sericeis, stipulis ovato-lanceolatis acuminatis petiolo brevioribus, pedunculis oppositifoliis 1-2-floris, germinibus glabris. *Afric. austr.* Burchell.

*virgulta* * 89. Cr. foliis petiolatis oblongo-linearibus mucronatis, junioribus ramulisque sericeis, stipulis nullis, racemis oppositifoliis elongatis, leguminibus pendulis. *Afric. austr.* (Cr. virgultalis Burch.)

Ad Cr. *pellitam* Bert. (Cr. Berteriana Cand.)

pag. 237.

Post n. 19. *novae Hollandiae* Cand. 90. Cr. foliis obovato-oblongis obtusis subtus ramisque sericeo-pubescentibus, petiolis apice nodoso-articulatis, stipulis nullis, racemis terminalibus. *Nov. Holl.*

Ad Cr. *spectabilem* Roth. (Cr. Leschenaultii Cand.)

*stipularis* Desv. 91. Cr. foliis ovalibus obtusis cauleque erecto villosis, stipulis ovatis acuminatis ad latas internum excisis late decurrentibus, bracteis linearibus acuminatis. *Cayenn.*

*pterocaula* Desv. 92. Cr. foliis lineari-lanceolatis acutis sericeis, stipulis obtusis decurrentibus, leguminibus glabris. *Amer. tropic.*

*Genistella* Kunth. 93. Cr. foliis lanceolatis acutis subtus argenteis, stipulis abbreviatis acutis decurrentibus, racemis axillaribus terminalibusque multifloris. *Nov. Granat.*

*Espadilla* Kunth. 94. Cr. foliis lanceolatis obtusis utrinque flavo-sericeis, stipulis late triangularibus falcatis acuminatis decurrentibus, racemis oppositifoliis paucifloris. *Nov. Granat.*

Post n. 21. *prostrata* Roxb. 95. Cr. caule prostrato ramoso foliisque subrotundis pilosis, stipulis linearibus, racemis paucifloris, bracteolis brevissimis. *Nepal.*

pag. 238.

Post n. 29. *Burmanni* Cand. 96. Cr. caule erecto superne diviso, foliis oblongo-linearibus obtusis mucronatis sericeo-villosis, stipulis setaceis, floribus terminalibus subracemosis. *Ind. or.* (Cr. sericea N. L. Burm. fl. ind. t. 48. f. 1.)

Ad Cr. *parviflorum* Roth. Cr. *breviflora* Cand. e *Brasilia* pertinere videtur.

pag. 239.

Ad Cr. *pusillam* Roth. Cr. *pumila* Schrank.

Ad Cr. *medicagineam* Lam. Cr. *virgata* Roxb. Schrank.

Ad Cr. *bituminosam* * (Fagelia Neck. Cand., Cr. glycinea Lam.)

Ad Cr. *uncinellam* Lam. Cr. *sphaerocarpa* et *senegalensis* Cand.

*cytisoides* Roxb. 97. Cr. foliolis ellipticis utrinque attenuatis subtus pubescentibus, stipulis exiguis subulatis, ra-

cemis oppositifoliis, carina rostrata, leguminibus acinaciformibus tomentosis. *Nepal.* (Cr. psoraleoides Don.)

*macrostyla* Don. 98. Cr. foliolis obovatis retusis coriaceis subtus ramulisque sericeo-villosis, racemis axillaribus, leguminibus ovatis compressis 1spermis villosissimis, stylo longissimo plumoso. *Nepal.*

*cylindrocarpa* Cand. 99. Cr. caule erecto paniculato, foliolis elliptico-oblongis subtus ramulisque subpubescentibus, racemis oppositifoliis, leguminibus cylindricis polyspermis stylo apiculatis. *Senegambia.*

*anagyroides* Kunth. 100. Cr. arborescens, foliolis oblongo-lanceolatis acutis subtus ramulisque sericeis, stipulis minutis subulatis, racemis oppositifoliis multifloris, leguminibus polyspermis. *Caracas.*

*mollicula* Kunth. 101. Cr. fruticosa, foliolis lanceolatis obtusis venosis villosis subtus canescentibus, stipulis subfalcatis subulatis, racemis multifloris, calycibus sericeis, corollis glabris. *Mexico.*

*litoralis* Kunth. 102. Cr. suffruticosa procumbens, foliolis obovato-oblongis emarginatis appresso-pubescentibus, stipulis minimis subulatis, pedunculis sub-6floris, leguminibus pubescentibus. *Cuba.* (Cr. pumila Ort.)

*cajanifolia* Kunth. 103. Cr. fruticosa (?), foliolis oblongo-lanceolatis obtusis submucronatis supra glabris subtus ramulisque angulatis appresso-pubescentibus, stipulis capillaribus, racemis multifloris, leguminibus polyspermis pilosis. *Mexico. Ad Orinocum.* (Cr. maypurensis Kunth., setifera Cand.)

*bracteata* Roxb. 104. Cr. foliolis oblongis utrinque attenuatis superne glabris subtus pubescentibus, stipulis nullis, racemis oppositifoliis, bracteis reflexis, leguminibus dense hirsutis. *Ind. or.*

pag. 240.

Ad Cr. *vitellinam* Ker. Cr. *holosericea* Nees. Mart.

Ad Cr. *incanam.* Cr. *hirta* Lag., *cubensis* Cand. . Cr. *Dombeyana* Cand. leguminibus duntaxat glabriusculis differt. Nec Cr. *affinem* Cand. diversam reor.

Post n. 69. *lupulina* Kunth. 105. Cr. erecta ramosa, foliolis oblongo-linearibus obtusis mucronatis supra scabris subtus pubescentibus, stipulis capillaribus, racemis oppositifoliis, leguminibus polyspermis. *Mexico.*

†*striata* Cand. 106. Cr. foliolis ellipticis obtusis mucronatis glabriusculis, stipulis nullis, racemo terminali, floribus pendulis. *Ind. or.*

*podocarpa* Cand. 107. Cr. erecta hirsuta, foliolis obovatis obtusis mucronatis, stipulis dimidiato-oblongis acutis, racemis oppositifoliis, leguminibus stipitatis glabris polyspermis. *Afric. media.*

pag. 241.

Cr. *longifolia* Lam. est *Neurocarpon* Desv.

pag. 242.

Ad *Coluteam.*

Post n. 3. *nepalensis* Sims. 6. C. fruticosa, foliolis subrotundo-ellipticis retusis, racemis paucifloris nutantibus, callis vexilli papillaeformibus, leguminibus subcoriaceis pubescentibus. *Nepal.* Bot. mag. 2622.

C. *caspica* M. B. (Sphaerophysa Cand.)

C. *davurica* M. B. (Sphaerophysa Cand.)

Ad *Sutherlandiam* R. Br.

*microphylla* Burch. Cand. 4. S. frutescens, foliolis oblongo-linearibus ramisque pubescentibus, pedunculis 2-3floris. *Afric. austr.*

Ad *Lessertiam obtusatam* *. (L. fruticosa Lindl. in bot. reg. 970.)

pag. 243.

Ad *Lessertiam* Cand.

*diffusa* R. Br. 9. L. herbacea diffusa, foliolis 8-10jugis elliptico-linearibus subemarginatis utrinque hirsutiusculis, racemis pedunculatis folia superantibus, calycibus ebracteatis nigro-pilosis. *C. B. S.* (Galega dubia Jacqu.)

*macrostachya* Cand. 10. L. basi suffruticosa erecta, foliolis 4-6jugis elliptico-oblongis obtusis utrinque subpubescentibus, racemis paniculatis laxis folia longe superantibus. *Afric. austr.*

*brachystachya* Cand. 11. L. basi suffruticosa erecta, foliolis 6-8jugis oblongo-linearibus obtusis subtus subpubescentibus, racemis folio triplo brevioribus, leguminibus pendulis. *Afric. austr.*

*falciformis* Cand. 12. L. herbacea erecta, foliolis 8jugis linearibus acutiusculis, pedunculis axillaribus paucifloris patentibus, leguminibus falciformibus. *Afric. austr.?* Cand. legum. t. 46.

Ad *Erythrinam.*

Post n. 7. *rubrinervia* Kunth. 21. E. foliolis subrotundo-ovatis acuminatis subtus glaucis rubro-venosis pilosiusculis, calycibus spathaceis supra fissis. *Nov. Granat.*

*umbrosa* Kunth. 22. E. foliolis triangulari-ovatis trinerviis glaberrimis, calycibus campanulatis spathaceis. *Caracas.*

Ad E. *Humeanam* * lege E. caffra *Bot. reg.*

pag. 244.

Ad *Rudolphiam* W.

*dubia* Kunth. 3. R. foliis subsagittato-cordatis acuminatis membranaceis glabris, petiolis articulatis marginatis, pedunculis 1floris, leguminibus longissime rostratis. *Nov. Granat.* (Glycine sagittata W. Syst. 3. 197.)

pag. 245.

Ad *Bönninghausiam vincentinam* * (Chaetocalyx vincentinus Cand.)

Post *Gronen* Lour.:

## PAROCHETUS Hamilt.

*communis* Hamilt. 1. P. reptans, foliis ternatis, foliolis truncatis dentato-serratis. *Nepal.*

*major* Hamilt. 2. P. erectiusculus, foliis ternatis, foliolis obovatis retusis crenatis. *Nepal.*

## ODONIA Bertol.

*tomentosa* Bertol. 1. O. scandens, foliis ternatis ellipticis utrinque tomentosis, racemis axillaribus. *Hispaniol.* Opusc. scientif. 4. p. 334.

*speciosa* * 2. O. erecta, foliis ternatis oblongis subcoriaceis supra nitidis, floribus subracemosis terminalibus. *Peru.* (Cytisus speciosus Lois., Collaea Cand. legum. t. 40.)

† *trinervia* * 3. O. erecta, foliis ternatis ellipticis obtusis supra pubescentibus subtus subtomentosis 3nerviis, pedunculis subsolitariis abbreviatis, laciniis calycis reflexis, leguminibus villosissimis. *Ind. or.* (Collaea trinervia Cand. legum. t. 41.)

## DUMASIA Cand.

*villosa* Cand. 1. D. ramis volubilibus petiolisque villosis, foliis ternatis ovato-oblongis acutiusculis, racemis axillaribus multifloris. *Nepal.* Cand. legum. t. 44. (Hedysarum tiliaefolium Don.?)

*pubescens* Cand. 2. D. ramis volubilibus petiolisque subpubescentibus, foliis ternatis ovato-ellipticis obtusis, racemis axillaribus paucifloris. *Nepal.* Cand. legum. t. 45.

## SABINEA Cand.

*florida* Cand. 1. S. floribus praecocibus, foliolis 8jugis elliptico-oblongis. *Ins. Carib.* (Robinia florida Vahl. Syst. 3. p. 246.)

*dubia* Cand. 2. S. floribus serotinis, foliolis 8jugis elliptico-oblongis, leguminibus stylo cirriformi coronatis. *Martinic.* (Robinia dubia Lam. Syst. 3. 246. R. martinicensis Pers.)

## ROBINIA

juxta characterem genericum exacte sumtum non amplectitur nisi tres veras species:

R. *Pseudacaciam*, *viscosam* et *hispidam*.

Valde dubiae sunt: R. *aturensis* *, *macrophylla* *, *glycyphylla* Poir., *amara* et *flava* Lour.

Sub *Swartzia* militat Robinia *tomentosa* Poir., sub *Cupania*, R. *rubiginosa* Poir., sub *Dalbergia* R. *scandens* W., sub *Turpinia*, R. *glandulosa* *.

## CARAGANA Lam.

complectitur Robiniam *frutescentem*, *pygmaeam*, *grandifloram* et *mollem* M B., tum *tragacanthoidem* Pall., *Chamlagu* Herit., *spinosam*, *Altaganam jubatam* et *Caraganam*, quae *Caragana arborescens* Cand. audit.

*microphylla* Cand. 11. C. foliolis sub-6jugis incanis retusis, petiolo stipulisque apice spinescentibus, radice repente. *Sibir.* (Robinia microphylla Pall.)

## CORYNITIS *.

(Corynella tolerari nequit, cum graeca vox κορύνη cum appendicula latina *ella* haud jungenda sit: κορυνῖτις vero auctoritatem classicam habet.)

*domingensis* * (Robinia domingensis Syst. S. 245. Corynella paucifolia Cand. Character specificus a Candolleo enunciatus a veritate aberrat.)

*polyantha* * (Robinia polyantha Sw. Syst. S. 246.)

## HALIMODENDRON Cand.

*argenteum* Cand. (Robinia Halodendron Pall. Syst. S. 246.)

### pag. 249.

Ad *Dolichon.*

D. *tetragonolobus.* (Psophocarpus Neck. Cand.)

D. *luteolus* Jacqu. (Vigna glabra Sav. mem. phaseol. S. p. 8. Cand.)

Post n. 18. *glycinoides* Kunth. 51. D. racemis axillaribus paucifloris longe pedunculatis, calycis lacinia superiore latissima emarginata, foliolis ovato-oblongis obtusis mucronatis 3nerviis ramisque volubilibus strigillosis. *Peru.*

*miniatus* Kunth. 52. D. racemis longissime pedunculatis, calycis lacinia superiore maxima, leguminibus 3carinatis oligospermis, foliolis subrotundis coriaceis reticulato-venosis ramisque volubilibus glabris. *Cuba.* (Canavalia Cand.)

D. *gladiatus* Jacqu. (Malocchia Sav. Canavalia Cand.)

### pag. 250.

D. *ensiformis* et *lineatus* Thunb. (Canavalia Cand.)

D. *giganteus* W. et *altissimus* sunt *Stizolobia* P. Br.

### pag. 251.

D. *ruber* Jacqu. est *Hymenospron* *.

D. *rotundifolius* Vahl. (Canavalia obtusifolia Cand.)

D. *minimus* est *Glycine* Kunth.

D. *fabaeformis* Herit. (Cyamopsis psoraloides Cand.)

pag. 252.

Ad *Stizolobium* P. Br.

*altissimum* * 14. (Dolichos altissimus Syst. 3. 250. Mucuna Cand.)
*giganteum* * 15. (Dolichos giganteus W. Syst. 3. 250. Mucuna Cand.)
*Mutisianum* * 16. St. volubile, foliolis oblongis glabriusculis, lateralibus subdimidiatis, racemis subcapitatis, bracteis ovatis obtusis fuligineo-tomentosis. *Nov. Granat.* (Negretia Kunth.)
*molle* * 17. St. volubile, foliolis ellipticis acutis villoso-tomentosis, lateralibus subdimidiatis, racemis capitato-globosis, bracteis acutis sericeis, leguminibus acinaciformibus tomentosis. *Nov. Granat.* (Negretia Kunth.)
*macroceras* * 18. St. volubile, foliolis ovatis acutiusculis supra laevibus subtus pubescentibus, spicis axillaribus longissimis, leguminibus latis oligospermis. *Brasil.* (Macroceratides Pseudo-Stizolobium Radd. mem. di Modena, 18. p. 392. t. 5. f. 5.)

pag. 253.

Post *Stizolobium*:

## Pachyrrhizos Rich.

(Radices tuberosae)

*tuberosus* * 1. (Dolichos tuberosus Lam. Stizolobium Syst. 3. 252.)
*angulatus* Rich. Cand. 2. (Dolichos bulbosus L. Stizolobium Syst. 3. 252.)
*montanus* Cand. 3. (Dolichos montanus Lour. Stizolobium Syst. 3. 252.)
*trilobus* Cand. 4. P. volubilis, foliolis trilobis acuminatis pubescentibus, spicis elongatis, leguminibus linearibus. *China. Cochinchina.* (Dolichos trilobus Lour.)

Ad *Phaseolum*.

Post n. 6. *cirrosus* Kunth. 84. Ph. volubilis cirrosus, foliolis ovatis obtusis scabriusculis, racemis longissime pedunculatis, bracteis acutis calycem aequantibus, calycis lobis rotundatis. *Mexico.*
*puberulus* Kunth. 85. Ph. volubilis pubescens, foliolis ovatis cuspidatis, racemis pedunculatis axillaribus, leguminibus lanceolato-cultriformibus glabris. *Caracas.*
*truxillensis* Kunth. 86. Ph. volubilis retrorsum pilosus, foliolis subcordato-ovatis acuminatis appresso-pubescentibus, racemis longe pedunculatis, bracteis parvis deciduis, calycis lobo superiori latissimo emarginato. *Peru.*
*speciosus* Kunth. 87. Ph. volubilis pubescens, foliolis ovatis cuspidatis subtus tomentosis, pedunculis elongatis paucifloris, calycis lobo superiore maximo emargi-

nato, reliquis acutis, floribus maximis. *Ad Orinocum.*

Ad Ph. *Pallar* Molin. (Ph. pilofus Kunth.)

Ad Ph. *inamoenum.* Ph. *derafus* Schrank. et *Xuarefii* Zuccagn. varr.

pag. 254.

Ad Ph. *vulgarem.* Ph. *compreffus* Cand. (romanus Sav.), *oblongus, faponaceus, tumidus, haematocarpus, fphaericus, gonofpermus* Sav. varr.

*formofus* Kunth. 38. Ph. volubilis retrorfum hifpidulus, foliolis triangularibus mucronatis pilofiusculis, racemis longiffime pedunculatis, bracteis fubrotundis nervofis calycem aequantibus. *Nov. Hifpan.* (Ph. fylveftris Kunth.)

*pedunculatus* Kunth. 39. Ph. volubilis retrorfum hifpidulus, foliolis ovatis acuminatis glabriusculis ad marginem pilofis, racemis longiffime pedunculatis, calycis lobo fuperiori abbreviato emarginato, leguminibus elongatis linearibus. *Nov. Granat.*

*linearis* Kunth. 40. Ph. fubvolubilis retrorfum pilofiusculus, foliolis fubcordato-linearibus obtufis mucronatis hifpidiusculis, racemis longiffime pedunculatis, calycis lobo fuperiori latiffimo emarginato. *Amer. auftr.*

Ph. *vexillatus.* (Dolichos Kunth.)

pag. 256.

Ad *Clitoriam.*

Cl. *falcata* Lam. et *rubiginofa* Juff. pertinent ad Nevrocarpon Desv.

*anguftifolia* Kunth. 13. Cl. volubilis glabra, foliolis lineari-lanceolatis obtufis mucronatis, pedunculis axillaribus fubfolitariis 1floris, dentibus calycis 2bracteati fuperioribus breviffimis. *Ad Orinocum.*

*formofa* Kunth. 14. Cl. volubilis glabra, foliolis oblongis obtufis mucronatis, pedunculis axillaribus 1floris, bracteis oblongis calycem multo fuperantibus, dentibus calycis 4 fuperioribus breviffimis. *Ad Orinocum.*

Cl. *multiflora* Sw. (Vilmorinia Cand.)

Cl. *polyphylla* Poir. 15. (Galactia pinnata Perf. Syft. 3. 257. Barbiera polyphylla Cand. legum. t. 39.)

pag. 257.

Ad *Galactiam* P. Br.

Ante n. 1. *fimplicifolia* * 11. G. caule fuffruticofo procumbente, foliis fimplicibus oblongis obtufis fubtus ftrigofis, pedunculis axillaribus geminis, calycibus nervofis. *Popayan Columbiae.* (Cologania procumbens Kunth.)

Poft n. 5. 6. *pulchella* * 12. G. volubilis, foliis ternatis oblongis obtufis utrinque ftrigillofis fubtus glaucefcentibus, pedunculis axillaribus geminis, calycibus

hirſutis. *Nov. Hiſpan. Ad fl. Amazonum.* (Cologania pulchella et ovalifolia Kunth.)

*mexicana* * 13. G. volubilis, *foliis ternatis oblongo-linearibus* ſubtus ſtrigoſis, pedunculis geminis axillaribus, calycibus piloſis. *Mexico.* (Cologania anguſtifolia et intermedia Kunth.)

G. *piloſa* Nutt. (G. cubenſis Kunth. *Cuba.*)

*Juſſievana* Kunth. 14. G. ſuffruticoſa repens, foliis ternatis ellipticis ſubcoriaceis utrinque ſericeis ſubtus ſubtomentoſis, floribus axillaribus breviter pedunculatis ſubracemoſis, calycibus argenteo-ſericeis. *Ad Orinocum.*

*glaucescens* Kunth. 15. G. ſuffruticoſa erecta, foliis ternatis elliptico-oblongis obtuſis coriaceis glabris ſupra nitidis ſubtus glaucescentibus, racemis axillaribus congeſtis, calycibus leguminibusque ſericeis. *Quito.*

Poſt *Galactiam:*

## Hymenostron *.

*ſericeum* * 1. H. volubile, foliis ternatis ſubcordato-ellipticis mucronatis ſupra pubeſcentibus ſubtus calycibus leguminibusque ſericeis. *Nov. Granat.* (Dioclea ſericea Kunth.) *)

† *apurenſe* * 2. H. volubile, foliis ternatis ovato-oblongis mucronatis glabris, nervo venisque ſubtus ſtrigilloſis, leguminibus piloſiuſculis. *Ad Orinocum.* (Dioclea apurenſis Kunth.)

*rubrum* * 3. H. volubile, foliis ternatis ovatis acutis glabris, racemis laxis. *Martinic.* (Dolichos ruber Jacqu. Syſt. 3. 251., Dioclea Jacquiniana Cand.)

### pag. 260.

Ad *Orobum fruticoſum* Perſ. (Courſetia tomentoſa Cand.)

*paſtoenſis* * 37. O. caule fruticoſo, foliis elliptico-ſubrotundis ſubtus incano-villoſis, racemis longe pedunculatis folia aequantibus. *Alp. paſtoenſes Nov. Granat.* (Sesbania dubia Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 660., Courſetia Cand.)

### pag. 263.

Ad *Lathyrum.*

Poſt n. 20. † *bruttius* Tenor. 44. L. cirris 2phyllis, foliolis oppoſitis elliptico-oblongis, ſtipulis ſemiſagittatis ſe-

---

*) Dioclea * *Syſt.* 1. 556. . . „Diocles n'eſt presque connu, que pour avoir deſigné les haricots ſous le nom de Dolichos.“ Cand. legum. p. 380. Contra Diocles celeberrimus fuit auctor *ῥιζοτομικοῦ* (Schol. Nicandr. ther. v. 647.). Scripſit *περὶ ὑγιεινῶν πρὸς Πλείσταρχον*, in quo dedit *τῶν ὀσπρίων κατάλογον*. (Galen. fac. alim. 1. p. 308. 317. ed. Baſil. graec.) Secundus aetate famaque poſt Hippocratem. Plin. 26, 6. Plura fragmenta ſervavit Oribaſius, crebro ſententias ejus citat Athenaeus.

taceis, caule angulato nudiusculo leguminibusque glabris. *Calabria citerior.*
Ad L. *fylvestrem.* (L. longifolius Tenor.)

pag. 267.

Ad *Viciam.*

Post n. 85. *humilis* Kunth. 67. V. foliolis sub-2jugis linearibus obtusiusculis mucronulatis venulosis, stipulis semisagittatis. *Mexico.* Humb. nov. gen. 6. t. 581.
Ad V. *gramineam* Sm. V. *andicola* Kunth. in Humb. nov. gen. 6. t. 582. et *setifolia* Ej.

pag. 268.

Post n. 50. *pulchella* Kunth. 68. V. foliolis linearibus angustissimis acutis, stipulis semisagittatis, pedunculis multifloris folia superantibus. *Mexico.* Humb. nov. gen. 6. t. 583.

pag. 271.

*Lipariae*

unica species est *sphaerica.* Reliquae *Priestleyae* Cand. quibus accedit P. *ericaefolia* Cand. (Borbonia Syst. 3. 186.)

pag. 272.

Ad *Poiteam* Vent.

*Campanilla* Cand. 3. (Robinia latifolia Poir. Syst. 3. 247.)

Ad *Sesbanam* Poir.

S. *grandiflora* Poir. (Agati Rheed. Cand.)
S. *aculeata* Poir. (S. exasperata Kunth.)
Ad S. *pictam* Poir. S. *pachycarpa*, *leptocarpa*, *punctata*, *pubescens* Cand., *macrocarpa* Elliott. varr.
Ad S. *cannabinam* Poir. S. *paludosa* Jacqu. fil., *gracilis et affinis* Schrad. varr.

pag. 273.

Ad *Indigoferam.*

Post n. 9. *monophylla* Cand. 88. I. foliis obovatis mucronatis venosis incanis basi stipulatis, racemis folia superantibus, corollis leguminibusque rufo-villosis. *Nov. Holl.*
*diphylla* Vent. 89. I. foliis ovatis, altero terminali, laterali altero minori, racemis folia aequantibus, leguminibus oligospermis. *Afric. occid.*
Post n. 13. *peregrina* Cand. 90. I. foliolis oblongo-linearibus acutis supra pubescentibus subtus punctatis, floribus geminis axillaribus subsessilibus, leguminibus 4gonis. *Ind. or.* (Lotus peregrinus N. L. Burm.)
*virgata* Cand. 91. I. foliolis obcordatis aristatis subcoriaceis supra glabris subtus pubescentibus, racemis subspicatis folia brevioribus, calycibus villosis. *Ind. or.*

pag. 274.

Poſt n. 25. *Leſchenaultii* Cand. 92. I. foliolis ovalibus obtuſis, impari majori, racemis multifloris ſubſeſſilibus, leguminibus 4gonis. *Bengal.*

† *timorenſis* Cand. 93. I. foliolis obovato-oblongis caneſcentibus, racemis axillaribus petiolos aequantibus, leguminibus 4gonis. *Inſ. Timor.*

*diverſifolia* Cand. 94. I. foliolis oblongis caneſcentibus, terminali longiori, pedunculis paucifloris petiolos ſubexcedentibus, leguminibus deflexis pubeſcentibus. *Inſ. Maſcaren.*

*gracilis* * 95. I. caule diffuſo ramoſiſſimo glabriuſculo, foliolis ellipticis mucronatis ſupra glabris ſubtus ſtrigilloſis, ſtipulis ſubulatis, racemis paucifloris, leguminibus hirſutis reflexis oligoſpermis. *C. B. S.*

*complanata* Reichenb. 96. I. ramis ancipitibus, foliolis lanceolato-linearibus acutis ſubtus argenteis breviſſime appreſſo-ſtrigilloſis, racemis multifloris terminalibus, calycibus albis. *C. B. S.*

pag. 276.

Poſt n. 48. *angulata* Lindl. 97. I. ramis angulatis purpureis folioliaque ſub-4jugis ovalibus emarginatis glabris, racemis folia aequantibus. *Nov. Holl.* Bot. reg. 991.

*atropurpurea* Roxb. 98. I. foliolis ovalibus retuſis piloſiuſculis, racemis elongatis, leguminibus ſtrictis mucronatis. *Ind. orient. Nepal.* (I. Thibaudiana et leptoſtachya Cand.)

*Doſua* Hamilt. 99. I. foliolis ovalibus retuſis utrinque ramulisque denſe rufo-piloſis, ſpicis axillaribus folio brevioribus, ſtipulis linearibus hiſpidis. *Nepal.*

*galegoides* Cand. 100. I. foliolis ellipticis mucronatis utrinque ſubpubeſcentibus, racemis folio brevioribus, leguminibus erectis ſtrictis polyſpermis. *Ceilon.*

*tephroſioides* Kunth. 101. I. foliolis alternis oblongo-linearibus obtuſis ariſtatis ſubtus ſericeo-ſtrigoſis, racemis longiſſime pedunculatis, leguminibus pendulis 4gonis oligoſpermis. *Quito.* Humb. nov. gen. 6. t. 580.

*truxillenſis* Kunth. 102. I. foliolis oblongis obtuſis mucronatis utrinque ſtrigoſis, ramulis ferrugineis, racemis ſubſeſſilibus multifloris folio brevioribus, leguminibus ſubfalcatis oligoſpermis. *Peru.*

*leſpedezioides* Kunth. 103. I. foliolis ſpathulatis mucronatis ſtrigilloſis ſubtus glauceſcentibus, racemis multifloris folia ſuperantibus, leguminibus reflexis ſub-8ſpermis. *Mexico.*

*humilis* Kunth. 104. I. procumbens ſericea, foliolis oblongis acutiuſculis rigidis, racemis paucifloris folia longe ſuperantibus, leguminibus reflexis teretiuſculis ſub-2ſpermis. *Peru.*

pag. 277.

Poſt n. 64. *heterotricha* Cand. 105. I. caule uncinato-ſetoſo, foliolis obovatis mucronatis ſtrigoſis, racemis pe-

pag. 295.

Ad. *Aſtragalum.*

Poſt n. 86. *Aboriginum* Richardſ. 222. A. ſuffruticoſus erectus, foliis 6jugis lanceolato-linearibus incano-pubeſcentibus, racemis axillaribus laxis folia ſuperantibus. *Amer. arctic.* Aborigines veſcuntur radicibus.

pag. 297.

Poſt n. 56. *ſtipulatus* Don. 223. A. foliolis obovato-oblongis mucronatis glabris, ſtipulis maximis oblique cordatis, racemis ſpicatis tenuifloris folia ſubſuperantibus, leguminibus compreſſis cernuis. *Nepal.* Bot. mag. 2380.

pag. 299.

Poſt n. 79. *macrorrhizus* Don. 224. A. foliolis ovalibus mucronatis ſubtus pubeſcentibus, ſtipulis connatis, pedunculis 3floris axillaribus folia excedentibus, leguminibus ſubulatis ſericeis. *Nepal.*

pag. 301.

Poſt n. 105. *ſucculentus* Richardſ. 225. A. decumbens glabriuſculus, foliolis ovalibus obtuſis, ſtipulis 3angularibus, ſpicis confertis pedunculatis folio brevioribus. *Amer. arctic.*

pag. 302.

Poſt n. 113. *bidentatus* Kunth. 226. A. erectiuſculus, foliolis lineari-oblongis emarginato-2dentatis glabris, ſtipulis vaginantibus, racemis compactis folia ſuperantibus. *Amer.?* Humb. nov. gen. 6. t. 584.

pag. 304.

A. *reptans* Humb. videtur varietas culta glabriuſcula A. *ſtriguloſi* Kunth.

pag. 305.

Poſt n. 158. *nubigenus* Don. 227. A. foliolis ovalibus mucronatis denſe piloſis, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus, calycibus inflatis, leguminibus villoſiſſimis. *Nepala.*

pag. 306.

Poſt n. 171. *arcticus* * 228. A. ſubacaulis ſericeus, foliolis ovali-oblongis, ſtipulis petiolaribus, faſciculis paucifloris, leguminibus erectis oblongis acuminatis. *Inſ. Melvill.* (Oxytropis R. Br.)

pag. 310.

Ad *Kennediam* Vent.

Post n. 1. *cordata* Lindl. 7. K. foliis cordatis late ovatis acutiusculis, racemis multifloris. *Nov. Holl.* Bot. reg. 944.

K. *Comptoniana* Link., non *.

*tabacina* Labill. 8. K. foliolis ovato-oblongis mucronatis pilosiusculis, ramis retrorsum pilosis, racemis folia superantibus. *Nov. Caledon.*

Ad *Stylosanthen* Sw.

Post n. 1. *humilis* Kunth. 8. St. caule fruticoso ramoso hinc pubescente, foliolis oblongis ciliatis, stipulis hispidis, floribus aggregatis bracteatis, leguminibus reticulatis stylo uncinato terminatis. *Ad Orinoc.* Humb. nov. gen. 6. t. 594.

*glutinosa* Kunth. 9. St. caule herbaceo procumbente foliolisque oblongis glutinoso-pilosis, floribus axillaribus sessilibus solitariis. *Nov. Hispan.* Humb. nov. gen. 6. t. 595.

*gracilis* Kunth. 10. St. caule herbaceo erecto hinc pubescente, foliolis linearibus pubescentibus, stipulis hispidis, capitulis involucratis, leguminibus glabris apice uncinatò-aristatis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 6. t. 596.

pag. 311.

Ad *Zorniam* Mx.

*thymifolia* Kunth. 7. Z. fruticosa, foliis conjugatis oblongis subtus pubescentibus margine calycibus bracteisque glanduloso-punctatis, fructibus muricatis. *Mexico.*

*pubescens* Kunth. 8. Z. herbacea ramosa, foliis conjugatis oblongo-lanceolatis utrinque pubescentibus, bracteis ovatis punctatis ciliatis, fructibus 5-6articulatis muricatis. *Ad fl. Magdalen.*

*glochidata* Reichenb. 9. Z. herbacea ramosa, foliis conjugatis linearibus, bracteis sagittato-ovatis 5nerviis ciliatis, fructibus glochidato-aculeatis. *Senegambia. Guiana.* (Z. gracilis Cand.)

*dictyocarpa* Cand. 10. Z. herbacea, foliis conjugatis lanceolatis, bracteis sagittato-ovatis acuminatis subglandulosis ciliatis, fructibus inermibus glabris reticulatis. *Nov. Holl.*

Z. *diphylla* Pers. in duas species a Smithio (Rees cyclop.) dirimitur, orientalem alteram, alteram occidentalem. Illa, Z. *angustifolia* Sm. distinguitur bracteis punctato-glandulosis et fructus aculeis retrorsum scabris. Haec Z. *reticulata* Sm. differt bracteis reticulatis eglandulosis et fructus aculeis glabris.

Z. *tetraphylla* Mx. (Myriadenus tetraphyllus Desv. Cand.)

Z. *pulchella* et *elegans* Pers. (Phyllodium Desv., Dicerma Cand.)

Ad *Hedysarum.*

H. *maculatum.* Desmodium Perrottetii Cand. var.

Post n. 1. *Oliverii* * 129. H. fruticosum incano-pubescens, foliis orbiculatis mucronatis glaucis, racemis paucifloris laxis. *Ad Euphratem.* (H. nummularifolium Cand. in ann. sc. nat. 4. p. 102., Taverniera nummularia Cand. legum. t. 52.)

pag. 312.

H. *spartium.* (Taverniera Cand.)

H. *biarticulatum.* (Dicerma Cand.)

*angustifolium* Kunth. 130. H. fruticosum, ramis virgatis, foliis lineari-lanceolatis mucronatis subtus pubescentibus, racemis solitariis, bracteis ciliato-hispidis, lomentis 1-6articulatis hispidulis. *Mexico.*

H. *barbatum.* (Nicolsonia cayennensis Cand. legum. t. 51.)

H. *lappaceum* Forsk. (Taverniera Cand.)

*infractum* * 131. H. caule angulato flexuoso-infracto, foliolis stipulisque ovatis acutis, racemis axillaribus simplicibus pubescentibus, lomentis glabris. *Mexico.* (Desmodium Cand.)

*molliculum* Kunth. 132. H. suffruticosum ramosum villosum, foliolis subrotundis mucronatis, terminali retuso, racemis laxifloris, lomentis uncinato-hispidulis. *Patria?*

*venustulum* Kunth. 133. H. suffruticosum appresso pubescens, foliolis oblongo-ellipticis subtus sericeis glaucescentibus, racemis terminalibus sessilibus abbreviatis, calycibus barbatis, lomentis hispidiusculis. *Cumana.* (Nicolsonia Cand.)

*rhombifolium* Ell. 134. H. herbaceum pubescens, foliis rhomboideis obtusis subcoriaceis reticulato-rugosis, floribus paniculatis, lomenti articulis venosis pubescentibus. *Carolina.*

*lineatum* Mx. 135. H. herbaceum repens, ramis viridi-lineatis, foliis subsessilibus, foliolis subrotundis glabriusculis, racemis elongatis laxis parvifloris, lomenti articulis lenticularibus. *Carolina.*

*Wade* Vand. 136. H. suffruticosum, foliolis ovato-lanceolatis ciliatis, racemis oppositifoliis longissimis, pedicellis ternis, lomentis scabris 3articulatis. *Brasil.*

Post n. 11. *tuberculosum* Labill. 137. H. radice tuberculosa, suffruticosum, foliis simplicibus ternatisque obovatis subtus pilosiusculis, stipulis 2fidis cuspidatis, racemis erectis terminalibus aggregatis, lomentis pubescentibus. *Nov. Caledon.*

*sambuense* Don. 138. H. fruticosum, foliolis subrotundo-ovalibus mucronulatis villosis subtus canescentibus, stipulis lanceolatis mucronatis, racemis secundis, dente calycis superiori latiori emarginato. *Nepal.*

*timorense* *. 139. H. fruticosum, foliolis rhombeis supra pubescentibus subtus incano-villosis, lateralibus multo minoribus, racemis plurimis paniculatis, leguminibus pubescentibus. *Ins. Timor.* (Desmodium Cand.)

*gyroides* Roxb. 140. H. fruticosum, foliolis ellipticis pilosiusculis, terminali maximo, racemis plurimis in paniculam dispositis, leguminibus hirsutis. *Ind. or.*

pag. 313.

H. *uncinatum* Jacqu. (H. caripense Kunth.) H. *ancistrocarpon* Ledeb. var.

*stipulaceum* Sess. 141. H. caule erecto ramoso piloso, foliolis ovatis obtusiusculis, stipulis horizontalibus oblique ovato-lanceolatis acuminatis ciliatis, racemis terminalibus subpaniculatis. *Mexico.* (Desmodium Cand.)

*Alamani* * 142. H. caule erecto angulato ramoso foliolisque ovatis acutis glabriusculis, stipulis lanceolatis acuminatis patulo-reflexis, racemi terminalis pedicellis geminis, bracteis lanceolatis caducis, lacinia calycis inferiore elongata. *Mexico.* (Desmodium Cand.)

pag. 314.

H. *boreale* Nutt. per omnem *Amer. arcticam* crescit. H. *Mackenzii* Richards. in Franklin's journ. p. 745.

pag. 315.

Post n. 46. *Razumovianum* Fisch. Cand. 143. H. caule erecto herbaceo, foliolis oblongo-linearibus utrinque subpubescentibus, spicis pedunculatis folia superantibus, alis calyce duplo longioribus carina dimidio brevioribus, lomenti articulis incanis reticulato-subrugosis. *Deserta Orenburg.*

*altaicum* Fisch. 144. H. caule erecto, foliolis elliptico-oblongis subtus appresse pubescentibus, spicis oblongis folia superantibus, alis calyce longioribus carinam subaequantibus, germinibus pubescentibus 2articulatis. *Imaus.*

*venustum* Fisch. 145. H. caule erecto, foliolis ellipticis utrinque appresse pubescentibus incanis, spicis oblongis folia subsuperantibus, alis calycem subaequantibus carina vexillum superante brevioribus, leguminibus villosis. *Ad Imaum.*

*lasiocarpon* Ledeb. 146. H. caule erecto, foliolis ovato-lanceolatis subpubescentibus, racemis elongatis axillaribus, bracteis pedicellos superantibus, carina vexillum alas aequans excedente, lomentis pilosis. *Imaus.*

*rytidocarpon* Cand. 147. H. caule ascendente, foliolis ellipticis obtusis subtus pubescentibus, racemis spicatis ovatis pedunculatis, alis calyce duplo longioribus, vexillo carinam superante, lomentis rugoso-reticulatis. *Sibir.*

*splendens* Fisch. 148. H. caule abbreviato, foliolis sub-8jugis ovatis argenteo-sericeis, pedunculis scapiformibus elongatis racemiferis, bracteis pedicellos excedentibus, alis calyce brevioribus, lomentis reticulatis sericeis. *Sibir.*

H. *Vespertilionis.* (Christia lunata Mönch., Lourea Vespertilionis Desv. Cand.)

pag. 316.

Poſt n. 57. *arboreum* Hamilt. 149. H. arboreſcens, foliolis ovalibus retuſis ramulisque hirſutiſſimis, ſtipulis cordatis amplexicaulibus cuſpidatis, racemis elongatis ebracteatis hirtis, laciniis calycis lanceolatis plumoſis. *Nepal.* (Erythrina arboreſcens Roxb.)

H. *ſpirale* Sw. H. *tenellum* Kunth. var. ex *Amer. auſtr.*

Poſt n. 61. *Loureirii* * 150. H. herbaceum procumbens glabrum, foliis inferioribus ſimplicibus reniformibus, ſuperioribus ternatis longe petiolatis, racemis terminalibus paucifloris. *China auſtr.* (H. reniforme Lour., Lourea reniformis Cand.)

pag. 317.

Ad H. *incanum* Sw. H. *cinereum* Kunth. var. e *Mexico.* Humb. nov. gen. t. 599.

Ad H. *ſupinum* Sw. H. *cajanifolium* Kunth. ex *Amer. auſtr.* Humb. nov. gen. t. 598.

*Pryoni* * 151. H. caule ſuffruticoſo erecto glabriuſculo, foliolis oblongis acutis ſupra glabris ſubtus ſericeis, lateralibus minoribus, racemis axillaribus folia excedentibus. *Ind. or.* (H. viridiflorum N. L. Burm.)

*Roxburghii* * 152. H. caule ſuffruticoſo erecto tereti glabro, foliolis oblongis acuminatis ſupra glabris ſubtus appreſſe pubeſcentibus, ſtipulis lanceolatis, racemis terminalibus laxis, pedicellis elongatis ſubaggregatis. *Ind. or.* (Deſmodium diffuſum et laxiflorum Cand.)

*floribundum* Don. 153. H. fruticoſum erectum, ramis 3gonis hirſutis, foliolis ovatis mucronatis ſubtus villoſo-tomentoſis, ſtipulis lanceolatis ſubulatis, racemis multifloris, pedicellis aggregatis. *Nepal.* (Deſmodium multiflorum Cand.)

*rufeſcens* * 154. H. fruticoſum, ramis teretibus rufo-villoſis, foliolis ovato-ellipticis obtuſis mucronatis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus, ſtipulis lanceolatis ſubulatis elongatis, racemis terminalibus paniculatis. *Ind. or.* (Deſmodium rufeſcens Cand.)

*concinnum* * 155. H. fruticoſum, ramis teretibus foliolisque obovatis mucronatis parallele venoſis ſubtus pubeſcentibus, ſtipulis lanceolato-linearibus, racemis terminalibus, pedicellis geminis. *Ind. or. Nepal.* (Deſmodium concinnum Cand.) D. paucinervium et Leſchenaultii Cand. varr.

H. *retroflexum.* (Deſmodium dubium Lindl. in bot. reg. 967.)

H. *mauritianum* W. (Deſmodium trichocaulon Cand. *Nepal.*)

*laxum* * 156. H. caule volubili 3gono glabriuſculo, foliolis oblongis acuminatis ſubtus ſubpubeſcentibus, lateralibus ſemicordatis, medio baſi attenuato, panicula terminali laxiſſima, pedicellis geminis. *Nepal.* (Deſmodium laxum Cand.)

*oxyphyllum* * 157. H. caule fruticoſo erecto tereti ramulisque ſubangulatis glabris, foliolis oblongis acuminatis

ſubtus pallidis laevibus, ſtipulis ſubulatis, paniculis terminalibus laxis, pedicellis aggregatis. *Nepal.* (Deſmodium oxyphyllum Cand.)

*varians* Labill. 158. H. herbaceum ramoſum glabrum, foliolis mucronatis venuloſis, inferioribus ellipticis, ſuperioribus oblongo-linearibus, racemis terminalibus laxis flexuoſis, lomentis piloſiuſculis. *Nov. Caledon.* (Deſmodium ſpartioides Cand.?)

pag. 318.

H. *parvifolium* * non parviflorum. (H. tenellum Don.)

pag. 319.

Poſt n. 97. *Ammoxylon* * 159. H. fruticoſum erectum, foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus ramulisque compreſſis incano-pubeſcentibus, ſtipulis minimis acutis, racemis lateralibus ſimplicibus. *Inſ. Maſcaren. Ceilon.* (Ornithopodium zeylanicum Burm. zeylan. t. 82., Bremontiera Ammoxylon Cand.)

H. *triquetrum*. Deſmodium auriculatum Cand. var.

pag. 321.

Ad *Hedyſara dubia.*

*dioecum* Don. 160. H. fruticoſum, foliis ternatis, foliolis ovalibus obtuſis coriaceis ſubtus glaucis pubeſcentibus, ſtipulis ovatis acutis, racemis axillaribus multifloris, floribus bracteatis dioecis. *Nepal.*

*rigidum* Ell. 161. H. caule erecto ramoſiſſimo tomentoſo, foliis ternatis, foliolis oblongis obtuſis reticulatis pubeſcentibus, panicula ramoſa, bracteis acuminatis. *Carolina.*

*Wallichianum* * 162. H. ſuffruticoſum, ramis angulatis pubeſcentibus, foliis ternatis, foliolis ovatis acutiuſculis utrinque ſericeo-villoſis, racemis ſubſpicatis, bracteis villoſis acuminatis flores ſuperantibus. *Nepal.* (H. retuſum Don., Deſmodium angulatum Cand.)

*ſubſpinoſum* Fiſch. 163. H. ſuffruticoſum erectum, foliis pinnatis incano-ſericeis, foliolis ellipticis, ramis pedunculisque perſiſtentibus ſpinoſis, petiolis planiuſculis, ſpicis pedunculatis folia ſuperantibus. *Sibir.*

pag. 323.

Ad *Turpiniam* Perſ.

*montevidenſis* * 2. T. fruticoſa, foliis abrupte pinnatis 2jugis glanduloſo-punctatis, foliolis obovatis retuſis, pedunculis aggregatis in racemum elongatum diſpoſitis. *Monte Video.* (Pſoralea tetraphylla Poir. Syſt. 3. 201., Robinia glanduloſa * Syſt. 3. 248., Poiretia pſoraleoides Cand.)

### AMICIA Kunth.

*glandulosa* Kunth. 1. A. foliolis obovatis subemarginatis, vexillo obcordato, lomentis 5articulatis. *Quito.* Humb. nov. gen. 6. t. 600.

*Zygomeres* Cand. 2. A. foliolis obcordatis mucronatis, vexillo obovato, lomentis 2articulatis. *Mexico.*

### PICTETIA Cand.

*squamata* Cand. 1. P. foliolis orbiculatis longe mucronatis, stipulis spinosis erectis, racemis laxis 3-7floris. *Ins. Carib.* (Robinia squamata Vahl. Syst. 3. 246.)

*aristata* Cand. 2. P. foliolis obovatis venulosis longe mucronatis, stipulis spinosis patulis, racemis laxis 3-7floris. *Hispaniola. Ins. Carib.* (Aeschynomene aristata Jacqu. Syst. 2. 321.)

*obcordata* Cand. 3. P. foliolis obcordatis subtus recurvo-mucronatis, stipulis ovato-lanceolatis inermibus, racemis paucifloris. *Hispaniola.* Cand. legum. t. 47. f. 1.

*Desvauxii* Cand. 4. P. foliolis 1-2jugis approximatis oblongis utrinque attenuatis cuspidato-spinosis, stipulis spinosis rectis, pedunculis 1floris, leguminibus continuis. *Hispaniola.* (Robinia spinifolia Desv.)

*ternata* Cand. 5. P. foliis ternatis spathulatis mucronatis, stipulis spinosis patulis, pedunculis 1floris. *Hispaniola.* Cand. legum. t. 47. f. 2.

### pag. 325.

Ad *Ornithopoda.*

Post n. 2. *roseus* Dufour. 6. O. procumbens villosus, foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis acutis, pedunculis folio longioribus apice foliatis, lomentis rectis compressis rostratis. *Sabuleta Aquitaniae.*

O. *ebracteatus* Brot., *repandus* Poir. et *scorpioides.* (Astrolobium Desv. Cand.)

### pag. 327.

Ad *Daleam.*

Post n. 11. *astragalina* Kunth. 25. D. fruticosa ramosissima, foliolis multijugis oblongo-lanceolatis acutis subtus pubescentibus glanduloso-punctatis, spicis oppositifoliis cylindricis, calycibus glandulosis hirsutis. *Quito.*

*ayavacensis* Kunth. 26. D. fruticosa, ramis villosis, foliolis 7-8jugis oblongis mucronatis subtus pubescentibus glanduloso-punctatis, spicis cylindricis oppositifoliis. *Quito.*

### pag. 328.

Post n. 20. *microphylla* Kunth. 27. D. fruticosa procumbens, foliolis 10jugis oblongis obtusis crassiusculis glabris

subtus glanduloso-punctatis, spicis oblongo-cylindricis, calycibus sericeis glandulosis. *Quito.*

*pectinata* Kunth. 28. D. herbacea, foliolis multijugis linearibus acutiusculis complicatis glabris glanduloso-punctatis, spicis ovato-oblongis, calycibus sericeis glandulosis. *Mexico.*

---

# CLASSIS XVIII.

pag. 331.

Ad *Lüheae* W. characterem adde: Stamina exter. sterilia, vel in squamas 5 connata, vel basi tantum juncta crispata. (Haec sunt nectaria penicilliformia, quae igitur delenda.) Stigma 5lobum. Caps. 5locularis 5valvis medio septifera. Sem. 2seriata apice alata.

*Apatelia* Cand. delenda: est enim *Sauravia* W.

*Archytea* Mart. Cal. 5sepalus persistens. Pet. 5. Phalanges staminum 5. Antherae didymae 2loculares, loculis antice longitudinaliter dehiscentibus. Stylus simplex. Caps. 5locularis polyspermа. Sem. linearia. *Tiliaceae.*

*Schlechtendalia* *. (Mollia Mart.) Cal. 5sepalus. Pet. 5. Phalanges staminum 5. Stigma simplex. Caps. 2locularis. Sem. 2seriata apice alata. *Tiliaceae.*

---

pag. 332.

*Bubroma tomentosum* * habitat et in *Java.* (Blum. flor. jav. p. 85.)

pag. 333.

*Abroma fastuosum* Salisb. (A. mollis Blum. *Java.*)

pag. 334.

Ad *Citrum.*

*javanica* Blum. 13. C. petiolis marginatis, foliis ovalibus obtusissimis crenulatis, fructibus oblongis: (pulpa amara.) *Java.*

pag. 336.

Ad *Melaleucam.*

Post n. 20. *uniflora* Hortul. 37. M. foliis oblongo-linearibus abbreviatis obtusis glaucis sub-1nerviis punctatis patulo-recurvis glabris, floribus lateralibus sessilibus. *Nov. Holl.*

pag. 338.

Ad *Vellosiam.*

V. *candida* Mik. (V. aloaefolia Mart., tubiflora Kunth. in Humb. nov. gen. 7. p. 155. Radia tubiflora Ach. Rich. Kunth. syn. 1. p. 300.)

*asperula* Mart. 4. V. scapo germinibusque scabris, foliis linearibus obtusiusculis serrulatis. *Brasil.*

pag. 340.

Ad *Lüheam* W.

*speciosa* W. 1. L. foliis ovatis obtusis inaequaliter dentatis supra glabris subtus canescentibus, racemis terminalibus simplicibus paucifloris. *Brasil.*

*candicans* Mart. 2. L. foliis ovato-oblongis acuminatis argute serratis subtus incano-tomentosis, floribus solitariis. *Mexico.* (Alegria candida Sess. Syst. veg. 2. 582.?)

*villosa* Mart. 3. L. foliis late ovatis acutiusculis denticulatis utrinque villosis, floribus paniculatis. *Brasil.*

*divaricata* Mart. 4. L. foliis oblongis inaequilateris acutis inaequaliter serratis supra glabris subtus incanis, paniculae ramis divaricatis. *Brasil.*

*paniculata* Mart. 5. L. foliis subcordato-oblongis inaequaliter serratis supra pubescentibus subtus incano-tomentosis, floribus paniculatis. *Brasil.*

*grandiflora* Mart. 6. L. foliis ovato-oblongis acutis inaequaliter serratis supra pubescentibus subtus tomentosis, pedunculis racemosis bracteatis fusco-tomentosis, squamis stamineis discretis. *Brasil.*

## ARCHYTEA Mart.

*triflora* Mart. *Brasil.* Arbuscula, foliis fasciculatis spathulatis acutiusculis glabris glaucescentibus, pedunculis 3floris.

## SCHLECHTENDALIA *.

*speciosa* * *Brasil.* Arbor foliis alternis ovato-oblongis acutis repando-dentatis subtus lepidotis, floribus subcorymbosis albis. (Mollia speciosa Mart. nov. gen. t. 60.)

pag. 341.

Ad *Hypericum.*

H. *bracteatum* Don. (H. coriaceum Blum. *Java.*)
H. *patulum* Thunb. (H. javanicum Blum. *Java.*)
H. *Lechenaultii* Cand. (H. triflorum Blum.)

pag. 346.

Poſt n. 67. *ſongaricum* Ledeb. 111. H. caule compreſſo, foliis cordato-ellipticis obtuſis glaucis punctatis, calycibus acuminatis. *Ditio Kirgiſorum.*

pag. 348.

H. *elegans* W. habitat et in *Bohemia* ac *Moravia.*

---

# CLASSIS XIX.

pag. 356.

Poſt n. 2699. *Grahamia* *. (Graemia Hook.) Anthodium ſimplex polyphyllum reflexum. Rec. tuberculoſum paleaceum. Pappus paleis 5 fimbriatis ariſtatis.

*Lychnophora* Mart. Anthodium imbricatum pauciflorum. Rec. nudum. Papp. duplex paleaceus, paleis interioribus lingulatis.

pag. 357.

Poſt n. 2725. *Monenteles* Labill. Anthodium duplici ſerie polyphyllum lanatum. Rec. nudum. Floſculi plerique ♀ graciles, unicus ☿ centralis. Pappus ſeſſilis piloſus ſcaber.

pag. 358.

Poſt n. 2734. *Oligoſporus* Caſſin. Anthodium 5phyllum 3-5florum. Flores diſci 4fidi, radii parvi 3fidi. Rec. nudum. Papp. 0.

pag. 359.

*Dumerilia* Lag. idem genus ac *Jungia* L. fil.

pag. 362.

Poſt n. 2817. *Mataxa* *. Anthod. ſimplex polyphyllum. Rec. paleaceum. Sem. denſiſſime lanata, coronula dentata.

---

pag. 370.

Ad *Cirſium pungens* * Cnicus ſamniticus Tenor. pertinere videtur.

pag. 372.

*Cirſium anglicum* Lobel. habitat et in *Palatinatu.*

Ad C. *ciliatum* M. B. pertinet et C. *ferrulatum* Ej. n. 47. ubi: ciliis deorſum decreſcentibus (non dureſcentibus) legendum.

pag. 377.

C. *rigens* *. (Cnicus Lachenalii C. C. Gmel.)

pag. 385.

Ad *Carduum*.

†*faſciculiflorus* Viv. 45. C. foliis decurrentibus pinnatifidis nudiusculis, laciniis palmato-angulatis inciſis ſpinoſis, floribus axillaribus ſeſſilibus faſciculatis, calycis glabri ſquamis ſpinoſis appreſſis. *Corſica.*

Ad C. *carlinoidem* Gouan. C. chrysacanthus Tenor. Spinulae foliorum terminatae mucrone flavo valido. Gouan. illuſtr. p. 62.

pag. 398.

Ad *Centauream*.

Poſt n. 34. *Nuttallii* * 152. C. caule ſimpliciusculo glabro, foliis ſeſſilibus oblongo-lanceolatis venoſis, inferioribus denticulatis, ſuperioribus integerrimis, floribus ſolitariis, ſquamis calycis erectis pectinato-ciliatis. *Ditio Arcanſa Amer. bor.* (C. americana Nutt. in Journ. of Philad. 2. p. 117. Colla in act. taurin. vol. 31. t. 6.)

C. *filiformis* Viv. app. ad fl. corſic. magnopere dubia: forte varietas C. maculoſae Lam.

pag. 425.

Ad *Chryſocomam*.

Ad Chr. *liburnicam* *. (Chr. Linoſyris β. Sav. bot. etruſc. 3. p. 145.)

pag. 434.

Ad *Liatrim* Gärtn.

Poſt n. 20. *intermedia* Lindl. 21. L. caule humili paniculato piloſiusculo, foliis linearibus elongatis ſcabriusculis nervoſis marginatis, pedunculis folioſis, ſquamis anthodii rigidis ſubfoliaceis appreſſis. *Canada.* Bot. reg. 948.

pag. 437.

Ad *Vernoniam gracilem* Kunth. V. flexuoſa Sims. in bot. mag. 2477. var.

V. *trichocarpha* * eſt *Lychnophora* Mart.

An et V. *dichocarpha* *? Character reſpondet: habitus adverſatur.

### pag. 449.

Poſt *Güntheriam:*

### GRAHAMIA *.

*aromatica* * *Chili.* Herba annua ramoſa glanduloſo-glutinoſa, foliis alternis lineari-lanceolatis dentatis, inferioribus pinnatifidis, pedunculis ſolitariis terminalibus, floribus flavis. (Graemia aromatica Hook. exot. fl. t. 189.)

### LYCHNOPHORA Mart.

*(Frutices alpeſtres.)*

*brunioides* Mart. 1. L. foliis lineari-lanceolatis acutis margine revolutis ſubtus tomentoſis, floribus terminalibus ſeſſilibus, anthodio villoſo ſub-3floro. *Braſil. Peru.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 4.

*ericoides* Mart. 2. L. foliis linearibus elongatis ſubflexuoſis obtuſiuſculis margine revolutis ſubtus tomentoſis, floribus terminalibus capitatis ſeſſilibus, anthodio ſub-3floro. *Braſil.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 5.

*Pinaſter* Mart. 3. L. foliis linearibus obtuſis viſcidulis ruguloſis *margine revolutis* ſubtus *tomentoſis*, ramis teſſellatis, capitulis globoſis. *Braſil.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 6. (Vernonia trichocarpha Syſt. 3. 437. prope ad hanc accedit.)

*villoſiſſima* Mart. 4. L. foliis patentiſſimis linearibus elongatis obtuſiuſculis ſupra baſi lanatis ſubtus ramisque teſſellatis denſe lanato-tomentoſis, capitulis globoſis lanatis. *Braſil.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 7.

*ſtaevioides* Mart. 5. L. foliis ſubcordato-linearibus obtuſiuſculis patentiſſimis ſupra glabris margine revolutis ſubtus tomentoſis, capitulis hemiſphaericis lanatis. *Braſil.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 8.

*roſmarinifolia* Mart. 6. L. foliis ſubcordato-lineari-lanceolatis acuminatis patulis ſupra linea media villoſis ſubtus revolutis ramisque tomentoſis, capitulis multifloris, anthodio 1floro. *Braſil.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 9.

*hakeaefolia* Mart. 7. L. foliis ſpathulato-linearibus erectis mucronulatis ſubtus revolutis tomentoſis, nervo dilatato, ramis pulvillato-tomentoſis, capitulis globoſis, anthodio 4floro. *Braſil.* L. ſalicifolia Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 10.

### pag. 453.

Ad *Bidentem.*

Poſt n. 26. *tenuifolia* Labill. 40. B. foliis pinnatifidis glabris, laciniis linearibus integerrimis, pedunculis 2fidis corymboſis, floribus radiatis, involucro anthodium aequante. *Nov. Caledon.*

pag. 457.

Ad *Ixodiam* R. Br.

*Ammobium* * 2. I. herbacea erecta ramofa, caule alato tomentofo, foliis lanceolatis decurrentibus, ramis 1floris. *Nov. Holl.* (Ammobium alatum R. Br. Bot. mag. 2459.)

Ad *Balfamitam* Desf.

Poft n. 5. *annua* Delil. 7. (Tanacetum annuum L. p. 486.)

pag. 474.

*Gnaphalium candicans* Kunth. (Gn. confanguineum Gaudich. *Inf. Falkland.*)

pag. 477.

*Gnaphalium quintuplinerve* Hamilt. (Gn. cynogloffoides Trevir. in nov. act. nat. cur. 15. p. 200.)

pag. 482.

Poft *Gyneteriam* W.:

MONENTELES Labill.

*fpicatus* Labill. 1. M. foliis decurrentibus oblongis ferratis fubtus tomentofis, glomerulis fpicatis. *Nov. Caledon.*

*fphacelatus* Labill. 2. M. foliis decurrentibus lanceolatis obtufiusculis undulatis dentatis fubtus incanis, floribus capitatis, fquamis anthodii exterioribus nigris. *Nov. Caledon.*

pag. 492.

*Artemifia faxatilis* Kit. nuper et in *Alfatia* prope Colmariam inventa eft. (C. C. Gmel. fl. bad. 4. p. 605.)

pag. 495.

*Artemifia Sieverfiana* Ehrh. (A. Sacrorum Ledeb.?)

pag. 499.

Poft *Cotulam:*

OLIGOSPORUS Caffin.

*emarginatus* Caffin. *Inf. Falkland.* Herba foliis imbricatis oblongis carnofis apice membranaceis bilobis, floribus folitariis feffilibus.

pag. 501.

Ad *Trixin* P. Br.

Poft n. 7. *fenecioides* Hook. 8. Tr. foliis amplexicaulibus pubefcentibus, inferioribus oblongis finuato-pinnatifidis, fuperioribus lanceolatis angulato-finuatis,

pedunculis 2fidis erectis elongatis. *Chili.* Hook. exot. flor. t. 101.

pag. 503.

Ad *Platiam brasiliensem* *. (Augusta grandiflora Leandr. in act. monach. 7. t. 14.) Tertia species dubia:

*parviflora* * 3. Pl. foliis oblongo-lanceolatis, floribus paniculatis. *Brasil.* (Augusta parviflora Leandr.)

pag. 504.

Ad *Nassaviam* Commerf.

*Gaudichaudii* Cassiu. 2. N. caule ramosissimo, foliis parvis imbricatis squarrosis lineari-lanceolatis spinoso-dentatis. *Ins. Falkland.* (Mastigophorus Gaudichaudii Cassin. in Dict. des scienc. nat. 34. p. 222.)

pag. 506.

*Iungia ferruginea* L. fil. (Dumerilia paniculata Cand.) Secunda species est J. *axillaris* * (Dumerilia Cand.)

pag. 515.

*Conyza pinnatifida* Roxb. (Baccharis trifurcata Trevir. in nov. act. nat. cur. 13. p. 201.)

pag. 524.

Ad *Inulam*.

Post n. 45. *caspica* Ledeb. 52. I. foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis glabris margine denticulato-scabris, pedunculis paniculatis villosis, squamis anthodii linearibus squarrosis. *Ad Volgam.*

pag. 532.

Ad *Asterem*.

Post n. 96. *leptophyllus* Desf. 167. A. foliis linearibus glaberrimis, superioribus filiformibus subsquamaceis, paniculae corymbosae ramis squamulosis, squamis anthodii arcte appressis ovatis obtusiusculis. *Patria?*

pag. 537.

Post n. 155. *robustus* Nees. 168. A. caule glabro ramoso, foliis omnibus amplexicaulibus oblongo-lanceolatis serratis nitidis, ramis 1floris foliosis, anthodio laxo foliaceo, squamis lanceolato-linearibus elongatis. *Patria?*

pag. 538.

Ad A. *laevigatum* W. del. syn. A. *glaucus* Nees.

pag. 546.

Ad *Cinerariam.*

Post n. 8. *hypoleuca* Reichenb. 96. C. *foliis ovatis fusco-denticulatis* subtus petiolisque late marginatis dense niveo-lanatis, corymbo composito laxo terminali anthodiis glabratis. *C. B. S.*

pag. 549.

Post n. 57. *venusta* Reichenb. 96. C. caule simplici foliisque glaucis glaberrimis, radicalibus longe petiolatis subcordatis angulatis, caulinis amplexicaulibus lanceolatis obtuse dentatis, pedunculis squamosis squamis anthodii latiusculis. *C. B. S.*

pag. 551.

C. *Bergeriana* * mutetur in *Bergianam* *.

pag. 554.

Ad *Senecionem.*

Post n. 26. *nervatus* Reichenb. 186. S. foliis subsessilibus lanceolatis utrinque attenuatis basi laciniato-subpinnatifidis ceterum integerrimis nervoso-venoso lineatis subtus tomentosis, corymbo composito terminali. *C. B. S.*

pag. 557.

Post n. 69. *litoralis* Gaudich. 187. S. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis coriaceis, floribus subcorymbosis. *Ins. Falkland.*

pag. 559.

S. *montanus* W. cum *rupestri* Kit. jungatur.

pag. 560.

Post n. 105. *fragrans* Fisch. 188. S. caule ramoso glaberrimo, foliis radicalibus petiolatis amplexicaulibus lyrato repando-dentatis, caulinis pinnatifidis linearibus revolutis, panicula corymbosa. *Sibir.?*

Post n. 112. *difficilis* Dufour. 189. S. caule erecto lanato, foliis amplexicaulibus crassiusculis 2pinnatifido-sinuatis, laciniis obtusis dentatis, pedunculis subcorymbosis lanatis, involucro anthodii glabri squamis apice barbatis. *Hispan.* Ann. des scien. nat. 5. t. 11.

pag. 561.

S. *lycopifolius* Poir. habitat in regno *Neapol.* (Cineraria ceratophylla Tenor.)

pag. 567.

*Arnica lanigera* Tenor. (A. floccosa Bertol.)

pag. 573.

Ad *Bellium*.

*rassifolium* Moris. 3. B. caespitosum, foliis radicalibus petiolatis orbiculatis oleraceis integerrimis glaberrimis enerviis, scapo 1floro subpubescente. *Sardinia.*

*nivale* Requien. 4. B. foliis subspathulatis elongatis pilosiusculis, scapo 1floro villoso, pappo 4aristato. *In cacuminibus montium Corsicae.*

pag. 577.

Ad *Verbesinam*.

Post n. 17. *buphthalmoides* Link. 31. V. caule suffruticoso decumbente, foliis lanceolatis utrinque attenuatis dentatis triplinerviis scabris subtus ramisque hirsutiusculis, pedunculis elongatis 1floris. *Monte Video.* Link. et Ott. Abbild. t. 49.

pag. 585.

Ad *Pyrethrum*.

Post n. 12. *diversifolium* Hook. 48. P. caule subramoso pilis articulatis hirsuto, foliis lanceolatis amplexicaulibus, inferioribus inciso-pinnatifidis in petiolum dilatatum decurrentibus, summis integerrimis, pedunculis 1floris, pappo paleaceo-aristato. *Nov. Holl.* Hook. exot. fl. t. 215.

pag. 590.

Post *Relhaniam*:

MATAXA *.

*apensis* * *C. B. S.* Suffrutex ramosus, foliis pinnatifidis carnosis glaberrimis, laciniis linearibus acutis, pedunculis 1floris. (Lanipila Burch. it. 1. p. 259. Lasiospermum radiatum Trevir. in nov. act. nat. cur. 13. p. 205.)

pag. 600.

Ad *Achilleam*.

*iaristata* Bivon. 65. A. caule stricto simplici foliisque 2pinnatifidis amplexicaulibus viridibus sublanatis, rhachi lata subdentata, laciniis approximatis lanceolatis, lacinulis incisis cuspidato-aristatis, corymbo compacto. *Sicil.?* Flores sulfurei.

*entifera* * Reichenb. (non Cand.) 66. A. caule decumbente pubescente, foliis subtripinnatifidis laxis teneris, rhachi subintegerrima, laciniis remotis patentibus, lacinulis linearibus abbreviatis acutis dentiformibus, corymbis laxe paniculatis, anthodio ovato. *Patria?* Flores albidi.

pag. 620.

*Gillera biflora* L. ad *Doliliam* * p. 674.

pag. 622.

*Collaea procumbens* *. (Sebastiania heterophylla Bertol. opusc. scientif. 4. p. 336.)

pag. 632.

*Arctotis grandiflora* Jacqu. mutetur in A. *Massonianam* * 26. A. foliis pinnatifidis denticulatis arachnoideis 3plinerviis, squamis anthodii exterioribus appressis, radio stramineo extus rubescente. *C. B. S.* Pristina phrasis et synonyma deleantur.

pag. 634.

*Crepis radicata* Forsk. ad *Thrinciam* p. 666.

pag. 637.

*Crepis tenuifolia* W. (Cr. pulcherrima Fisch. Link.)

pag. 640.

*Hieracium murorum*. (H. Lachenalii C. C. Gmel.)

pag. 641.

Ad H. *glaucum* All. H. *bupleuroides* C. C. Gmel. var. H. *ramosum* Kit. (H. Mertini C. C. Gmel. fl. bad. 4. 591. *Franconia*.)

pag. 652.

*Borkhausii Candollei* * habitat in *Sicilia*. (Crepis glandulosa Gusson.)

pag. 653.

Post n. 23. *sardoa* * 26. B. caule ascendente foliisque runcinatis laevibus, caulinis paucissimis sagittatis, pedunculis solitariis elongatis, squamis anthodii glabris margine scariosis. *Sardinia*.

In distinguendis Borkhausia et Leontodonte, utpote eosdem characteres gerentibus, magnopere haereo, ni ad caulem foliatum Borkhausiae, scapum vero sub-1florum Leontodontis respiciatur. Ceterum Leontodon salinus Pollin. loco *Pollich.*, est sphalma.

pag. 654.

Ad *Prenanthem*.

*glomerata* Reichenb. 45. Pr. caule suffruticoso, ramis virgatis sulcatis, foliis sessilibus oblongis coriaceis spinuloso-dentatis subtus reticulatis sublanatis, anthodiis sessilibus floccosis. *C. B. S.*

pag. 662.

*Tragopon orientalis* et in *Palatinatu* et ditione *badensi* habitat. (C. C. Gmel. fl. bad. 4. p. 579.)

pag. 664.

*Picris lyrata* Delil. ad Thrinciam p. 666.
*Apargia hispida* W. (A. hirta C. C. Gmel. fl. bad. 3. p. 280.)

pag. 665.

Ad *Apargiam Villarsii* W. A. Rosani Cand.

pag. 666.

Ad *Thrinciam*.

*caulescens* Trevir. 5. Thr. caule ramoso hispido, foliis radicalibus lyratis, caulinis cordato-lanceolatis. *Ad pyramidas Aegypti.* (Crepis radicata Forsk. Syst. 3. 684., Picris lyrata Delil. Syst. 3. 664.)

pag. 668.

Ad *Helminthiam*.

*humifusa* Trevir. 2. H. caule prostrato glabro, foliis caulinis ovato-lanceolatis hispidis, involucri foliolis ovatis. *Patria?*

pag. 669.

Ad *Hypochoerin*.

Post n. 7. *arenaria* Gaudich. 11. H. caule ramoso erecto, foliis pinnatifidis hispidulis, anthodio piloso. *Ins. Falkland.*

pag. 674.

*Delilia Berterii* *. (Millera biflora L. Syst. 3. 620.) Habitat et in *Cuba*.

---

## CLASSIS XX.

pag. 680.

Post n. 3000. *Gongora* R. et P. Sepala 3 exter. patentia aequalia, superius dorso columnae insertum, 2 interiora parva, margini columnae inserta, decurrentia. Labellum gibbosum vomeriforme acuminatum dentato-sinuatum. Columna subclavata.

*Coelogyne* Lindl. Sepala patentia. Labellum cucullatum cum columna alata ultra antheram producta basi articulatum. Stigma 2labiatum infundibuliforme.

Post n. 3009. *Notylia* Lindl. Sepala 4, inferius 2lobum labello suppositum. Labellum divaricatum unguiculatum integrum medio callosum. Columna libera teres acuminata. Anthera postica 1locularis stigmati parallela.

*Tribrachia* Lindl. Sepala patentia, exteriora cum basi columnae connata, interiora nana. Labellum posticum integrum unguiculatum. Columna apice bicirrosa. Anthera terminalis opercularis.

pag. 681.

Post n. 3022. *Megaclinium* Lindl. Sepala exteriora basi connata, superius maximum basi 2callosum, interiora nana. Columna plana lata abbreviata apice 2cuspidata. Labellum integerrimum cum pede columnae elastice articulatum.

pag. 682.

Post n. 3032. *Alamania* Laxarf. Sepala 6 nervosa subtus calcar mentientia. Labellum basi glandulosum. Columna 3cuspidata.

pag. 683.

Post n. 3049. *Gonyanthes* Blum. Cal. corollinus tubulosus 3dentatus. Antherae 3 ovales fauci sub stigmate insertae. Stigma 3lobum, antherarum auriculis adnatis. Caps. infera 3quetra 1locularis. Sem. minuta aristata. *Cytineae.*

---

pag. 684.

*Orchis laxiflora* Lam. (O. Tabernaemontani C. C. Gmel. fl. bad. 3. p. 585.)

pag. 701.

Ad *Ophryn.*

Post n. 6. *canaliculata* Viv. 20. O. labello 3lobo canaliculato, lobo medio 2fido, lateralibus acuminatis hispidis, sepalis interioribus minimis hispidis, spica 3-4-flora. *Corsica.*

pag. 704.

Ad *Limodorum.*

Post n. 6. †*sphaerochilos* * 11. L. calcare cylindrico germen aequante, labello rotundato undulato, sepalis erectis, scapo vaginato. *Corsica.* L. abortivo nimis affine. (L. sphaerolabium Viv.)

*Pelexia adnata* *. (P. spiranthoides Lindl. in Bot. reg. 985.)

pag. 719.

Ad *Vandam* R. Br.

Post n. 2. *recurva* Hook. 7. V. calcari obtuso germen subaequante, sepalis ovalibus concavis, labello 3dentato, racemis axillaribus pendulis, foliis alternis lanceolatis acutis. *China.* Hook. exot. fl. t. 187. (Sarcanthus rostratus Lindl. in bot. reg. 981.)

pag. 720.

Ad *Eulophium* R. Br.

Post n. 6. *streptopetala* Lindl. 10. E. calcari conico abbreviato, lobo medio labelli rotundato emarginato, sepalis oblongis obtusis, interioribus basi tortis, scapo simplici racemifero, foliis lineari-lanceolatis nervosis. *Patria?* Bot. reg. 1002.

pag. 724.

Ad *Cymbidium*.

Post n. 38. *stapelioides* Link. 59. C. labello 3lobo, lobo medio orbiculari, lateralibus erectis plica transversa antrorsum prominente tuberculoque longitudinali insignibus, sepalis acutis maculatis, scapo abbreviato decumbente sub-1floro, foliis oblongis nervosis. *Brasil.* Link. et Ott. Abbild. t. 52.

pag. 726.

Ad *Catasetum* Rich.

*cristatum* Lindl. 5. C. sepalis patentibus canaliculatis, interioribus tenuioribus, floribus laxe spicatis, labello multifido cristato, foliis oblongis utrinque attenuatis undulatis. *Brasil.* Bot. reg. 966.

*semiapertum* Hook. 6. C. sepalis late ovatis concavis patentibus subsecundis, labelli ore contracto integro, lateribus minute denticulatis, spica compacta foliis breviori. *Brasil.* Hook. exot. fl. t. 213.

*macrocarpon* Kunth. 7. C. sepalis patulis oblongis acutis nervosis conformibus, labello emarginato rostellato, scapo paucifloro, capsulis grandibus pyriformibus 6costatis. *Ad Cayennam.* Humb. nov. gen. 7. t. 631.

pag. 727.

Ad *Colacem* Lindl.

*aromaticus* * 4. C. labello 3lobo semicylindrico 2seriatim piloso, lobis lateralibus lanceolatis subserratis, medio duplici, super. brevi truncato, infer. spathulato apice recurvo serrulato, scapo 1floro, bulbo pleiophyllo. *Mexico.* (Maxillaria aromatica Hook. exot. fl. t. 219.)

*parvulus* * 5. C. labello 3lobo obtuso venoso intus glandula longitudinali pilosa, sepalis lineari-lanceolatis, scapo 1floro, bulbo 2phyllo. *Brasil.* (Maxillaria parvula Hook. exot. fl. t. 217.)

Post *Pleionem* Don.:

## GONGORA R. et P.

*quinquenervia* R. et P. 1. G. labello 2dentato, sepalis exterioribus concavis, foliis lanceolatis 5nerviis. *Peru.*

*atropurpurea* Hook. 2. G. labello sub-7dentato, sepalis exterioribus planis, foliis oblongis nervoso-plicatis. *Inf. Trinit.* Hook. exot. fl. t. 178.

## COELOGYNE Lindl.

*fimbriata* Lindl. *China.* Herba repens parasitica, bulbis ovalibus diphyllis, flore solitario diphyllo, sepalis viridibus, labello fulvo fimbriato cristato. Bot. reg. 868.

pag. 728.

Ad *Oncidium* Sw,

Post n. 3. *Papilio* Lindl. 19. O. scapo ancipiti articulato paucifloro, sepalis superioribus linearibus longissimis, inferioribus distinctis ovato-lanceolatis undulatis, columna 2corni, alis fimbriatis, foliis solitariis ovalibus maculato-pictis. *Inf. Trinit.* Bot. reg. 910.

Post n. 12. *pumilum* Lindl. 20. O. panicula pyramidali erecta folia oblonga obliqua rigida subaequante, labello 3lobo cristato, alis columnae integerrimis, sepalis obtusis, superioribus maculatis. *Brasil.* Bot. reg. 920.

Post n. 16. *puber* Lindl. 21. O. labello panduriformi 2cristato, cristis dentatis, sepalis obovatis fasciatis, inferiori 2lobo, scapo ramoso, foliis lanceolatis nervosis. *Brasil.* Bot. reg. 1007.

pag. 729.

*Cyrtopodium Woodfordii* Sims. (C. glutiniferum Radd. Mem. di Modena, tom. 19. p. 221. t. 6.)

pag. 730.

*Stelis micrantha* Sw. melius sic: St. folio solitario oblongo obtuso coriaceo, floribus spicatis subsecundis 3quetris, sepalis interioribus apiculatis labello conformibus. Hook. exot. fl. t. 158.

*Stelis ophioglossoides* Sw. melius sic: St. foliis lanceolatis tenuibus obtusis apice recurvis in petiolum radicalem decurrentibus, floribus racemosis directione variis obsolete hexagonis, sepalis interioribus truncatis nanis. Bot. reg. 935.

pag. 731.

Post *Pleurothallin* R. Br.:

## NOTYLIA Lindl.

*punctata* Lindl. (Pleurothallis punctata Lindl. in bot. reg. 759. Syst. 3. 731.)

*multiflora* Lindl. (Pleurothallis sagittifera Kunth. in Humb. nov. gen. 1. t. 91. Syst. ib.)

## TRIBRACHIA Lindl.

*pendula* Lindl. *Senegambia.* Bulbi ovati 1phylli, folia fubtus purpureo-maculata, fcapus pendulus, flores fpicati bracteati virefcentes. Bot. reg. 963.

### pag. 734.

Poft *Ornithidium* Salisb.:

## MEGACLINIUM Lindl.

*falcatum* Lindl. *Sierra Leone Afric. occid.* Bulbus oblongus diphyllus, foliis oblongis emarginatis 2plicatis, fcapus fpicifer, flores fubfecundi rubro-variegati. Bot. reg. 989.

### pag. 735.

Ad *Cattleyam* Lindl.

*Loddigefii* Lindl. 2. C. diphylla, floribus racemofis rofeis. *Brafil.* Hook. exot. fl. t. 186.

*Forbefii* Lindl. 3. C. diphylla, pedunculis 2floris, bractea parva (non fpathacea), floribus pendulis lurido-flavis. *Brafil.* Bot. reg. 953.

### pag. 736.

Ad *Epidendrum.*

Poft n. 14. *ellipticum* Graham. 31. E. caule ramofo, foliis diftichis patentibus ellipticis obtufis, labello 3partito fimbriato, lobis lateralibus dilatatis, intermedio minori, fepalis patulis. *Brafil.* Hook. exot. fl. t. 206.

### pag. 738.

Ad *Dendrobium* Sw.

Poft n. 6. *Calceolaria* Hook. 24. D. caule erecto, foliis diftichis linearibus carnofis, racemo laterali, fepalis ellipticis undulatis reticulatis, labello cucullato. *Ind. or.* Hook. exot. fl. t. 184.

### pag. 739.

Dendr. *pubefcens* Hook. pertinet ad *Octomeriam.*

### pag. 742.

Poft *Stenogloffum* Kunth.:

## ALAMANIA Laxarf.

*punicea* Laxarf. *Mexico.* Herba parafitica e bulbillo diphylla, fcapo fpicifero, floribus puniceis. Annal. des fcienc. nat. 3. p. 452.

### pag. 743.

Ad *Calanthem ftriatam* R. Br. pertinere videtur Limodorum unguiculatum Labill. nov. Caledon. t. 25.

pag. 744.

**Ad *Octomeriam* R. Br.**

*pubefcens* * 3. (O. Dendrobium pubefcens Hook. Syft. 3. 739.)

*ftellata* * 4. O. foliis lanceolatis acutis 5nerviis carnofis, fcapo fpicifero fepalisque patentibus acuminatis nervofis extus ferrugineo-pubefcentibus, labello 3lobo, lobo medio elongato acuminato, lateralibus abbreviatis. *Nepal.* (Eria ftellata Lindl. in bot. reg. 904.)

*rofea* * 5. O. bulbo elongato apice foliaceo, foliis petiolatis lanceolatis, fpicis fub-3floris feffilibus. *China.* (Eria rofea Lindl. in bot. reg. 978.)

pag. 746.

*Cypripedium guttatum* Sw. crefcit et ad *Mofquam.* Fifcher.

pag. 750.

Poft *Rhopium* Schreb.:

GONYANTHES Blum.

*candida* Blum. *Java.* Herba parafitica tenera, fcapo 4gono 3-4-floro. Annal. des fcienc. nat. 3. p. 369.

pag. 754.

Ariftolochia haftata Nutt. mutanda in A. *polyrrhizon* Plukn., cum prior A. haftata Kunth. p. 751. jam adfit.

---

## C L A S S I S XXI.

pag. 761.

n. 3121. Ad *Oftryae* characterem adde: Flores ♀: fub fquamis fingulis germina 2 hirfuta digyna.

pag. 762.

Poft n. 3134. *Caperonia* Hilar. Flores monoeci f. dioeci. ♂ Cal. 5fidus. Petala 5 cum ftaminibus 10 columnae inferta, quae deficit in floribus ♀. Stylus 3fidus, ftigmatibus multipartito-flabellatis. Capf. 3cocca.

---

pag. 766.

**Ad *Pothon*.**

*coriaceus* Graham. 30. P. foliis oblongis undulatis coriaceis venofis, nervo marginali, petiolis apice nodofis, fcapo

tereticusculo foliis breviori, spadice cylindrico spatham lanceolatam superante. *Brasil.* Hook. exot. fl. t. 210.

*Harrisii* Graham. 31. P. foliis lanceolatis acuminatis venosis, nervo marginali, petiolis apice nodosis, scapo teretiusculo folia subaequante, spadice cylindrico spatham lanceolatam reflexam subaequante. *Brasil.* Hook. exot. fl. t. 211.

pag. 770.

*Arum crinitum* Ait. legit et in *Sardinia* Moris.

pag. 771.

Ad *Caladium* Vent.

Post n. 19. *pedatum* Hook. 23. C. caulescens, foliis longe petiolatis cordatis profunde 3partitis, lacinia superiore maxima pinnatifida, inferioribus auriculatis incisis, pedunculis petiolo brevioribus, spatha cucullata involuta. *Brasil.* Hook. exot. fl. t. 206.

pag. 787.

Ad *Euphorbiam.*

Post n. 23. *globosa* Sims. 210. E. erecta articulata, articulis obovatis tuberculatis, flore solitario terminali, appendiculis involucri palmatis. *Afric. austr.?* Bot. mag. 2624.

pag. 795.

E. *marginata* Pursh. (E. variegata Coll. in act. taurin. vol. 31. t. 7.)

pag. 798.

E. *saxatilis* Jacqu. (E. corsica Requien.)

pag. 800.

Post n. 191. *papillosa* Hilar. 211. E. umbella papilloso-pubescente, appendiculis involucri rotundatis, foliis oblongo-linearibus mucronulatis integerrimis laevibus glaucis. *Brasil.*

pag. 808.

Ad *Caricem.*

Post n. 24. *cristata* Schwein. 268. C. spica composita globosa capitata bracteata, spiculis inferne ♂, fructibus ovato-lanceolatis rostratis alatis ciliato-serratis divergentibus squamas oblongo-lanceolatas excedentibus. *Pensylvan.*

pag. 811.

Post n. 63. *muskingumensis* Schwein. 269. C. spiculis suboctonis approximatis oblongis inferne ♂, bractea basilari setacea, fructibus lanceolatis compressis bi-

dentatis alatis nervosis glabris squamas lanceolatas duplo superantibus, culmo 3quetro superne scabro. *Ad fl. Muskingum, receptum a fl. Ohio.* (C. arida Schweinitz et Torrey monogr. Caric. americ. in ann. of the Lyc. of N.York.)

pag. 812.

Post n. 80. *siccata* Dew. 270. C. spica composita, spicula terminali obtusa androgyna superne ♂, inferioribus subquaternis approximatis, bractea basilari ovato-lanceolata, fructibus acuminatis 2fidis compressis nervosis margine scabris squamas lanceolatas subaequantibus. *Massachusetts, Amer. bor.* Silliman's amer. journ. vol. 10. t. F. f. 18.

pag. 815.

C. *longifolia* R. Br. melius infra post n. 237. collocatur.

pag. 816.

C. *aristata* Dew. (C. Torreyana Dew. in Silliman's amer. journ. 10. p. 47.)

Post n. 125. *nigro-marginata* Schwein. 271. C. spicis ♀ binis ovatis sessilibus approximatis, culmis subternis, fructibus ovatis sub-3quetris rostratis 2dentatis pubescentibus squamam ovatam acutiusculam aequantibus, stigmatibus 3. *Pensylvania.*

pag. 817.

Post n. 126. *floridana* Schwein. 272. C. spicis ♀ subquaternis aggregatis ovatis sessilibus bracteatis, infima subremota, fructibus ovalibus basi attenuatis convexo-planis 2dentatis squamas cuspidatas aequantibus. *Florida.*

pag. 818.

Post n. 145. *Washingtoniana* Dew. 273. C. spicis ♀ distinctis oblongo-cylindricis erectis pedunculatis, fructibus ovalibus compressis utrinque attenuatis ore integro rostratis glabris squamas oblongas acutiusculas aequantibus, culmo 3quetro. *Nov. Hamptonia Amer. bor.* Silliman's amer. journ. 10. t. D. f. 14.

C. *subulata* Mx. (C. Michauxii Dewey.)

pag. 821.

Post n. 175. *Hitchcockiana* Dew. 274. C. spicis ♀ subternis pedunculatis erectis, floribus remotiusculis, fructibus inflatis striatis rostratis squamas mucronatas subaequantibus, culmo 3quetro foliisque scabro-pubescentibus. *Amer. bor.* Silliman's amer. journ. 10. t. E. f. 15.

*Davisii* Dew. 275. C. spicis ♀ binis ternisve subapproximatis ovatis sessilibus paucifloris, infima saepe radicali

longe pedunculata, fructibus globoſe-3quetris roſtratis pubeſcentibus ſquamas ovatas ſubaequantibus, culmo decumbente. *Maſſachuſetts Amer. bor.*

pag. 822.

Ad C. *conoideam* W. Mühl. C. *blanda* Dew.

pag. 826.

Poſt n. 237. *longifolia* R. Br. ex n. 107. C. ſpicis ♂ binis, androgynis cylindricis nutantibus longe pedunculatis aggregatis, fructibus compreſſis nervoſis 3gynis ſquamam ovatam ariſtatam aequantibus. *Nov. Holl.*

pag. 830.

Ad *Unciniam* Perſ.

*Macloviana* Gaudich. 10. U. ſpica denſe imbricata filiformi, ſquama infima longe ariſtata, fructibus oblongis plano-convexis villoſis, culmo 3quetro laevi, foliis ſtrictis planis. *Inſ. Falkland.*

pag. 831.

Ad *Scleriam* Berg.

Poſt n. 13. *capillaris* R. Br. 32. Scl. culmo 3quetro foliisque filiformibus canaliculatis retrorſum ſcabriuſculis, panicula ſimplici rara nutante, floribus ♂ monandris, nucibus laevibus. *Nov. Holl.*

Scl. *pygmaea* Nees in Sieb. agroſt. n. 108. eadem cum Scl. *tenui* Retz. videtur.

pag. 834.

*Cnemidoſtachys ſalicifolia* Mart. (Microſtachys ramoſiſſima Hilar.)

pag. 840.

Ad *Urticam.*

Poſt n. 58. *involucrata* Sims. 112. U. caule ramoſo hirſuto, foliis ovalibus 3nerviis crenatis lucidis ad apices ramorum congeſtis, paniculis ſeſſilibus. *Inſ. Carib.* Bot. mag. 2481.

pag. 841.

Poſt n. 79. *pellucida* Labill. 113. U. ſuffruticoſa, foliis cordato-oblongis acuminatis crenato-dentatis ſub-3plinerviis pellucido-punctatis ſubtus tomentoſis, glomerulis paniculatis axillaribus folio brevioribus. *Nov. Caledon.*

pag. 844.

Ad *Böhmeriam* Jacqu.

Poſt n. 10. *repens* Nees. 30. B. caule repente ramoſo foliisque oblongis obtuſis ſerratis 3nerviis hirſutis, cymis 2fidis glomeratis axillaribus longe pedunculatis. *Braſil.*

# CLASSIS XXII.

pag. 892.

*Stephania* Lour. *Menispermeis* accensenda.

pag. 895.

Post n. 3194. *Adriana* Gaudich. ♂ Cal. simplex 5partitus bracteatus. Cor. 0. Antherae apice appendiculatae. ♀ Cal. duplex 5partitus. Caps. 3cocca. Styli 3 2partiti.

---

pag. 899.

Ad *Stephaniam* Lour.

St. *rotunda* Lour. et in *Java*. (Clypea corymbosa Blum.)

*discolor* * 3. St. foliis peltatis ovatis obtusiusculis mucronatis subtus incano-tomentosis, capitulis in umbellam axillarem dispositis. *Java*. (Clypea Blum.)

*venosa* * 4. St. foliis peltatis ovatis obtusiusculis mucronatis glabris subtus albicantibus, venis purpurascentibus, umbellis elongatis compositis axillaribus. *Java*. (Clypea Blum.)

*capitata* * 5. St. foliis peltatis ovatis acutis membranaceis, racemis axillaribus solitariis, receptaculis florum carnosis. *Java*. (Clypea Blum.)

*acuminata* * 6. St. foliis peltatis ovato-oblongis acuminatis subcoriaceis glabris, racemis axillaribus solitariis, receptaculis florum confertis. *Java*. (Clypea Blum.)

*tomentosa* * 7. St. tomentosa, foliis subrotundis obtusis mucronatis, corymbis dichotomis axillaribus folio brevioribus. *Java*. (Clypea Blum.)

pag. 904.

Ad *Pistaciam*.

*mexicana* Kunth. 7. P. foliis impari-pinnatis sub-8jugis subtus petiolisque pubescentibus, foliolis inaequilateris oblongis longe mucronatis, fructibus paniculatis subglobosis. *Mexico*. Humb. nov. gen. 7. t. 608.

pag. 906.

Post *Styloceras* Adr. Juss.:

## ADRIANA Gaudich.

*tomentosa* Gaudich. 1. A. foliis 3-5lobis utrinque tomentosis, lobis dentato-crenatis. *Nov. Holl.*

*glabrata* Gaudich. 3. A. foliis elliptico-oblongis integris 3lobisque supra glabriusculis subtus tomentosis, lobis laciniato-crenulatis. *Nov. Holl.*

pag. 910.

Ad *Cissampelon.*

Post n. 5. *australis* Hilar. 23. C. foliis cordatis emarginatis mucronatis utrinque pubescentibus, floribus racemosis. *Brasil.*

*monoeca* Hilar. 24. C. foliis cordatis obtusis pilosis, floribus monoecis racemosis. *Brasil.*

*gracilis* Hilar. 25. C. foliis cordatis acutiusculis utrinque pubescentibus, floribus ♂ corymbosis. *Brasil.*

*glaberrima* Hilar. 26. C. foliis ovatis acutis nervosis glaberrimis, floribus ♂ corymbosis. *Brasil.*

*litoralis* Hilar. 27. C. foliis cordatis retusis subintegerrimis subtus villosis, racemis ♂ elongatis. *Brasil.*

*communis* Hilar. 28. C. foliis cordato-oblongis acutis integerrimis subtus tomentosis, floribus ♂ racemosis, ♀ glomeratis axillaribus. *Brasil.*

*suborbicularis* Hilar. 29. C. foliis suborbicularibus integerrimis subtus tomentosis, floribus ♂ corymbosis. *Brasil.*

*subtriangularis* Hilar. 30. C. foliis orbiculari-3angularibus integerrimis mucronatis pubescentibus. *Brasil.*

*velutina* Hilar. 31. C. foliis ovatis obtusis villosis, floribus ♂ corymbosis. *Brasil.*

pag. 911.

Post n. 21. *ebracteata* Hilar. 32. C. foliis subrotundo-rhombeis subintegerrimis subtus tomentosis, floribus ♀ axillaribus fasciculatis. *Brasil.*

---

# CLASSIS XXIII.

pag. 913.

*Spixia* Leandr.

☿ Bracteae duae. Perianthia 1phylla 4dentata terna inter pistilla. Stamina flosculi centralis 4, lateralis 2.

♀ Involucrum 1phyllum 2partitum deciduum. Bracteae duae oppositae 2partitae. Perianth. 0. Styli 4, stigmatibus peltatis. Caps. 4 pedicellatae 3loculares, loculis 2valvibus. Sem. arillata.

*Heteranthera* Schrank. *Brasil.* Arbor ramosa, foliis alternis oblongis acutis repando-undulatis subtus ferrugineo-villosis, floribus axillaribus fasciculatis.

pag. 914.

Ad *Parietariam*.

Post n. 6. *Soleirolii* * 11. P. caule repente radicante, foliis obliquis subrotundis pilosis, involucro subnullo, floribus ♂ 4fidis, ♀ 3fidis. *Corsica*. (Helxine Requien.)

AD

# VOLUMEN IV.

# CLASSIS XXIV.

## AD SECT. I.

pag. 30.

Ad *Schizaeam trilateralem* Schk. pertinere videtur Sch. auſtralis Gaudich. ex *Inſ. Falkland.*

pag. 37.

Acroſtichum *maſcarenenſe* * loco maſcarenenſis.

pag. 59.

Ad *Polypodium.*

Poſt n. 185. *alpeſtre* Hopp. 216. P. fronde 2pinnata, foliolis lineari-lanceolatis pinnatifidis, laciniis obtuſis acute ſerratis, ſoris diſtinctis. *Alpeſtria German. auſtr.*

pag. 63.

Ad *Lomariam.*

*robuſta* Carmich. 44. L. frondis ſterilis pinnis oblongo-lanceolatis acutiusculis integerrimis ſupra lanatis ſubtus rhachique paleaceis. *Inſ. Acunnae*, *Falkl.* (L. ſetigera Gaudich. Pteris palmaeformis Thuars.)

*antarctica* Carmich. 45. L. pinnis ſemioblongis obtuſis integerrimis, terminali breviore, induſiis inciſo-eroſis. *Inſ. Acunnae.* (Acroſtichum polytrichoides Thuars.)

pag. 104.

*Aſpidium Wallichianum* * mutetur in A. *Donianum* *, quod jam ſupra p. 96. adeſt A. *Wallichii* Hook.

pag. 126.

Ad *Cyatheam aculeatam* W. herb. C. *compta* Mart. Denkw. Regensb. 2. 146.

Ad C. *hirſutam* Presl. C. *veſtita* Mart. W.

*phalerata* Mart. 18. C. arborea inermis, fronde 2pinnatifida glabra, foliolis lanceolatis acuminatis pinnatifidis, laciniis oblongis obtuſis crenulatis. *Braſil.*

pag. 133.

Ad *Hymenophyllum.*

Poſt n. 36. *caeſpitoſum* Gaudich. 47. H. fronde pinnata coſta media rhachique piloſis, foliolis ſubimbricatis ovato-oblongis concavis integerrimis, ſtipite capillari hirto. *Inſ. Falkland.*

AD

## AD SECT. II.

pag. 137.

*Dawsonia* R. Br. Calyptra (non duplex) externe villosa, interne membranacea dimidiata.

pag. 145.

*Gymnostomum involutum* Hook. habitat et ad *C. B. S.*
*Harrisonia Humboldtii* * habitat et ad *C. B. S.*

pag. 147.

*Hymenostomum cubense* * est verus *Syrrhopodon*. Ergo servandum Schwägrichenii nomen.

pag. 154.

Ad *Grimmiam*.

Post n. 10. *Ecklonii* * 19. Gr. caule breviusculo subramoso, foliis oblongis acuminatis longissime piliferis, nervo apicem attingente, seta flexuosa, capsulae oblongae sulcatae operculo mucronato, dentibus peristomii subforatis. *Ad saxa in monte leonis, C. B. S.* Ecklon. Tela cellularis foliorum arcta subpunctata.

pag. 155.

Post n. 17. *albida* * 20. Gr. caule brevissimo simplici, foliis imbricatis concavis appresso-erectis ovatis acuminatis enerviis versus apicem diaphanis, capsula oblonga laevi. *C. B. S.* Ecklon.

*crassa* * 21. Gr. caule simplici abbreviato, foliis ovato-oblongis obtusis longe piliferis crassis subenerviis, seta elongata, capsulae oblongae operculo conico. *Ad montem leonis C. B. S.* Ecklon.

pag. 158.

Ad *Weisiam*.

Post n. 31. *tortilis* * 32. W. caule brevissimo simplici, foliis lineari-lanceolatis elongatis flaccidis nervosis integerrimis subpellucidis, capsulae oblongae erectae operculo conico subulato. *Ad montem diaboli C. B. S.* Ecklon.

Ad *Maschalocarpum*.

M. *declinatus* * habitat et ad *C. B. S.*

pag. 159.

Post n. 7. *Ecklonii* * 22. M. caule repente, ramis erectiusculis subincurvis, foliis lanceolatis acutis integerrimis,

nervo apicem attingente, feta elongata, capfula oblonga fubftriata, calyptra pilofiffima. *Ad montem tabularem.* Ecklon.

M. *intricatus* * et *urceolatus* * habitat et ad *C. B. S.*

pag. 161.

Ad *Macromitrion.*

M. *longiroftre* Schwägr. (Orthotrichum amoenum Hornfch. *Nov. Holl.* Sieber.)

M. *clavellatum* * et *acutifolium* Brid. habitant et ad *C. B. S.*

pag. 162.

*Trematodon pallidifetus* * Weifia Schwägr. reftituenda.

Tr. *pallidus* * magnopere dubius. Ni genera multiplicentur, *Sclerodontium* Schwägr. reftituendum.

pag. 163.

Ad *Dicranum.*

D. *polypodioides* Sw. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 165.

Poft n. 16. *dicarpon* Nees. 57. D. caule fimpliciusculo denfe radiculofo foliofo, foliis ex ovata bafi linearibus cufpidatis flexuofis argute ferrulatis, nervo apicem attingente, fetis geminis longe vaginatis, capfulae curvatae operculo longe roftrato. *Nov. Holl.*

Poft n. 19. *brachyphyllum* Hornfch. 58. D. caule erecto fubramofo, foliis erecto-patulis ovato-lanceolatis pellucidis acutis albido-glaucis hinc opacioribus apice denticulatis enerviis, capfula fubturbinata cernua. *Nov. Holl.* Cellulae foliorum parallelogrammae.

*Sieberianum* Hornfch. 59. D. caule erecto ramofo, foliis flexuofis lanceolatis cufpidatis integerrimis apice fubtus fcabris, nervo pellucidiori apicem fubattingente, capfulae cylindricae bafi productae cernuae operculo longe fubulato. *Nov. Holl.*

pag. 166.

D. *fafciatum* Hedw. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 170.

*Trichoftomum Barbula* Schwägr. habitat et ad *C. B. S.* Tr. convolutum Brid. effe Weifiam Starkeanam Hedw. Schwägrichen.

Tr. *indicum* W. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 171.

Tr. *polyphyllum* Schwägr. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 172.

Tr. *Leucoloma* Schwägr. (Macrodon Auberti W. Arnott.)

Ad *Didymodontem.*

D. *pusillus* Brid. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 173.

D. *rigidulus* Hedw. habitat in summo cacumine montis tabularis *C. B. S.*

*capensis* * 18. D. caule brevissimo, foliis oblongo-lanceolatis crassiusculis margine revolutis integerrimis mucronatis, nervo crasso apicem attingente, capsulae oblongae operculo subulato. *Ad montem tabularem C. B. S.* Ecklon.

D. *squarrosus* Hook. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 174.

Ad *Polytrichum.*

P. *campanulatum* et *furcatum* Hornsch. esse P. *alpinum*, Schwägrichen.

P. *appressum* Brid. Cilia baseos foliorum aliena videntur Schwägrichenio suppl. 2. p. 6.

pag. 178.

Ad *Barbulam.*

B. *muralis* Timm. et *crinita* Schultz. habitant et ad *C. B. S.*

pag. 180.

*sonica* * 29. B. caule brevissimo, foliis flexuoso-patentibus lineari-lanceolatis integerrimis, nervo valido apicem attingente, capsulae cernuae cylindricae sulcatae operculo conico. *In cacumine montis tabularis C. B. S.* Ecklon.

pag. 183.

*Ad Orthotrichum.*

Post n. 22. *glaucum* * 34. O. caule simpliciusculo brevissimo, foliis oblongo-lanceolatis cuspidato-piliferis margine subincrassatis revolutis siccitate strictis, capsula subemersa sulcata, calyptra glabra. *Ad montem tabularem C. B. S.* Ecklon.

pag. 192.

Ad *Bartramiam.*

Ad B. *pendulam* Hook. (B. Sieberi Hornsch., habitat et in *Nov. Holl.*)

pag. 193.

B. *falcata* Hook. neutiquam ad B. *uncinatam* Schw. pertinet. Est enim illa: B. caule erecto ramoso, ramis fasti-

giato - ſubverticillatis, *foliis* 4fariam diſpoſitis ovato - lanceolatis tenuiſſime ſerrulatis ſecundis, nervo craſſo apicem attingente, ſetis caulem ſuperantibus, capſulis glabris turgidis cernuis. *Tyrol.* Funck.

pag. 194.

Ad *Meeſiam longiſetam* Hedw. Diploeomium hexaſtichon Funck. crypt. n. 658.

M. *dealbata* Sw. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 196.

Ad *Hookeriam* Sm.

Poſt n. 4. † *convoluta* * 33. H. caule vage ramoſo, ramis curvato - involutis, foliis undique ſparſis ellipticis obtuſis integerrimis biſtriatis, nervo obſoleto ad medium evanido. *In monte tabulari C. B. S.* Ecklon.

pag. 203.

Ad *Hypnum.*

Poſt n. 45. *clavatum* * 130. H. caule repente, ramis abbreviatis flexuoſo - incurvis, foliis imbricatis ovato - lanceolatis falcato - ſecundis (luride flavis), ſeta ſubbaſilari laevi, capſula ſubhorizontali clavata. *Ad montem diaboli C. B. S.* Ecklon.

pag. 211.

*Bryum demiſſum* Hook. eſſe Meeſiam, Schwägrichen.

pag. 216.

*Funaria hygrometrica* Hedw. et *calveſcens* Schwägr. copioſae ad *C. B. S.*

pag. 217.

Ad *Jungermanniam.*

Poſt n. 1. *Ecklonii* * 200. J. ſurculis repentibus ramoſiſſimis, foliis diſtichis imbricatis amplexicaulibus orbiculatis integerrimis, auriculis clavatis appendiculatis, ſtipulis cordatis integerrimis emarginatis. *Ad radices arborum in monte diaboli C. B. S.* Ecklon.

*nepalenſis* * 201. J. ſurculis erectiuſculis ramoſis, ramis patentibus, foliis diſtichis amplexicaulibus ſtipulisque orbiculatis integerrimis, auriculis alternis ſubclavatis. *Nepal.* Kunze.

J. *nigricaulis* Nees. habitat et ad *C. B. S.*

J. *dilatata.* (Frullania minor Radd.) *C. B. S.*

J. *Tamariſci.* (Frullania major Radd.)

*globoſa* Meiſsner. 202. J. ramis patentibus, foliis diſtichis ſemiverticalibus ſubrotundis, auriculis clavato - cylindri-

cis appressis, stipulis subrotundis 2lobis, surculis lateralibus globosis. *Ad corticem Chinae fuscae.*

pag. 218.

J. *lobulata* Hook. *Ad montem diaboli C. B. S.*

Post n. 14. *brunea* * 203. J. surculis pinnatis bruneis, foliis confertis distichis patulis orbiculatis integerrimis, auriculis clavatis basi truncatis, stipulis 2fidis, laciniis cuneatis patentibus inciso-dentatis. *In cacumine montis tabularis C. B. S.*

Post n. 18. *denticulata* Web. 204. J. surculis repentibus ramosis, foliis remotiusculis alternis hyalinis oblique ovatis acutis denticulatis, auriculis cucullatis, stipulis subrotundis acute 2lobis. *Ad Trichomanes rigidum.*

pag. 219.

Post n. 27. *conferta* Meisn. 205. J. foliis imbricatis distichis subrotundis integerrimis, auriculis obtusis, stipulis reniformibus integerrimis remotiusculis. *Ad corticem Chinae.*

pag. 221.

J. *transversalis* Sw. habitat et ad *C. B. S.*

*pellucida* Meisn. 206. J. foliis subalternis subrotundis integerrimis tenerrimis pellucidis basi complicatis 1dentatis, stipulis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis. *Ad filices Ind. occid.*

pag. 223.

Post n. 74. *tabularis* * 207. J. surculis erectis simpliciusculis, foliis confertis subrotundo-ovatis integerrimis, stipulis ovatis 2fidis. *Ad montem tabularem C. B. S.* Ecklon.

Ante n. 76. *retrospectans* Nees. 208. J. surculis brevibus radiculosis, ramulis reflexis, foliis distichis adnatis subquadrato-ellipticis dentato-fimbriatis, stipulis 2fidis obsoletis. *Nov. Holl.*

pag. 226.

Post n. 117. *formosa* Meisn. 209. J. surculis ramosis, foliis distichis approximatis obovato-subrotundis hinc excisis integerrimis, auriculis spicato-conoideis patulis. *Martinica ad terram.* Eximia et prope singularis species.

pag. 229.

Ante n. 145. *ochroleuca* * 210. J. surculis ramosissimis, ramis flexuosis incurvatis, foliis undique imbricatis adnatis hyalinis 2-3-4partitis, laciniis linearibus erectis repandis. *Ad montem tabularem C. B. S.* Ecklon.

*digitata* Meissn. 211. J. foliis confertis amplexicaulibus cuneatis laciniatis, laciniis acutis divaricatis. *Ad corticem Chinae.*

pag. 230.

Post n. 160. *superba* Nees. 212. J. surculis erectis, foliis distichis subdecurrentibus semicordato-falcatis altero margine fimbriatis altero integerrimis. *Nov. Holl.*

*longifolia* Meissn. 213. J. foliis alternis adnatis lanceolatis elongatis apice laciniato-fimbriatis. *Amer. austr.*

pag. 231.

Post n. 170. *nervosa* * 214. J. surculis erectiusculis ramosissimis, ramulis convolutis, foliis undique imbricatis patulis oblongis obtusis integerrimis amplexicaulibus obsolete 1nerviis. *C. B. S.* Ecklon. Linea magis pellucida longitudinalis pariter nervum simulat ac in J. albicante.

pag. 233.

J. *podophylla* Thunb. habitat et in *Brasil.* (Viviania Hymenophyllum Radd.)

pag. 234.

Ad *Marchantiam hemisphaericam.* (Duvalia rupestris Nees in berl. mag. 8. p. 271.)

AD SECT. III.

pag. 238.

Post n. 3371. *Leucogramme* Meyer. Lirellae simplices vel subramosae. Lamina proligera canaliculata adnata longitudinaliter rumpens. Sporae e disco angustato propullulantes.

pag. 242.

Ad *Mycoporum* Meyer.

*Melinostigma* Meyer. 2. M. crusta cinereo-nigricante, verrucis planis atris, ostiolis flavescentibus. *Brasil.*

Ad *Ocellulariam* Meyer.

*sphaerica* Meyer. 3. O. crusta cartilaginea glabriuscula lutescente, verrucis hemisphaericis fulvis, ostiolo marginato. *Ad cortices Brasil.*

pag. 248.

Ad *Trypethelium.*

*deustum* Meyer. 13. Tr. crusta albida pulverea effusa, verrucis subconfluentibus rugulosis atris sporangiisque cinereis. *Brasil.*

pag. 254.

Post *Asteriscam*:

## Leucogramme Meyer.

*conferta* Meyer. 1. L. crusta albido-virescente glabra gyrosa, lirellis confertis. *Ad cortices Brasil.*

*turgida* Meyer. 2. L. crusta albido-pallente, lirellis sparsis elevatis elongatis simplicibus flexuosis. *Ad cortices Brasil.*

*carnea* Meyer. 3. L. crusta pallide virescente glaberrima contigua, lirellis sparsis ramosis curvatis extus albidis intus carneis. *Ad cortices Brasil.*

*serpentaria* Meyer. 4. L. crusta inaequabili colliculosa pallide olivacea, lirellis sparsis flexuosis extus albidis intus nigricantibus. *Ad cortices Brasil.*

*plicata* Meyer. 5. L. crusta glabra nivea, lirellis abbreviatis ovali-oblongis concoloribus turgidis margine plicatis. *Ad cortices Brasil.*

*radaccensis* Meyer. 6. L. crusta glabra limitata flavida, lirellis flexuosis turgidis albidis interruptis. *Ad cortices insul. Molucc.*

pag. 255.

Ad *Platygrammen* Meyer.

*suffulta* Meyer. 7. Pl. crusta pallide albida limitata glabra, lirellis irregularibus subramosis immersis interruptis atris. *Ad cortices Brasil.*

Ad *Glyphin* Ach.

*repens* Meyer. 3. Gl. crusta alba effusa pulverulenta, pulvillis difformibus confluentibus, lirellis subrotundis bruneis latentibus. *Ad cortices Brasil.*

pag. 262.

Ad *Lecideam palmicolam* * (L. parmelioides Kunth.)

pag. 263.

Ad *Lecideam erosam* * Gyrophora rugosa Kunth. pertinere videtur.

*porphyrea* Meyer. 103. L. thallo membranaceo glabriusculo margine suberoso ciliato supra ruberrimo papilloso subtus nigricante lacunoso, patellis margine tumidis rugulosis. *In monte tabulari ad C. B. S.*

pag. 271.

Ad *Cladoniam* Hoffm.

Post n. 10. *terebrata* * 39. Cl. thallo subnullo, podetiis elongatis ramosissimis fragilibus virescenti-spadiceis pertusis, ramulis brevibus nitidis furcatis, tuberculis truncatis fuscis aggregatis. *Ad terram Nov. Holl.* (Cenomyce terebrata Laur.)

pag. 276.

Ad *Parmeliam* Ach.

Post n. 8. *Celastri* * 246. P. thallo caespitoso erecto ramoso pallide flavicante, ramulis capillaribus abbreviatis, scutellis planiusculis luteis pallidius marginatis. *Ad ramos Celastri pyracanthae. C. B. S.*

pag. 277.

Post n. 17. *Humboldtiana* * 247. P. thallo caespitoso erecto luteo-virescente, ramis teretiusculis obtusis complicatis lacunosis, scutellis subconcoloribus. *Ad Orinocum.* (Dufourea tortuosa Nees in horis berol. t. 5. f. 2.)

pag. 278.

Post n. 28. *Ecklonii* * 248. P. thallo longissimo ramoso albido laevi, ramis linearibus, ultimis capillaribus, scutellis lateralibus carneis marginatis. *In sylvis ditionis Uitenhagen Afric. austr.* Ecklon.

pag. 280.

Post n. 45. *Sieberiana* Laur. 249. P. thallo tenerrimo suberecto flavissimo subtus albo, ramis linearibus subpinnatifidis intricatis ciliatis, scutellis sparsis aurantiis margine nudis. *Ad corticem Nov. Holl.*

Ad *Parmeliam atlanticam* Ach. meth. Lichen atlanticus Engl. bot. 1715. a Borrero in Angliae rupibus inventus differt colore cinereo-virescente.

pag. 281.

Post n. 54. *involucrata* Meyer. 250. P. thallo erectiusculo candido, laciniis applanatis longe fimbriatis subtus farinosis apice tumidiusculis, scutellis terminalibus concavis bruneis longe fimbriatis. *Brasil.*

pag. 283.

Post n. 74. *concolor* * 251. P. thallo foliaceo lobato imbricato supra glabro virescente pallido subtus laevi livide lutescente, laciniis obtusis crenatis, scutellis concavis subvirescentibus demum fusco-nigricantibus, margine crasso crenulato. *C. B. S.*

Post n. 76. *crinita* Meyer. 252. P. thallo foliaceo utrinque albido glabro; laciniis divaricatis apice dilatatis longe atro-fimbriatis, scutellis lateralibus planis badiis atro-fimbriatis. *Brasil.*

pag. 284.

Post n. 81. *Deweyana* * 253. P. thallo orbiculari pallido glabro subtus livide bruneo glabriusculo, laciniis rotundatis sinuato-lobatis, scutellis concavis fuscis crasse marginatis. *Massachusetts Amer. bor.*

*phyllocarpa* Meyer. 254. P. thallo membranaceo glabro reticulato-lacunofo glauco-virente fubtus ochraceo-pallido, fcutellis planis fufco-rubris, margine foliaceo amplo lacero. *Brafil.*

pag. 285.

Poft n. 95. *propinqua* Laur. 255. P. thallo orbiculari pallido rugofiusculo fubtus albido, fibrillis raris fufcefcentibus, laciniis lobatis erofo-dentatis, fcutellis planiusculis membranaceis fpadiceis, margine tenui granulato. *Ad faxa nov. Holl.*

pag. 286.

Poft n. 105. *limbata* Laur. 256. P. thallo orbiculari fulfureo laevigato fubtus fufcefcente nitido, fibrillis longiusculis nigro-fufcis, laciniis linearibus convexiusculis dichotomis truncatis nigro-marginatis, fcutellis centralibus fpadiceis planiusculis, fubtus ciliato-fibrillofis, margine tenui crenulato. *Ad faxa nov. Holl.*

pag. 287.

Ad *Parmeliam plicatilem* Ach. meth. *Collema olivaceum* Kunth.

pag. 289.

Poft n. 123. *coniocarpa* Laur. 257. P. thallo membranaceo albido-glaucefcente fubtus nigro fibrillofo, lobis elevatis rotundatis incifis, margine crifpo involuto albido pulverulento, fcutellis concavis rufis, margine craffo pulverulento. *Ad arbores nov. Holl.*

Poft n. 125. *fufcefcens* Kunth. 258. P. thallo orbiculari cartilagineo-membranaceo tenuiffime rugofo glauco-fufcefcente fubtus nigro laevi, lobis incifis rotundatis flexuofis integerrimis, fcutellis amplis concavis rufis, margine inflexo integro. *Ad alpes Amer. auftr.*

pag. 290.

Ad *Parmeliam bullatam* Ach. meth. *Collema venuftum* Radd.

*cymbalifera* Meyer. 259. P. thallo foliaceo membranaceo fubdiaphano glauco-olivaceo, lobis erectiusculis reticulatis undulato-crifpis, granulis marginalibus copiofis flavidis, fcutellis folitariis concavis rufis, margine craffo crenulato. *Brafil.*

pag. 292.

*Parmelia aftroidea* Hornem. deleatur, jam fupra p. 282. obvia.

pag. 293.

Poft n. 165. *chryfocarpa* Meyer. 260. P. thallo appreffo diffufo albo papillato-granulofo, fcutellis concavis

disco olivaceo-fuscis, margine tumido integerrimo croceo. *Brasil.*

*lugubris* Meyer. 261. P. thallo radioso lobato circinato fusco-aeneo supra glabro subtus protothalloque ambeunte aterrimis fibrilloso-tomentosis, lobulis crenatis margine albidis, periphericis dilutioribus, scutellis planis fuscis, margine tenui. *Brasil.*

## pag. 294.

Post n. 172. *sanguinolenta* Meyer. 262. P. thallo effuso granuloso intus puniceo supra flavescente, scutellis planiusculis cruentis, margine puniceo integerrimo. *Ad arbores Brasil.* (P. erythrocarpa Meyer Entwickel. p. 16.)

## pag. 298.

Post n. 209. *acervulata* * 263. P. crusta tenui laevigata sulfureo-virescente, scutellis convexiusculis rufo-fuscis, margine tumido flavo. *Ad arbores Brasil.* (Lecanora acervulata Radd.)

## pag. 303.

### Ad *Stictam* Schreb.

*Hessеana* Meyer. 25. St. thallo subcoriaceo lobato ochraceo-fuligineo supra glabro subtus celluloso, cyphellis albis, lobis undulato-crispis obtusis margine farinaceis. *Ad C. B. S.*

*Ecklonii* * 26. St. thallo membranaceo lobato supra glabro pallido subtus fusco aspero, laciniis rotundatis crenatis, scutellis fusco-nigricantibus rubro-marginatis. *Ad montem diaboli C. B. S.*

*rufa* W. Kunth. 27. St. thallo latissimo glauco-rutilante subtus fusco-tomentoso, laciniis rotundatis sinuato-incisis margine nudis, sorediis lateritiis, scutellis sparsis planis fusco-rubris, margine concolore tenuissime crenulato. *Cumana.*

*Humboldtii* Hook. Kunth. 28. St. thallo cinereo-fuscescente utrinque dense hirsuto subtus pallidiori, lobis rotundatis, sorediis concoloribus, scutellis sparsis nigro-fuscis, margine thallode villoso. *Ad cortices nov. Granat.*

*Flotoviana* Laur. 29. St. thallo helvolo-virente lacunoso rugoso subtus fusco-tomentoso, sorediis minutissimis pallidis, laciniis pinnatifidis linearibus apice 2fidis, scutellis marginalibus nigro-fuscis. *Nov. Holl.*

*aspera* Laur. 30. St. thallo lurido-virescente, sorediis albis et fibrillis exasperato subtus ferrugineo-atro tomentoso, cyphellis planiusculis niveis, laciniis dichotomis subpinnatifidis apice repandis, scutellis marginalibus planiusculis nigro-fuscis, margine crenato. *Ins. Mascaren.*

*dissecta* Laur. 31. St. thallo cervino-olivaceo scrobiculato sinuato-laciniato subbipinnato subtus fusco-tomentoso, laciniis linearibus retusis, sorediis minimis

albis, scutellis marginalibus minutis rufis, margine integro. *Nov. Holl.*

*glaberrima* Laur. 32. St. thallo caespitoso ascendente cinnamomeo utrinque laevi laciniato sinuato, laciniis sublinearibus retusis, cyphellis pallidis. *Ins. Mascaren.*

pag. 306.

Ad *Peltigeram* Hoffm.

Post n. 17. *Flörkeana* * 18. P. thallo lobato glauco subtus spongioso-tomentoso nigrescente, lobis rotundatis, scutellis rufis. *Ins. Mascaren.* (Peltidea Laur.)

pag. 310.

Ad *Sphaerophoron* Pers.

*australe* Laur. 5. Sph. thallo dichotome ramoso fibrilloso nitido livide fuscescente subtus pallido compresso, capitulis subglobosis. *Nov. Holl.*

*insigne* Laur. 6. Sph. thallo ramoso nudo plano ruguloso glabro pallide virescente subtus pallido, capitulis compressis. *Nov. Holl.*

*tenerum* Laur. 7. Sph. thallo erecto ramoso nudo albo, ramis teretibus divaricatis fibrillosis, capitulis minutis atris. *Nov. Holl.*

## AD SECT. IV.

pag. 313.

Post n. 3435. *Rhodonema* Martens. Frons tubulosa continua ramosa cartilaginea rosea. Capsulae laterales pedicellatae.

pag. 327.

*Zonaria Kunthii* Ag. habet potius lacinias lanceolatas obtusas undulato-repandas.

pag. 330.

Ad *Lemaneam torulosam* Ag. (Conferva pistrinaria Pollin.)

pag. 345.

Ad *Charam asperam* W. Ch. *hirta* Meyen.

Ad Ch. *gracilem* Sm. Ch. *barbata* Meyen.

pag. 346.

Ad *Charam flexilem*. Ch. *Brauniana* C. C. Gmel.

pag. 360.

Ad *Zygnema stellatum* * (Conferva quadrigranulata Pollin.)

pag. 361.

Ad *Bangiam* Lyngb.

† *aeruginosa* * 9. B. implexa tomentosa aeruginosa, filis duplicibus, aliis majusculis granulorum triplici serie, aliis minoribus dichotomis. *In terra Javae.* (Dichonemia aeruginosa Fr. Nees in nov. act. nat. cur. 13. t. 2.)

pag. 362.

Ad *Oscillatoriam* Vauch.

† *Cortii* Pollin. 21. O. filamentis simplicibus viridibus flexuosis acutis. *In thermis Aponensibus.* (Pollin. sulle alghe nelle terme euganee: Bibliot. ital. 7. f. 4.)

*duplisecta* Poll. 22. O. filamentis simplicibus subfuscis, striis remotiusculis duplicatis. *In thermis Aponensibus.* (Ib. f. 3.)

pag. 364.

Ad *Vaucheriam dichotomam* Ag. (Conferva fontinalis Pollin.)

Ad V. *terrestrem* Cand. (Conferva intexta Pollin.)

† *aponina* * 14. V. ramosissima viridis, ramulis tenuissimis capillaribus hyalinis. *In thermis Aponensibus.* (Merizomyria Pollin. sulle alghe: Conferva aponina Pollin. flor. veron.)

pag. 368.

Post *Soleniam* Ag.:

RHODONEMA Martens.

*elegans* Martens. *Ad litus venetum.*

AD SECT. V.

pag. 396.

*Sphaeria punicea* Schmidt. non Schw.

pag. 405.

Ad *Sphaeriam macularem* Fr. Xyloma concentricum Pers. Depazea frondicola Fr.

Post n. 351. *hederaecola* * 361. Sph. peritheciis conglomeratis molliusculis nigrescentibus macula alba ambitu fuscescente cinctis. *Ad folia Hederae.* (Sph. Depazea hederaecola Fries.)

pag. 409.

Ad *Alphitomorpham pannosam* Wallr. Eurotium Rosae Grev. p. 525.

pag. 424.

*Agaricus luridus* Pers. mutetur in *A. fuscum* Schäff. addito Persoonii synonymo.

pag. 426.

*Agaricus cretaceus* Perf. mutetur in A. *cimolium* * addito Perfoonii fynonymo.

pag. 431.

Ad A. *emeticum* Schäff. ponaturRuffula lurida Perf.
A. *fragilis* Perf. mutetur in A. *thraustum* * addito Perf. fyn.

pag. 453.

A. *pufillus* Fr. mutetur in A. *nanodem* *, addito Friefii fyn.

pag. 463.

A. *femiglobatus* mutetur in A. fubglobofum Alb. et Schwein.

pag. 473.

Ad *Boletum.*

Poft n. 39. *Katui* Ehrenb. 125. B. infundibuliformis membranaceus laevis nitidus fupra zonatus fufco-ruber, poris minimis pallidis. *Nov. Hifpan. Java. Inf. Molucc.*

Poft n. 41. *rugofus* * 126. B. pileo fubrotundo repando rugofo obfolete zonato nigricante coriaceo fubtus velutino, poris minutiffimis, ftipite excentrico fubramofo. *Java.* (Polyporus Fr. Nees.)

*fpathulatus* Kunth. 127. B. pileo convexo late obovato fulvo, poris minutis fubangulatis, ftipite laterali craffo elongato. *Peru.*

*gibbofus* * 128. B. pileo lignofo tuberculato fufco-nigricante, poris minutis, ftipite elongato craffo torulofo concolori. *Java.* (Polyporus gibbofus et Cochlear Fr. Nees.)

*luteus* * 129. B. pileo rigido tenui glabro lutefcente, poris minutis ftipiteque bafi dilatato fubconcoloribus. *Java.* (Polyporus Fr. Nees.)

*affinis* * 130. B. pileo tenui glabro coriaceo dilute caftaneo fubzonato margine albido, poris minutiffimis alutaceis, ftipite tenui glabro fufco. *Java.* (Polyporus Fr. Nees.)

pag. 474.

Poft n. 50. *Pifachapani* * 131. B. pileo digitato elongato nigro-ferrugineo, poris minutis, ftipite tereti. *Java.* (Polyporus Blum. et Fr. Nees.)

*Lingua* * 132. B. pileo linguaeformi fuberofo fupra rugofo fufco-nigricante fubtus luteo, poris minutis. *Java.* (Polyporus Nees.)

pag. 475.

Ad *Boletum mollem* Perf. Polyporus carneus Fr. Nees, e Java, var.

pag. 476.

Ad *Boletum hydnoidem* Sw. B. fibroſus Kunth.

*tenuis* Kunth. 133. B. dimidiatus albo-fuſcus zonatus laevis, poris majuſculis hexagonis fuſcis. *In alpibus Amer. auſtr.*

*telephoroides* Kunth. 134. B. dimidiatus pallide fuſcus rugoſus ſubflexuoſus, poris fuſcis minutiſſimis. *Peru.*

Ad B. *faſciatum* Sw. B. pavonius Kunth. var.

*ſtriatus* Kunth. 135. B. dimidiatus ſubimbricatus coriaceo-membranaceus nigro-fuſcus radiatim ſtriatus concentrico lineatus, poris angulatis fuſco-cinereis. *Peru.*

*purpuraſcens* Kunth. 136. B. dimidiatus reniformis flavo-fuſcus laevis, poris minutiſſimis ſubangulatis purpuraſcentibus. *Nov. Granat.*

pag. 478.

Poſt n. 117. *dictyodes* * 137. B. orbicularis centro affixus pallide fuſcus zonatus reticulato-venoſus, poris majuſculis hexagonis ſubſtantia ſpongioſa farctis. *In alpibus Amer. auſtr.* (B. reticulatus Kunth.)

pag. 480.

*Hydnum fraceolens* Brot. in *Luſitania*, non in Luſatia.

pag. 482.

Poſt n. 47. *palmatum* Kunth. 79. H. dimidiatum palmato-inciſum ſtriatum flavo-fuſcum ſubtus fulvo-villoſum. *Nov. Granat.*

pag. 484.

Ad *Telephoram* Ehrh.

Poſt n. 5. *Palmetto* Radd. 73. Th. pileo flabelliformi laciniato coriaceo fibroſo flavo-fuſco, ſtipite gracili compreſſiuſculo. *Braſil.*

*infundibuliformis* Kunth. 74. Th. maxima, pileo infundibuliformi lobato pallide fuſco extus laevi intus ſquamoſo-hirſuto, ſtipite brevi craſſo. *Peru.*

pag. 485.

Ad Th. *verſicolorem* Sw. Th. badia Kunth., Oſtrea Fr. Nees.

pag. 486.

Th. *Pavonia* Sw. non Bertol. Per totam Indiam occidentalem provenit.

pag. 487.

Ad Th. *ſulfuream* Perſ. Rhacodium ſulfureum Rebent.

pag. 488.

Poſt n. 70. *caerulea* Cand. 75. Th. effuſa tomentoſa azurea, margine demum ſublibero, papillis parvis acutis.

*Ad sepimenta.* (Hypochnus coeruleus Fr. obs. ? Thelephora fimbriata Roth. catal. 2. 257.)

pag. 498.

Ad *Phallum.*

*-oseus* Delil. 4. Ph. pileo depresso viridi-nigricante, stipite cylindrico reticulato fistuloso. *Aegypt.* Delil. t. 59.

pag. 513.

Ad *Pezizam controversam* * Conferva lichenoides Radd. mem. di Modena, vol. 19. p. 48.

pag. 514.

Post n. 221. *limosa* * 259. P. stromate granuloso subfloccoso aurantio-rufescente, cupulis hemisphaericis glabris candidis demum papyraceis. *In limo ad lacus Sebusianos.* (Bresse) Balbis.

pag. 561.

Ad *Erineum* Pers.

*Gei* * 37. E. maculaeforme immersum rufescenti-albidum, floccis subliberis tenuissimis filiformibus apice attenuatis. *In foliis Gei urbani et rivalis.* (Phyllerium Fries.)

*Ribium* Schlechtend. 38. E. immersum effusum bullosum luteo-virescens, floccis sparsis tubulosis basi dilatatis apice cernuis. *In foliis Ribis rubri.*

pag. 388.

Ad *Galium.*

Poſt n. 26. *Moriſii* * 116. G. caule debili ſcabro, foliis ſenis lineari-lanceolatis ariſtatis antrorſum ciliatis, corollis cuſpidatis. *Sardin.* Moris.

*maximum* Moris. 117. G. caule elato glaberrimo, foliis lingulato-linearibus obtuſis laevibus, ſuperioribus quaternis oppoſitisque, umbellis terminalibus. *Sardinia.*

pag. 399.

Ad *Anthoſpermum.*

*ſpermacoceum* Reichenb. 7. A. foliis oppoſitis lineari-lanceolatis acutis cauleque herbaceo glaberrimis, floribus ſolitariis terminalibus. *C. B. S.*

*rubiaceum* Reichenb. 8. A. caule herbaceo, foliis verticillato-faſciculatis lineari-lanceolatis, ſuperioribus fructibusque hirtis, pedunculis oppoſitis ſolitariis. *C. B. S.*

*galioides* Reichenb. 9. A. foliis verticillatis abbreviatis linearibus acutis ſupra glabris ſubtus ferrugineis, fructibus ſcabris aggregatis. *C. B. S.*

pag. 425.

Ad *Exacum.*

Ad E. *palleſcens* * p. 41. Callopiſma perfoliatum Mart. t. 183.
Ad E. *nervoſum* * p. 41. Callopiſma amplexifolium Mart. t. 184.

pag. 426.

Ad *Sebaeam.*

*braſilienſis* * 12. S. caule ramoſo 4gono, foliis ſeſſilibus lanceolatis, pedunculis terminalibus ſubſolitariis, lobis corollae crenulatis. *Braſil.* (Schulteſia crenuliflora Mart. t. 180.)

*gracilis* * 13. S. caule baſi ramoſo gracili paucifolio, foliis ſeſſilibus lanceolatis nervoſis, ramis 1floris, corollae lobis ovatis. *Braſil.* (Schulteſia gracilis Mart. t. 181.)

Ad S. jorullenſem * Schulteſia ſtenophylla Mart. t. 182.

Ad *Coutoubeam.*

C. ſpicata Aubl. (C. denſiflora Mart.)

pag. 531.

Poſt *Heliotropium:*

PRESLEA Mart.

Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis, limbo 10 dentato, dentibus alternis minoribus introrſum conniventibus. Faux faſciculis pilorum 5. Antherae conniventes apice barbatae, latere membrana auctae. Drupa 4pyrena.

*paradoxa* Mart. *Brasil.* Herba ramosissima incano-hirsuta, foliis lanceolatis, floribus lateralibus terminalibusque flavis.

pag. 562.

Anchusa alpestris Stev. del. Est enim Lycopsis alpestris Lehm. p. 555.

*Anchusa crispa* Moris. Viv. 36. A. strigosissima diffusa, foliis oblongis basi attenuatis repando-dentatis, racemis laxis, calycibus subglobosis corolla brevioribus, seminibus triquetris glabris. *Sardin. Corsica.*

pag. 570.

*Anagallis collina* Schousb. habitat et in *Sardinia.*

pag. 585.

Ad *Spigeliam.* Cur. post p. 58. 59.

Sp. Olfersiana Schlechtend. est Sp. pulverulenta Mart. t. 192.

Sp. laurina Schlechtend. — — glabrata Mart. t. 193.

*pulchella* Mart. 12. Sp. caule herbaceo sulcato-angulato superne subaphyllo laevi, foliis minutis linearibus, spicis solitariis, antheris limbum corollae aequantibus, fructibus glabris. *Brasil.*

*pusilla* Mart. 13. Sp. caule herbaceo 4gono decumbente foliisque petiolatis ovatis acutiusculis pubescentibus, staminibus inclusis, fructibus glabris. *Brasil.*

pag. 586.

Ad *Lisianthum.*

*alpestris* Mart. 34. L. caule 4quetro, foliis sessilibus orbicularibus marginatis 5nerviis glabris, pedunculis terminalibus paucis. *Brasil.* (Flores violacei.)

*pendulus* Mart. 35. L. caule alato, foliis sessilibus ovato-oblongis 3-5nerviis, pedunculis subternis terminalibus elongatis flexuosis, calycis laciniis acuminatis. *Brasil.* Flores violacei.

Ad L. *chelonoidem* L. viridiflorus Mart.

Ad L. speciosum Schlechtend. v. supra 59. inflatus Mart.

Ad L. campanulaceum Lam. amplissimus Mart.

Ad L. spathulatum Bonpl. fere pertinet: *Helia oblongifolia* Mart. caule tereti simplici, foliis spathulatis obtusis, floribus cymosis, calycibus obtusis, tubo corollae gibbo. *Brasil.*

*pulcherrimus* Mart. 36. L. caule alato, foliis sessilibus ovatis acutis marginatis 3plinerviis, pedunculis corymbosis 3fidis elongatis, corollis amplis campanulatis e tubo gracili. *Brasil.* Flores coccinei.

Ad L. pedunculatum Schlechtend. supra p. 59. elegans Mart. sed pedunculi 2fidi.

*tenuifolius* * 37. L. caule simplici alato, foliis linearibus marginatis revolutis, pedunculo terminali solitario, floribus cernuis (coccineis). *Brasil.* (L. angustifolius Mart.)

*paniculatus* * 38. L. caule 4gono, foliis petiolatis lanceolatis triplinerviis, paniculae laxae ramis flexuosis, corolla glanduloso-pubescente. *Brasil.* (Irlbachia paniculata Mart.)

pag. 589.

Ad *Hippion* *.

*diffusum* * 5. H. caule gracili superne diviso, foliis quaternis ternisve ovatis acutis, floribus laxe paniculatis. *Brasil.* (Schübleria diffusa et conferta Mart.)

Ad Hippion controversum * Schübleria stricta Mart. t. 187. Eximia analysis.

*patulum* * 6. H. caule gracili paniculato, foliis linearibus, corollae laciniis acutiusculis. *Brasil.* (Schübleria patula Mart. t. 188.)

pag. 670.

Post *Rotulam* Lour.:

RHABDIA Mart.

Asperifoliae.

Cal. 5partitus. Cor. campanulata. Stam. inclusa. Stigma 2lobum. Bacca 4pyrena.

*lycioïdes* Mart. *Brasil.* Frutex ramis virgatis, foliis sparsis sessilibus oblongis undulatis hirsutis, floribus bracteatis pedunculatis purpurascentibus.

pag. 671.

Theophrasta glycycarpa del.

LEONIA R. et P.

Cal. 5lobus. Cor. campanulata 5partita. Filamenta connata. Antherae 2loculares. Bacca 1locularis, *placentatio parietalis*.

*racemosa* Mart. 1. L. paniculis racemosis axillaribus pendulis. *Peru. Brasil.* (L. glycycarpa R. et P.)

*cymosa* Mart. 2. L. cymis axillaribus patulis. *Brasil.*

pag. 704.

Ad *Cinchonam*.

Post n. 18. *gratissima* Wall. 19. C. foliis elliptico-oblongis acuminatis subtus ad venas villosis, stipulis caducis lanceolatis glabris, paniculae ramis decussatis calycibusque villosis, seminum membrana crenulata. *Nepal.* Speciosissima familiae.

pag. 736.

*Campanula lobelioides* habitat in *Calabria*, Berger.; in *Sardinia*, Moris.

pag. 766.

Ad *Hirtellam.*

*canomensis* * 9. H. racemis axillaribus bracteatis pendulis villosis, floribus polyandris, foliis oblongis subtus ferrugineis. *Brasil.* (Moquilea canomensis Mart. 2. t. 166.)

*tomentella* Schott. 10. H. racemis terminalibus ferrugineo-tomentosis, floribus 6-7andris, foliis oblongis utrinque attenuatis supra glabratis subtus hirsutis. *Brasil.*

*angustifolia* Schott. 11. H. racemis simplicibus nutantibus hirtis, floribus 7-9andris, foliis subcordato-lineari-lanceolatis acutis utrinque hirsutis. *Brasil.*

pag. 817.

Achyranthes aspera habitat et in *Sardinia.* Moris.

pag. 848.

Asclepias filiformis * mutetur in *Jacquinianam* *.

pag. 895.

Tordylium humile Desf. habitat et in *Sardinia.* Moris.

pag. 930.

Post *Microteam:*

## ADENOGRAMMA Reichenb.

Cor. calycina infera caduca 5petala, petalis striatis. Stam. simplicia cum petalis alternantia. Stigmata 2. Germen 3lobum glandulosum 1spermum. Embryo inversus curvatus.

*Mollugo* Reichenb. *C. B. S.* Herba tenera ramosa, foliis linearibus verticillatis, floribus paniculatis.

pag. 956.

Ad *Sibbaldiam.*

Post n. 2. *californica* * 7. S. erecta viscido-pilosa, foliis pinnatis pinnatifidisque, floribus paniculatis 10andris polygynis, petalis calyce brevioribus. *California.* (Horkelia californica Schlechtend.)

# TOM. II.

pag. 62.

Ad *Lilium*.

*giganteum* Wall. 24. L. caule elato multifloro, foliis petiolatis cordato-ovatis acuminatis venosis, floribus racemoso-spicatis cernuis intus glabris. *Nepal.* (Wallich. flor. nepal. t. 12. 13.)

pag. 126.

Ad Amajouam guianensem Aubl., Martio monente, pertinere videtur Ehrenbergia ciliata * p. 133., quae igitur delenda.

pag. 133.

Post *Amooram* Roxb.:

## PREPUSA Mart.

Cal. campanulatus 6fidus alatus. Cor. 6fida. Stigma 2lamellatum. Caps. 1locularis 2valvis, valvis introflexis placentiferis. *Gentianea*, a Sebaea et habitu et numero partium differt.

*montana* Mart. *Brasil.* Frutex foliis obovato-oblongis emarginatis 3nerviis marginatis, floribus racemosis flavidis.

pag. 157.

Post *Menispermum*:

## HOLLBÖLLIA Wall.

Flores monoeci. Perianth. 6phyllum duplici serie. Stam. distincta. Glandulae 6 staminum basi oppositae. Baccae oblongae folliculares 1loculares polyspermae.

*latifolia* Wall. 1. H. foliis quinatis ovato-oblongis 3nerviis, floribus racemosis. *Nepal.* (Wallich. flor. nepal. t. 16.)

*angustifolia* Wall. 2. H. foliis septenatis lineari-lanceolatis acuminatis, floribus umbellatis. *Nepal.* (Wallich. flor. nepal. t. 17.)

pag. 192.

Ad Ericam scopariam add. patriam: *Europ. austr.*

pag. 235.

Post *Fuchsiam*:

## SARCOPYRAMIS Wall.

Cal. inverse pyramidatus 4dentatus, dentibus ciliatis. Antherae simplices rectae. Caps. basi calyce cincta apice 4alata 4locularis polysperma.

*nepalensis* Wall. *Nepal.* Herba simplex, caule 4gono, foliis oppositis petiolatis ovatis acuminatis ciliato-serratis nervosis, floribus subumbellatis carnosis roseis. (Wallich. flor. nepal. t. 28.)

pag. 237.

Daphne oleoides Schreb. habitat et in *Sardinia.*

pag. 286.

Post *Styracem:*

## DICLIDANTHERA Mart.

Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis. Antherae in fauce sessiles 2valves. Stigma simplex. Bacca oligosperma.

*penduliflora* Mart. 1. D. foliis alternis oblongis, petiolis 2glandulosis, racemis pendulis. *Brasil.*

*laurifolia* Mart. 2. D. foliis oblongis, petiolis eglandulosis, racemis erectis pubescentibus. *Brasil.*

*Potaliam amaram* Aubl. nomine P. resiniferae Martius nov. gen. t. 170. eximie illustravit. Resiniferam esse Aubletius ipse (1. p. 396.) testatur.

pag. 287.

Ad Gaultheriam procumbentem forte *Arbutus acadiensis* Mill., quae nusquam a nuperis scriptoribus americanis indicatur.

pag. 325.

Ad *Tribulum.*

*brasiliensis* * 8. Tr. foliis 5jugis oblique ovatis villosiusculis, pedunculis folio brevioribus, fructibus cristatis decaspermis. *Brasil.* (Ehrenbergia tribuloides Mart.)

pag. 511.

Ad *Pyrum.*

Post n. 38. *sorbifolia* Chamiss. 44. P. foliolis ovato-lanceolatis argute serratis acuminatis nervo margineque pilosis apice barbatis, gemmis glutinosis, stipulis rufo-villosis. *Camtschatca.*

pag. 527.

Ad *Rubum.*

*tagallus* Chamiss. 78. R. ramis teretibus tomentosis, aculeis sparsis uncinatis, foliolis ovatis duplicato-serratis pubescentibus eglandulosis, floribus subsolitariis, laciniis calycis elongatis petala subaequantibus demum reflexis. *Ins. Luzon.*

*Mundtii* Schlechtend. 79. R. ramis angulatis tomentosis eglandulosis, aculeis uncinatis crebris, foliis pinnatis ternatisque

supra pilosis subtus incano-tomentosis, panicula coarctata, petalis obovatis calyce brevioribus. *Afric. austr.*

*chrysocarpus* Schlechtend. 80. R. ramis tomentosis glandulosis, aculeis sparsis uncinatis, foliis pinnatis ternatisque supra glabris subtus tomentosis glandulosis, panicula coarctata, petalis obovatis calycem aequantibus. *Afric. austr.*

pag. 528.

Post n. 21. *Selloi* Schlechtend. 81. R. ramis aculeatissimis, sterilibus pentagonis fertilibus teretibus, foliis quinatis ternatisque subtus villosissimis, panicula elongata, calycibus fructiferis erectis. *Monte Video.*

*imperialis* Schlechtend. 82. R. ramis sterilibus pentagonis glabris, aculeis uncinatis, foliis quinatis ternatisque utrinque viridibus, calycibus tomentosis petala excedentibus demum reflexis. *Brasil.*

pag. 530.

*ursinus* Chamiss. 83. R. ramis teretibus tomentosis, aculeis crebris subulatis rectis, foliis ternatis simplicibusque subtus incano-tomentosis, floribus paniculatis, calycibus aculeatis. *California.*

pag. 531.

*vitifolius* Chamiss. 84. R. ramis pubescentibus, aculeis rectiusculis subreversis, foliis cordatis 3lobis glabriusculis, floribus corymbosis, laciniis calycis elongatis acuminatis. *California.*

pag. 536.

Ad *Potentillam.*

*lignosa* W. herb. 110. P. fruticosa, ramis tortuosis compressis, foliis quinato-digitatis sericeis, foliolis cuneatis truncatis apice dentatis, pedunculis solitariis. *Hyrcania.*

pag. 541.

Post n. 82. *elegans* Schlechtend. 111. P. caule erecto 1floro, foliis petiolatis glabriusculis ternatis, foliolis profunde inciso-lobatis, lobis linearibus obtusis integerrimis 3fidisque, stipulis membranaceis acutis, petalis obcordatis calycem superantibus. *Camtschatca.*

pag. 543.

Ad *Sieversiam.*

*rotundifolia* Chamiss. 9. S. foliis pinnatis, foliolis cordato-orbiculatis obsolete lobatis duplicato-dentatis radiatim nervosis, caule foliato paucifloro, laciniis calycis

subdentatis, petalis late obcordatis. *Ins. Aleut.* (Geum rotundifolium Langsd. Cand.)

## pag. 600.

Myrodendron Schreb. melius in Monadelphia collocatur. Drupa 8locularis, loculis 4 super. 4 inferioribus.

*crassifolium* * 2. M. foliis obovato-oblongis subemarginatis integerrimis, petiolis alatis, panicula corymbosa. *Brasil.* (Humirium Mart.)

*floribundum* * 3. M. foliis obovatis in petiolum decurrentibus, ramis pedunculisque ancipitibus, floribus corymbosis. *Brasil.* (Humirium Mart.)

## pag. 612.

Ad *Cliffortiam.*

*filicaulis* Schlechtend. 24. Cl. caule ramosissimo prostrato, ramis filiformibus, foliis fasciculatis cuneato-obovatis 3dentatis margine villoso ciliatis, stipulis membranaceis lanceolatis acutis. *Afric. austr.*

Ad Cl. *obcordatam.* (Cl. serpyllifolia Schlechtend.)

## pag. 628.

Ad *Marialvcam.*

*brasiliensis* Mart. 4. M. foliis lanceolatis glabris, pedunculis geminis 1floris. *Brasil.*

## pag. 642.

Ad *Cadsuram* Juss.

*grandiflora* Wall. 2. C. fruticosa volubilis, foliis oblongis acuminatis serratis subtus reticulatis, pedunculis 1floris. *Nepal.*

*propinqua* Wall. 3. C. fruticosa volubilis, foliis ovato-lanceolatis subintegerrimis, floribus subfasciculatis, pedunculis bracteatis. *Nepal.*

Ad Schizandram Mx. accedere Wallich.

## pag. 643.

Ad *Magnoliam.*

*insignis* Wall. 20. M. arborea, foliis oblongis acuminatis subtus glaucis venoso-reticulatis, gemmis ferrugineo-tomentosis, floribus terminalibus solitariis 9petalis, petalis 3 exterioribus reflexis, capsulis 4spermis. *Nepal.*

*excelsa* Wall. 21. M. arborea, foliis oblongo-ellipticis acuminatis subtus glaucis reticulato-venosis, gemmis ferrugineo-barbatis, floribus solitariis 12petalis, capsulis globosis remotis 1spermis. *Nepal.*

Ad *Micheliam.*

*lanuginosa* Wall. 12. M. arborea, foliis oblongis utrinque attenuatis subtus gemmisque dense tomentosis, floribus polypetalis. *Nepal.*

pag. 851.

Crambe reniformis Desf. habitat et in *Sardinia.*

pag. 911.

Brassica Sabularia Brot. habitat et in *Sardinia.*

---

# Tom. III.

pag. 37.

Ad *Passifloram.*

Post n. 20. *nepalensis* Wall. 86. P. foliis cordato-oblongis integerrimis subtus petiolisque glandulosis, pedunculis squamatis aggregatis, calyce coronam triplicem superante. *Nepal.*

† *cochinchinensis* * 87. P. foliis oppositis ovatis integerrimis glabris, petiolis 2glandulosis, floribus axillaribus geminis. *Cochinchina.* (P. pallida Lour.)

pag. 92.

Malva althaeoides Cav. habitat et in *Sardinia.*

pag. 182.

Ad *Ononida.*

*litoralis* Moris. 78. O. herbacea diffusa villosa, foliolis obovatis argute serratis glandulosis, stipulis late amplexicaulibus ovatis serrulatis, floribus racemosis, calycibus corollam subaequantibus, leguminibus 1spermis. *Sardiniae litora.*

pag. 270.

Ad *Ervum.*

*surdoum* Moris. 16. E. pedunculis racemosis, leguminibus dispermis pendulis foliolisque truncato-emarginatis mucronatis glaberrimis, petiolis cirriferis, stipulis lineari-lanceolatis ciliatis. *Sardinia.*

pag. 367.

n. 2918. *Brunonia* Sm. del. Est enim jam vol. 1. p. 538. n. 577.

pag. 561.

n. 112. Senecio *Cinerariae* * loco arenarii, appositis M. B. et Vir. synonymis.

pag. 666.

Ad *Scorzoneram*.

*sardoa* Moris. 38. Sc. foliis linearibus obtusiusculis nervosis sparse pilosis, scapo subsquamato, anthodio glabro. *Sardinia*.

pag. 769.

Ad *Arum*.

Post n. 21. *speciosum* Wall. 32. A. acaule, folio solitario ternato, foliolis cordato-ovatis acuminatis repandis venosis, spatha striata longe acuminata, spadice apice longissime filiformi. *Nepal.* (Wallich. flor. nepal. t. 20.)

*costatum* Wall. 33. A. acaule, folio solitario ternato, foliolis elliptico-oblongis acuminatis venoso-costatis, lateralibus semicordatis, spatha nervoso-striata acuminata, spadice apice longissime filiformi. *Nepal.* (Wallich. flor. nepal. t. 19.)

*nepenthoides* Wall. 34. A. caule erecto variegato, foliis binis peltatim digitatis, foliolis subsessilibus lanceolatis acuminatis subtus glaucis, spatha variegata apice triloba, lobis lateralibus obtusis reflexis, medio acuminato, spadice clavato obtuso. *Nepal.* (Wallich. flor. nepal. t. 18.)

# INDEX

## AUCTORUM IN HOC OPERE CITATORUM.

*Abel.* Clarke Abel, medicus oratoris britannici in China, Amherſtii: *A narrative of a journey in the interior of China.* Lond. 1818. 4. Plantas ab eo collectas R. Brownius illuſtravit.

*Ach. Achar.* Eric. Acharius, medicus provincialis Vadſtenae in Suecia († 1819): *Lichenographiae ſuecicae prodromus.* Lincop. 1798. 8. *Methodus lichenum.* Stockh. 1805. 8. *Lichenographia univerſalis.* Gott. 1810. 4. *Synopſis methodica lichenum.* Lund. 1814. 8. Obſ. in actis acad. ſuec. holm., in actis ſoc. Linn. et hiſt. nat. Moſcov.

*Adam.* Jo. Frider. Adam, comitis Muſſin-Puſchkin in itinere per Caucaſum (1800—1802) ſocius. Decades 5 novarum plantarum: in Weber's et Mohr's Beyträgen zur Naturkunde, Bd. 1.

— M. F. Adams Sibiriam arcticam et orientalem perſcrutatus eſt. Obſerv. in actis acad. Petropol. et ſoc. hiſt. nat. Moſcov.

*Adanſ.* Mich. Adanson, acad. pariſ. ſocius, diu in Afric. occidentali vixit. (nat. 1725 † 1806.) *Familles des plantes.* vol. 1. 2. Paris 1763. 8.

*Afzel.* Ad. Afzelius, prof. Upſalienſis. *Genera plantarum guineenſium.* Upſal. 1809. 4. *Remedia guineenſia.* Upſal. 1816. 4. Obſ. in act. holm. 1783. 1788 ſ.

*Ag.* Car. Agardh, prof. Lundinenſis. *Synopſis algarum Scandinaviae.* Lund. 1817. 8. *Några Ord om Tobaks odlingens förbättring.* 1819. 8. *Species algarum rite cognitae.* Lund. 1820. 8. *Icones algarum ineditae.* Lund. 1820 ſ. *Syſtema algarum.* Lund. 1824. 8. Obſ. in nov. act. nat. cur. 13.

*Ait.* Gul. Aiton, horti Kewenſis regii praefectus (nat. 1731 † 1793), auxilio Jonae *Dryandri* edidit *Hortum kewenſem.* vol. 1—3. Lond. 1789. 8. Filius, Gul. Townſend Aiton, ſucceſſor patris, adjuvante inprimis R. *Brownio*, ſecundam editionem curavit, vol. 1—5. Lond. 1810—1813. 8.

*Alb. et Schw.* J. B. ab Albertini et Lud. Dav. a Schweiniz, eccleſiae Moravicae addicti: *Conſpectus fungorum in agro Niskienſi creſcentium.* Lipſ. 1805. 8.

*Allam.* l. Allem. Frider. Allamand: Obſ. in nov. act. nat. cur. vol. 4.

*Allion.* Carol. Allioni, prof. Taurinenſis (nat. 1725 † 1804): *Flora pedemontana*, vol. 1—3. Aug. Taur. 1785. fol. *Auctarium ad floram pedemontanam.* Taurin. 1789. 4.

*P. Alpin.* Proſper Alpini, prof. Patavinus, diu in Aegypto et Graecia degit (nat. 1553 † 1617.). *De plantis Aegypti*, ed. J. Vesling. Patav. 1640. 4. *De plantis exoticis.* Venet. 1627. 4.

*S. Amand.* . . S. AMANS: Obf. in Recueil des travaux de la foc. d'agriculture d'Agens, vol. 1.
*Anderf.* Georg. ANDERSON, horti Chelfeani praefectus: Obf. in Transact. of Linn. foc. 11. 12.
— Gul. ANDERSON, medicus in infula S. Vincentii, multas in Britanniam plantas novas introduxit.
*Andr.* Henr. ANDREWS, pictor: *The botanifts repofitory*, vol. 1—6. Lond. 1797 f. *Coloured engravings of heaths*, vol. 1—5. Lond. 1802 f.
*Andrz.* Anton. ANDRZEIOWSKI, adjutor Befferi, regiones Tyrae, Boryfthemi et Hypani finitimas orasque Ponti euxini fedulo peragravit, plantas inprimis cruciferas fcienter illuftravit. Obf. ejus et Befferus et Candolleus divulgarunt.
*Anguill.* Ludov. ANGUILLARA, prof. Patavinus et Ferrarienfis († 1570.) Italiam, Graeciam, Macedoniam et Dalmatiam peragravit. *Semplici.* Vineg. 1561. 8.
*Arbr.* Anton. DE L'ARBRE: *Flore d'Auvergne*, vol. 1. 2. Clermont. 1800. 8.
*Arduin.* Petr. ARDUINO, prof. Patavinus. *Animadverfionum botanicarum* fpecimen 1 et 2. Patav. 1759. Venet. 1764. 4. Obf. in Saggi dell' accad. di Padova, 1. 2.
*Arnott.* G. A. *Walker*-ARNOTT: Obf. in Mem. of the Wernerian foc., in Edinb. philof. journ., in Mém. de la foc. d'hift. nat. à Paris, 2.
*Afpegr.* G. Caften ASPEGREN, piftor Carolicoronae in Suecia: *Förfök til en Blekingfk flora.* Carlscrona. 1823. 8.
*Aff.* Ignat. DE ASSO: *Synopfis ftirpium indigenarum Arragoniae.* Maffil. 1779. 4. Enumeratio ftirpium in Arragonia detectarum, recuf. in Römer. fcript. de plantis hifpanicis.
*Aub.* v. *Thuar.*
*Aubl.* Fufaeus AUBLET, peregrinator, qui diu in Guiana gallica vixit. *Hiftoire des plantes de la Guiane françaife.* vol. 1—4. Paris 1775. 4.

*Balb.* Jo. Bapt. BALBIS, prof. Taurinenfis, jam Lugdunenfis, cui innumeras debeo plantas. *Flora taurinenfis*, Taurin. 1806. 8. *Horti academici taurinenfis icones et defcriptiones*, fafc. 1. Taurin. 1810. 4. Eo potiffimum et Domin. *Nocca* auctoribus: *Flora ticinenfis*, vol. 1. 2. Ticin. 1816. 1821. 4. Obf. in act. acad. Taurinenfis.
*Baldw.* Gul. BALDWYN, medicus Savannae in Georgia Amer. bor., Elliottio, Nuttallio aliisque multas largitus eft plantas. Obf. in Silliman's americ. Journal.
— Gul. BALDWIN, Philadelphenfis, cum Torreyo plura communicavit.
*Banks.* Jof. BANKS, praefes regiae focietatis britannicae, Cookii comes illuftris in primo itinere περιχοσμίῳ: plurimas plantas, ab ipfo inventas et nuncupatas, aliis defcribendas commifit (nat. 1743 † 1820.). *Reliquiae Houftounianae.* Lond. 1781. 8. *Icones felectae plantarum, quas Kämpferus in Japonia collegit et delineavit.* Lond. 1791. fol. *On the blight in corn.* Lond. 1805. 4., recuf. in Annals of bot. 2.
*Barrel.* Jac. BARRELIER, ex ordine monachorum Dominici, magnus peregrinator (nat. 1606 † 1673.): *Plantae per Galliam, Hifpaniam et Italiam obfervatae*, ed. Ant. Juffieu. Paris 1714. fol.

*Bart.* Gul. P. C. BARTON, prof. Philadelphenſis: *Compendium florae philadelphicae.* vol. 1. 2. Philadelph. 1818. 8.

*Bartl.* Frider. Theophil. BARTLING, M. D. Gottingenſis: *Diofmeae deſcriptae et illuſtratae.* Gott. 1824. 8.

*Bartr.* Gulielm. BARTRAM, praedii et horti botanici prope Philadelphiam poſſeſſor: *Travels through South- and North-Carolina* Philadelph. 1791. 8.

*Bât.* T. BATARD, Andegavienſis: *Flore du département de Maine et Loire.* Angers. 1809. 12. *Notices ſur les végétaux du jardin des plantes d'Angers.* 1810. 12. *Supplément à la flore.* 1812. 12.

*Batſch.* Jo. Georg. Car. Aug. BATSCH, prof. Jenenſis (nat. 1761 † 1802): *Elenchus fungorum*, tab. 1—30. Hal. 1783. 1784. 4.

*Battarr.* Jo. Ant. BATTARRA († 1789): *Fungorum agri Ariminenſis hiſtoria.* Favent. 1759. 4.

*Bauer.* Ferdin. BAUER, pictor egregius: *Illuſtrationes plantarum novae Hollandiae.* Lond. fol. 1813. tab. 1—10.

*C. Bauh.* Caſp. BAUHINUS, prof. Baſileenſis (nat. 1550 † 1624): *Prodromus theatri botanici.* Frcf. 1620. 4. *Pinax theatri botanici.* Baſil. 1623. 4.

*J. Bauh.* Jo. BAUHINUS, prioris frater, archiater Montisbeligardi (nat. 1541 † 1613): *Hiſtoria plantarum univerſalis.* vol. 1-3. Ebrodun. 1650. 1651. fol.

*Baumg.* Jo. Chriſt. Gottl. BAUMGARTEN, medicus Schäsburgi in Transſylvania: *Flora lipſienſis.* Lipſ. 1790. 8. *Enumeratio ſtirpium magno ducatui Transſylvaniae indigenarum,* tom. 1—3. Vindobon. 1816. 8. Multas mihi plantas largitus eſt.

*Beck.* Ludov. C. BECK, ſcholae Renſſelaerianae collega in Albania Amer. bor., regiones Miſſuri vicinas perſcrutatus eſt. Obſ. in Silliman's amer. Journ.

*Bellard.* Ludov. BELLARDI, praefectus horti bot. Taurinenſis: *Appendix ad floram pedemontanam.* Aug. Taurin. 1792. 4. Innumeras plantas ab ipſo accepit Willdenovius.

*Berg.* Petr. Jon. BERGIUS, prof. Holmienſis († 1790): *Deſcriptiones plantarum e capite bonae ſpei.* Stockh. 1767. 8. *Materia medica e regno vegetabili.* vol. 1. 2. Stockh. 1778. 8. Obſ. in act. acad. holm. et petropolit.

— Car. Henr. BERGIUS, Cuſtrinenſis, pharmacopola, in regionibus C. B. S. vicinis multas collegit plantas, quas jam herbarium regium berolinenſe continet. (Nat. 1792 † 1817.)

— O. E. BERGIUS: *Om Veſtindien.* Stockh. 1819. 8.

*Berger.* ..BERGER, egregius plantarum italicarum collector, tum miles, pro patria cecidit 1813.

— Jo. BERGERET, medicus Pali in Bearnia: *Flores des baſſes Pyrénées.* vol. 1. 2. Pau. 1803. 8.

*Bernh.* Jo. Jac. BERNHARDI, prof. Erfurtenſis. Obſ. in Schraderi diario 1799 ſ. Multas tum in horto cultas tum ſpontaneas plantas cum aliis communicavit.

*Berter.* Car. Joſ. BERTERO, eximius peregrinator, qui per Indiam occidentalem ſtudioſe et ſcienter plantas collegit et cum magiſtro Balbiſio communicavit. Ab hoc plurimas accepi.

*Bertol.* Antonin. BERTOLONE, prof. Bononienſis: *Amoenitates italicae.* Bonon. 1819. 4. Is liber complectitur, quae prius ſeorſim ediderat. Obſ. in Opuſc. ſcientif. di Bologna.

*Beſſ.* W. J. J. BESSER, prof. Creminicenſis in Volhynia: *Primitiae florae Galiciae.* vol. 1. 2. Vienn. 1809. 12. *Enumeratio planta-*

*rum in Volhynia etc. collectarum.* Viln. 1822. 8. Multas ipsi plantas debeo.

*Bichen.* J. E. BICHENO, Socius: Obf. in Transact. of Linn. Soc. 12.

*Bigel.* Jac. BIGELOW: *Florula bostoniensis.* Boston. 1814. 8.

*Billb.* Jo. Georg. BILLBERG cum Swartzio botanicon fuecicum *(Svensk botanik)* edidit.

– Imman. BILLBERG: diff. plantarum brafilienfium decas. Upfal. 1817. 4.

*Bir.* J. A. J. BIRIA: *Histoire naturelle et médicale des Renoncules.* Montpell. 1811. 4.

*Bivon.* Anton. BIVONA-*Bernardi, L. B. de Alta turre: Siculorum plantarum cent.* 1. Panorm 1806. 8. *Monografia delle Tolpidi.* Palerm. 1809. fol. *Stirpium rariorum in Sicilia provenientium manip.* 1—4. Panorm 1813—1816. 4.

*Blan.* Gilb. BLANE, medic. Londinenfis: Obf. in Philof. transact. vol. 80. et in Transact soc. Bengal. 4.

*Bland.* Otto Chrift. BLANDOW, pharmacopola Warenenfis Megapol. Mufci frondofi exficcati fafc. 1—5. Florulae Sturmianae fafc. 9. elaboravit.

*Blom.* Car. Magnus BLOM, medicus Suecanus: Obf. in act. acad. holm.

*Blum.* C. L. BLUME, praefectus horti botanici ad Bataviam, Javam perfcrutatus eft. *Catalogus van de gewassen in't Plantetuin te Buitenzorg.* Batav. 1823. 8. *Bijdragen tot de Flora van nederlandsche Indië.* St. 1—5. Batav. 1825. 1826. Obf. in Verhandel. van het bataav. Genootfch. 9, in nov. act. nat. cur. (interprete Neefio) et in Regensb. bot. Zeit.

*Bocc.* Sylv. Paul. BOCCONE, monachus ficulus, botanicus magni Etruriae ducis, plantarum collector (nat. 1633 † 1704): *Mufeo di piante rare.* Venez. 1697. 4.

*Böb.* Jo. A BÖBER, παιδαγωγίας equeftris ruthenicae director (nat. 1746 † 1820). Obf. in Pallas neuen nord. Beytr. Plantarum copiam ab eo Willdenovius habuit.

*Böhm.* Georg. Rud. BÖHMER, prof. Wittebergenfis (nat. 1723 †1803): *De plantis in cultorum memoriam nominatis.* Lipf. 1799. 8.

*Bönningh.* C. M. F. A BÖNNINGHAUSEN, a confil. regiminis Monafterii: *Prodromus florae Monafterienfis.* Monaft. 1824. 8.

*Boerh.* Hermann. BOERHAAVE, prof. Leidenfis (nat. 1668 † 1738): *Index primus et alter plantarum, quae in horto lugdunenfi aluntur.* LB. 1710. 1720. 4.

*Bolt.* Jac. BOLTON: *Filices britannicae.* P. 1. 2. Leeds et Huddersfield. 1785. 1790. 4. *Gefchichte der merkwürdigften Pilze,* Th. 1—3., interprete Willdenow. Berl. 1795—1799. 8. Th. 4., curantibus Neefiis. Berl. 1820. 8.

*Bonam.* Franc. BONAMY: *Florae nannetenfis prodromus.* Nannet. 1782. 12. *Addenda ad prodromum.* 1785. 12.

*Bondt.* Nic. BONDT, prof. Amftelodamenfis (nat. 1765 † 1796): *Diff. de cortice Geoffraeae furinamenfis.* LB. 1788. 8.

*Bonpl.* Amatus BONPLAND, Humboldtii comes, dein hortis regiis Malmaifon et Navarre praefuit, poft Americam auftralem adiit, ubi jam obfes a Francia, apud quem fumma eft rerum in Paraguay, detinetur. Humboldtii plantas aequinoctiales et Melastomata curavit. *Defcription des plantes rares, cultivées à Malmaifon et à Navarre.* fafc. 1—10. Paris 1813—1816. fol.

*Borkhauf.* Maurit. Balthaf. BORKHAUSEN, Darmftadienfis: *Befchreibung der im Darmftädtfchen wachfenden Holzarten.* Frkf.

1790. 8. *Tentamen dispositionis plantarum Germaniae seminiferarum*. Darmst. 1792. 8. *Handbuch der Forstbotanik*. Th. 1. 2. Giess. 1800—1803. 8. Obs. in Römeri Archiv. 1. 2.

*Bory*. Jo. Bapt. BORY *S. Vincent*, Agini in Aquitania natus, insulas Mascarenas 1802—1803 perscrutatus est, e quibus ingentem plantarum numerum cum Willdenovio communicavit, dein sub Napoleone stipendia meruit, post Bruxellis *Annales générales des sciences physiques* tom. 1—8. redegit, jam Parisiis privatam agit vitam. *Voyage dans les principales îles des mers d'Afrique*. Paris 1804. 4. Obs. in annalibus bruxellensibus, musei parisiensis, soc. nat. scrutator. berol. (Berl. Magaz. 2. 3.)

*Bosc*. Ludov. BOSC, peregrinator, jam praefectus horti regii parisiensis. Obs. in actis instit. gallici, in Dictionn. des scienc. natur. et in Berl. magaz. 5.

*Bouch*. J. A. G. BOUCHER: *Extrait de la flore d'Abbeville*. Paris 1803. 8.

*Bradl*. Rich. BRADLEY, prof. Cantabrigiensis (†1732): *Historia plantarum succulentarum*. dec. 1—5. Lond. 1716—1727. 4.

*Braun*. Franc. Ant. A BRAUNE: *Salzburgische Flora*. Th. 1—3. Salzb. 1797. 8.

*Bray*. Gabriel Comes BRAY, orator regis Bavariae: Obs. in Denkschr. der Regensb. bot. Gesellsch. 1. 2.

*Breyn*. Jac. BREYN, mercator Gedanensis (nat. 1637 †1697): *Exoticarum plantarum centuria*. Gedan. 1678. fol. *Prodromi plantarum*. Gedan. 1739. 4.

*Brid*. Sam. El. A BRIDEL, ducis Gothani legatus: *Muscologia recentiorum*. vol. 1—4. Goth. 1797—1817. 4. *Methodus nova muscorum*. Goth. 1819. 4. *Bryologia universa*. vol. 1. 2. Lips. 1826. 1827. 8.

*Brigant*. BRIGANTI apud Gusson. catal.

*Brignol*. Jo. BRIGNOLE, prof. Urbinas, dein Veronensis: *Fasciculus rariorum plantarum Forojuliensium*. Urbin. 1810. 4. Obs. in Biblioteca italiana.

*Brongn*. Adolph. BRONGNIART, acad. paris. socius: Obs. in Mém. du mus., Dictionnaire des scienc. nat., Bullet. de la soc. philomath., Annales des scienc. nat.

*Brot*. Felix Avellar BROTERO, prof. Conimbricensis, dein Olysiponensis: *Flora lusitanica*. vol. 1. 2. Olysipon. 1804. 1805. 8. *Phytographia Lusitaniae*. Olysip. 1816. fol. Obs. in Transact. of Linn. soc.

*Brousson*. Petr. Mar. Aug. BROUSSONET, diu in insulis Canariis et Mauritania vixit, denique prof. Monspeliensis (nat. 1761 †1807): *Elenchus plantarum horti Monspeliensis*. Monspel. 1805. 8. Ingentem plantarum novarum copiam Willdenovio liberaliter donavit.

*P. Br*. Patric. BROWNE, Hibernus: *Civil and natural history of Jamaica*. Lond. 1756. fol.

*R. Br*. Robertus BROWN, novam Hollandiam illustravit, jam custos musei Banksiani: *Prodromus florae novae Hollandiae*. Lond. 1810. 8. Appendices doctissimas addidit ad Flinder's voyage to terra australis, ad Salt's voyage to Abyssinia, ad Abel's journey in China, ad Tuckey's expedition on the Congo, ad Ross voyage for the purpose of a northwest-passage, ad Parrey's voyage, ad Clapperton's and Denham's journey. Novam horti kewensis editionem novis multis ornavit: commentarios inseruit

servit Transact. of Linn. soc. et Mem. of the Werner. Society. Pleraque haud interpretatus est aut recudi curavit C. G. Nees in R. Brown's vermischten botanischen Schriften. Th. 1. 2. Schmalkalden et Leipz. 1825. 1826. 8.

*Bruch.* . . BRUCH, pharmacopola Bipontinus: insignis muscorum scrutator, quorum plerosque mihi largitus est. Obs. in Regensb. bot. Zeit.

*Buch.* Leopold. A BUCH, illustris geognostes et physiologus: *Physicalische Beschreibung der canarischen Inseln.* Berl. 1825. 4.

*Buchan.* v. *Hamilt.*

*Bull.* . . BULLIARD (nat. 1751 † 1793): *Herbier de la France.* 1780 f. fol.

*Burch.* Gul. J. BURCHELL: *Travels in the interior of southern Africa.* Lond. 1824. 1825. 4.

*Burgsd.* Frider. Aug. Ludov. A BURGSDORFF, sylvarum in marchia Brandenburgica summus curator (nat. 1747 † 1801): *Versuch einer vollständigen Geschichte vorzüglicher Holzarten.* Th. 1. 2. Berl. 1783. 1787. 4. Obs. in Beobacht. der naturf. Freunde in Berlin.

*Burm.* Jo. BURMANN, prof. Amstelodamensis (nat. 1707 † 1780): *Thesaurus ceilanicus.* Amst. 1737. 4. *Rariorum africanorum plantarum dec.* 1—10. Amst. 1738. 1739. 4. Plumerii icones edidit.

*N. L. Burm.* Nic. Laur. BURMANN, prof. Amstelodamensis (nat. 1734 † 1793): *Flora indica.* LB. 1768. 4.

*Buxb.* Jo. Christ. BUXBAUM, oratoris ruthenici in Constantinopoli medicus, Asiam minorem ipsamque Armeniam peragravit, post academ. petropolit. sodalis (nat. 1694 † 1730): *Plantarum minus cognitarum* cent. 1—5. Petropol. 1728—1740. 4. *Enumeratio plantarum in agro halensi.* Hal. 1721. 8.

*Caes.* Andr. CAESALPINUS, prof. Pisanus (nat. 1519 † 1603): *De plantis.* Florent. 1583. 4.

*Camer.* Joach. CAMERARIUS, medicus Norimbergensis (nat. 1534 † 1598): *Hortus medicus et philosophicus.* 1588. 4. *Epitome Matthioli de plantis.* Frcf. 1586. 4.

*Camp.* Ant. CAMPANA: *Catalogus plantarum horti Ferrariensis.* 1812. 8.

*Campd.* F. CAMPDERA, Hispanus: *Monographie des Rumex.* Paris 1819. 4.

*Cand.* Aug. Pyram. DE CANDOLLE, prof. primum Monspeliensis, jam Genevensis. *Plantarum succulentarum historia*, fasc. 1—28. Paris 1799—1803. fol. *Astragalogia.* Paris 1802. fol. *Flore françaïse*, ed. 3. vol. 1—5. Paris 1805—1815. 8. *Synopsis plantarum in flora gallica descriptarum.* Paris 1806. 8. *Catalogus plantarum horti botanici monspeliensis.* Monspel. 1813. 8. *Recueil de mémoires sur la botanique.* Paris 1813. 4. *Regni vegetabilis systema naturale.* vol. 1. 2. Paris 1818. 1821. 8. *Prodromus systematis naturalis.* vol. 1. 2. Paris 1824. 1825. 8. *Icones selectae plantarum, quas in systemate naturali descripsit.* delin. Turpin, curavit de Lessert. vol. 1. 2. Paris 1820. 1822. fol. *Plantes rares du jardin de Genève.* fasc. 1. 2. Genève 1825. fol. *Mémoires sur les Légumineuses.* Paris 1825. 4. Obs. in Annales et Mém. du mus., in Mém. de la soc. nat. de Paris et de Genève.

*Carey.* Gul. CAREY, medicus in Serampore Ind. or. *Hortus bengalensis.* 1821. 8. Roxburghii floram indicam vol. 1. curavit. Plantarum novarum copiam in Britanniam misit.

*Carmich.* Dugald. CARMICHAEL, navarchus, [illegible] celebris, [illegible] Iulam Acunhae poſt Thuarſium illuſtravit. Obſ. in Trans of Linn. ſoc. 12.

*Caſſin.* Henr. CASSINI, ſymbolas plures ad Dictionn. des ſcie[illegible] nat. et Journ. de phyſ.

*Caſtigl.* Ludov. Comes CASTIGLIONE, Mediolanenſis: *Viaggio ne ſtati uniti dell' America ſettentrionale.* vol. 1. 2. Milano 1790. [illegible]

*Catesb.* Marc. CATESBY, peregrinator et collector avium plan rumque in auſtralibus Americae borealis provinciis (nat. 16 † 1749): *The natural hiſtory of Carolina, Florida and the B hama islands.* vol. 1. 2. et app. Lond. 1731—1748. fol.

*Cav.* Ant. Joſ. CAVANILLES, prof. Matritenſis (nat. 1745 † 180 *Monadelphiae* diſſ. 10. Matrit. 1790 ſ. 4. *Icones plantarum deſcriptiones.* vol. 1—6. Matrit. 1791—1800. fol. *Deſcripci de los generos y ſpecies, demonſtradas en las lecciones publi* Madrid. 1801. 1802. 8. *Anales de ciencias naturales.* n. 1—[illegible] Madrid. 1800—1803. 8.

*Cavol.* Phil. CAVOLINI, Neapolitanus: *Zoſterae oceanicae ἄνθησ* Neap. 1792. fol. Recuſ. in Uſteri Ann. 9. et in Ann. of botan vol. 2.

*Cervant.* Vincent. CERVANTES, prof. Mexicanus: Obſ. in anal. cienc. nat. Cum Lagaſca et Humboldtio plura communicav

*Chaix.* . . CHAIX, eccleſiaſticus Vapinci in Delphinatu, de Baucii in Gallia provinciali, Villarſii comes aſſiduus in itine bus per alpes. Obſ. in Villarſii flora Delphinatus.

*Chamiſſ.* Adalbert. A CHAMISSO, Kotzebuei comes in itinere περ κοσμίῳ 1815—1818. Obſ. in Kotzebuei itinerario, in Ho physicis berolinenſibus et in Schlechtendalii Linnaea. Filic ex itinere reportatas Kaulfuſsio illuſtrandas tradidit.

*Choiſ.* J. D. CHOISY: *Prodromus d'une monographie des Hypericiné* Genève 1821. 4. Obſ. in Mém. de la ſoc. d'hiſt. nat. de Pari I. Adjuvit etiam Candolleum in prodromo elaborando.

*Choris.* Ludov. CHORIS, pictor in Kotzebuei περίπλῳ. *Voyage pi toresque autour du monde.* Paris 1822. fol.

*Clarion.* . . CLARION: Obſ. in Bullet. de la ſoc. philomath. Cu Paliſoto et Candolleo plurima communicavit.

*Clark.* E. D. CLARKE, clericus: *Travels in various parts of Europ Aſia and Africa.* vol. 1—3. Lond. 1816. 8.

*Clement.* Simon de Rojas CLEMENTE, prof. Matritenſis: *Enſay ſobre los lichenes de España.* Madr. 1811. 4. Obſ. in Herrer agricultura general. vol. 1—4. Madr. 1818. 1819. 8.

*Cluſ.* Car. CLUSIUS, Atrebas, magnus peregrinator et inſtaurato rei herbariae, tandem prof. Leidenſis (nat. 1525 † 1609): *Ra riorum plantarum hiſtoria.* Antv. 1601. fol. *Curae poſteriore* Antv. 1611. 4.

*Colebr.* H. Thom. COLEBROOKE, ad tempus praeſes ſociet. benga Obſ. in Aſiatic reſearches, 9. 12. et in Transact. of Linn. ſo 12. 13.

*Coll.* Aloyſ. COLLA: *Hortus ripulenſis.* Taurin. 1824. 4. *Appendi* extat in mem. di Torino, 31. Alias obſ. ib. vol. 25. 27.

*Collad.* Theod. Frider. COLLADON, Genevenſis: *Hiſtoire naturell et médicale des Caſſes.* Montpell. 1816. 4.

*Colsm.* Jo. COLSMANN, prof. Havnienſis: *Prodromus deſcriptioni Gratiolae.* Havn. 1798. 8.

*Commel.* Jo. COMMELYN, ſenator et curator horti Amſtelodam († 1698): *Horti medici Amſtelodamenſis icones,* vol. 1. 2. Amſt. 1697. 1702. fol.

*ommerſ.* Philibert. COMMERSON, inſignis peregrinator, Bugainvillaei navarchi comes, acutiſſimus ſcrutator, theſauros plantarum reliquit, que à Juſſievo ſervantur. († 1773.)

*: Conte.* Jo. LE CONTE in Georgia Amer. bor. Plurimas legit plantas, quas cum Purſhio et Elliottio communicavit. Obſ. in Medical and philoſ. regiſter, 2.

*'orr.* Joſeph. CORREA *de Serra*, orator Luſitanicus († 1823): Obſ. in Ann. du muſ. et Transact. of Linn. ſoc.

*oult.* Thom. COULTER: *Mém. ſur les Dipſacées.* Genèv. 1823. 4.

*rantz.* Henr. Jo. Nepom. CRANTZ, prof. Vindobonenſis (nat. 1722 † 1799): *Claſſis Umbelliferarum emendata.* Vienn. 1767. 8. *Claſſis Cruciferarum emendata.* Vienn. 1769. 8. *Stirpes auſtriacae* faſc. 1—6. Vindob. 1769. 4.

*umin.* . . CUMINO: Obſ. in act. taurin. 1805.

*urt.* Gul. CURTIS, pharmac. Londinenſis († 1799): *Flora londinenſis.* vol. 1. 2. Lond. 1777 f. *Botanical magazine*, vol. 1—12. Lond. 1787—1798. 8.

*uſſ.* Petr. CUSSON, prof. Monſpelienſis (nat. 1727 † 1783): Obſ. in mém. de la ſoc. de médec. à Paris a. 1782. 1783.

*yrill.* Dominic. CYRILLO, prof. Neapolitanus, ad ſupplicium tractus 1799: *Plantarum rariorum regni neapolitani* faſc. 1. 2. Neapol. 1788. 1793. fol.

*alech.* Jac. DALECHAMP, medicus Lugdunenſis (nat. 1513 † 1588): *Hiſtoria generalis plantarum*, vol. 1. 2. Lugd. 1587. fol.

*alm.* . . DALMAN: Obſ. in act. acad. holm. 1811.

*anth.* . . DANTHOINE apud Lam. in encycl. bot. 2. p. 585.

*egland.* . . DEGLAND apud Loiſeleur. flor. gall.

*elil.* Alir. Rafen. DELILE, prof. Monſpelienſis, Aegyptum a Napoleone occupatam perſcrutatus eſt. *Florae aegyptiacae illuſtratio.* Paris 1813. fol. Pars operis ſplendidiſſimi: Deſcription de l'Egypte. Multas mihi plantas largitus eſt.

*eliſ.* D. DELISE: Obſ. in Mém. de la ſoc. Linnéenne du Calvados, 1.

*esf.* Renat. DESFONTAINES, prof. Pariſienſis, Numidiam et Africam propriam 1783—1785 peragravit: *Flora atlantica.* vol. 1. 2. Paris 1800. 4. *Choix de plantes du corollaire des inſtitut. de Tournefort.* Paris 1808. 4. *Tableau de l'école de botanique du jardin du Roi.* Paris 1815. 8. Obſ. in Annal. et Mém. du muſéum. Beneficam ejus voluntatem ſemper gloriabor.

*esport.* . . DESPORTES: Obſ. in plantas Cenomanenſes in Perſoonii enchiridio.

*esrouſſ.* . . DESROUSSEAUX plura capita in Encycl. bot. vol. 4. elaboravit.

*esv.* N. A. DESVAUX: *Journal de botanique.* vol. 1—5. Paris 1808—1814. 8.

*ethard.* . . DETHARDING, medicus Roſtochienſis. Plantas rariores megapolitanas et Willdenovio et mihi largitus eſt.

*ew.* *Cheſter* DEWEY, collegii Gulielmi prof. in provincia Maſſachuſetts. Obſ. de caricibus in Silliman's amer. journ. 7—10. Inſignem plantarum copiam ei debeo.

*ickſ.* Jac. DICKSON, Scotus, mercatu plantarum ſiccatarum clarus (nat. 1738 † 1822): *Faſc.* 1—4. *plantarum cryptogamicarum Britanniae.* Lond. 1785—1801. 4. Obſ. in Transact. Linn. ſoc.

*Flot.* . . a FLOTOW, equitum levis armaturae centurio, eximius lichenum muſcorumque indagator: Obſ. in Jahrb. der Gewächsk.

*Flügg.* Jo. FLÜGGE, M. D.: *Graminum monographiae.* Hamb. 1810. 8.

*Forsk.* Petrus FORSKOL, cum Niebuhrio Aegyptum et Arabiam peragravit (nat. 1732 †1768): *Flora aegyptiaco-arabica.* Havn. 1775. 4. *Icones rerum naturalium.* Havn. 1776. 4.

*Forſt.* Jo. Rein. FORSTER, Cookii comes in ſecundo περίπλῳ, demum prof. Halenſis (nat. 1729 †1798): *Characteres generum plantarum.* Lond. 1776. 4. Plantas pleraſque a ſe inventas mihi donavit.

— — Filius Georgius, prof. Vilnenſis, demum Moguntinus (nat. 1754 †1794): *Prodromus florulae inſularum auſtralium.* Gott. 1798. 8. Idem in commentariis Gotting. 1787. floram Magellanicam illuſtravit.

*Furl. Forſt.* Thom. *Furley* FORSTER, mercator Londinenſis: *Flora Tunbrigenſis.* Lond. 1816. 8. Obſ. in Transact. ſoc. Linn. 5.

*Fouger.* Aug. Dionyſ. FOUGEROUX de Bondaroy, acad. Pariſ. ſodalis; Obſ. in act. acad. Pariſ. 1785. 1786.

*Fraſ.* Jo. FRASER: *Thalia dealbata,* tabula ſingularis, del. Sowerby. 1794. fol. *Catalogus plantarum in America boreali inventarum.* 1813. 8.

*Fr. Fries.* El. FRIES, adjunctus in univerſ. Lundinenſi: *Novitiae florae ſuecicae.* P. 1—8. 1814 ſ. *Obſervationes mycologicae.* Havn. vol. 1. 2. 1815. 1818. 8. *Flora hallandica.* Lund. 1818. 1819. 8. *Syſtema mycologicum,* vol. 1. 2. Lund. 1821. 1823. 8. *Plantae homonemeae.* Lund. 1825. 8. Obſ. in act. acad. holm. et in Kunze's mykol. Heften. Siccatorum lichenum et ſcleromycetum collectiones distribuit.

*Fröl.* Jo. Aloyſ. FRÖLICH, medicus Ellwangenſis Würtenberg.: *De Gentiana libellus.* Erl. 1796. Obſ. in Ulteri Ann. 1.

*Fuchs.* Leon. FUCHS, prof. Tubingenſis (nat. 1501 †1565): *Hiſtoria ſtirpium.* Baſil. 1542. fol.

*Funck.* Henr. Chriſt. FUNCK, pharmacopola Gefrees in Franconia. Plantas cryptogamicas, praeſertim muſcos, ſedulo collegit; ſiccatas divulgavit: *Kryptogamiſche Gewächſe des Fichtelgebirges,* faſc. 1—31. 1801 ſ. 4. *Deutſchlands Mooſe,* ein Taſchen-Herbarium. Bayreuth 1820. 8.

*Gärtn.* Joſ. GÄRTNER, medicus Calwenſis Würtenb. (nat. 1732 †1791): *De fructibus et ſeminibus plantarum.* vol. 1. 2. Stuttg. 1788. 1791. 4. *Supplementum,* ed. fil. Car. Frid. Lipſ. 1805. 4.

*Garcin.* Laurent. GARCIN, Indiam orientalem et Perſiam peragravit. Obſ. in Philoſ. transact. 36. 38. 45. 46. Herbario ejus uſus eſt N. L. Burmann in edenda flora indica, appoſita Garcini nomenclatura.

*Garid.* Joſ. GARIDEL, prof. Aquis ſextiis (nat. 1659 †1737): *Hiſtoire des plantes, qui naiſſent autour d'Aix.* 1715. fol.

*Gaudich.* . . GAUDICHAUD, comes navarchi Freycinet in itinere περικοσμίῳ (1817—1820). Inſulas oceani pacifici, Moluccas ulteriores, Maſcarenas et Falklandii, ubi naufragium paſſi ſunt, ſedulo perquiſivit. Floram inſularum Falklandii Mirbelius edidit in Ann. des ſcienc. nat. 5. Meſſem largam plantarum cum Candolleo et Schwägrichenio communicavit.

*Gaudin.* Jo. GAUDIN, praeco ſacer Noviduni: *Agroſtologia helvetica.* vol. 1. 2. Paris 1811. 8.

*Gay.* Jo. GAY, marchioni Sémonville ab epiſtolis, Pariſ. Obſ. in Mém. du muſ. *Monographie des Laſiopétalées.* Paris 1821. 4. *Fragment d'une monographie des Buttneriacées.* Paris 1823. 4. Ex itinere per Pyrenaeos montes ſegetem plantarum reportavit, cujus et me participem facit.

*Geiſel.* Eduard. Ferdin. GEISELER, medicus Gedanenſis: *Crotonis monographia.* Hal. 1807. 8.

*Gerard.* Ludov. GERARD, M. D.: *Flora gallo-provincialis.* Paris 1761. 8.

*Gieſek.* Car. Ludov. (Metzler-) GIESEKE, prof. Dublinenſis, in Grönlandia 1806—1813 degit: multas plantas et Hornemanno et aliis impertiit.

— Paul. Dieter. GIESEKE, prof. Hamburgenſis. Cum aliis iconum faſc. 1. absque titulo edidit, Hamb. 1777. fol.

*Gilib.* Jo. Eman. GILIBERT, ad tempus prof. Vilnenſis: *Flora lithuanica inchoata.* P. 1. 2. Grodnp. 1781. 1782. 8. *Chloris grodnenſis*, in Uſteri delect. opuſc. 2.

*Ging.* . . DE GINGINS, in Candollei prodromo plura elaboravit genera. Obſ. in Schlechtendalii Linnaea.

*Gled.* Jo. Theoph. GLEDITSCH, prof. Berolinenſis (nat. 1714 † 1786): *Methodus fungorum.* Berl. 1753. 8. Obſ. in act. acad. berol. 1766.

*Glox.* Benj. Petr. GLOXIN: *Obſervationes botanicae.* Argent. 1785. 4.

*Gmel.* Jo. Georg. GMELIN, acad. Petropolit. ſodalis (nat. 1709 † 1755). Omnis Sibiriae, in qua decennium degerat, floram eximie aperuit. *Flora ſibirica.* tom. 1—4. Petrop. 1747—1769. 4.

*C. C. Gmel.* Carol. Chriſt. GMELIN, prof. Carolsruh.: *Flora badenſis alſatica.* vol. 1—4. Carolsruh. 1805—1826. 8.

*J. F. Gmel.* Jo. Frider. GMELIN, prof. Gottingenſis (nat. 1748 † 1804): *Syſtema vegetabilium.* vol. 1. 2. Gott. 1791. 8.

*S. G. Gmel.* Sam. Gottl. GMELIN, acad. Petropolit. ſodalis, oras maris caſpici peragravit (nat. 1743 † 1774): *Hiſtoria fucorum.* Petrop. 1768. 4. *Tagebuch der Reiſe durch verſchiedene Provinzen des ruſſiſchen Reichs.* Th. 1—3. Altenb. 1774—1783. 4. Obſ. in nov. comment. acad. petropol. 12. 14.

*Gochn.* Frider. Car. GOCHNAT: *Tentamen de plantis cichoraceis.* Argent. 1808. 4.

*Goldb.* Car. Lud. GOLDBACH, prof. Mosquenſis (nat. 1793 † 1824): *Diſſ. Croci hiſtoriam ſiſtens.* Mosqu. 1816. 8. Obſ. in Mém. de la ſoc. d'hiſt. nat. de Moſc.

*Gold.* . . GOLDIE, Canadam inviſit. Obſ. in Edinb. philoſ. journ.

*Gomez.* Bern. Ant. GOMEZ: Obſ. in act. acad. Olyſipon. 3.

*Gooden.* Sam. GOODENOUGH, epiſcopus Carleoli. Obſ. in Transact. ſoc. Linn. 2. 3.

*Gouan.* Ant. GOUAN, prof. Monspelienſis: *Hortus monspelienſis.* Lugd. 1762. 8. *Flora monspelienſis.* Lugd. 1765. 8. *Illuſtrationes et obſervationes botanicae.* Turic. 1773. fol.

GRAHAM. Navarchus cum conjuge literata Chili adiit, mortui ibi vidua largam reportavit meſſem.

— Prof. Edinburgenſis: Obſ. in Edinb. philoſ. journ.

*Gratel.* J. P. A. G. GRATELOUP: *Obſerv. ſur la conſtitution de* 1806, *avec un appendix ſur les Conferves.* Montpell. 1806. 4. Obſ. in Journ. de médec. 4.

*Grev.* Rob. Kaye GREVILLE: *Scotiſh cryptogamic flora.* vol. 1—4. Edinb. 1822 ſ. 8. *Flora Edinenſis.* 1824. 8. Obſ. in Transact.

foc. Linn., in Mem. of Werner. foc. et in Edinb. philof. journ.

*Gronov.* Jo. Frid. GRONOVIUS, fenator Leidenfis (nat. 1690 † 1762): *Flora virginica* (e Claytoni collectionibus). vol. 1. 2. L.B. 1743. 8.

*Güldenft.* J. Ant. GÜLDENSTÄDT, acad. Petropolit. fodalis (nat. 1745 † 1781): *Reifen durch Rufsland und im caucafifchen Gebirge.* Th. 1. 2. Petersb. 1787—1791. 4.

*Günth.* Chrift. GÜNTHER, pharmacopola Wratislavienfis, acutus plantarum Silefiacarum forutator. Cum Schummelio edidit: *Herbarium vivum plantas Silefiacas exhibens.* cent. 1—9. Wratisl. 1809. *Enumeratio ftirpium phanerogamarum, quae in Silefia fponte proveniunt.* Wratisl. 1824. 8. Bergeri plantas italicas fortitus eft. Multas ab eo rariores plantas accepi.

*Guerf.* L. B. GUERSENT: Obf. in Bullet. de la foc. philomath.

*Gunn.* J. Ern. GUNNER, epifcopus Nidrofiae in Norvegia (nat. 1718 † 1773): *Flora norvegica.* P. 1. 2. Nidrof. et Havn. 1776. 1772. fol. Obf. in Norfke Videnfk. Selfk. Skrift. 4.

*Guffon.* Jo. GUSSONE, praefectus horti botanici, quem Dux olim Calabriae, jam Rex Siciliae utriusque, prope Panormum ftabiliverat. *Catalogus plantarum, quae in horto regio afservantur.* Neapol. 1821. 8. Ingentem plantarum numerum ipfius liberalitati debeo.

*Hablis.* Car. Lud. HABLIZL, agriculturae in Tauria curator: *Defcription phyfique de la Tauride.* Haye. 1788. 8.

*Hacqu.* Balth. HACQUET, prof. Leopolitanus (nat. 1740 † 1814): *Plantae alpinae carniolicae.* Vindob. 1782. 4.

*Hänk.* Thadd. HÄNKE, Bohemus, magnus peregrinator, Americam auftralem, Malafpina duce, Californiam, Mexico, infulas Philippinas et Marianas perfcrutatus eft, noviffime in terra Guaranitica degit (nat. 1760 † 1817). Ingentes thefauros plantarum incognitarum, et quas Neaeus legerat, congeffit, jam in mufeo bohemico fervatas. *Reliquiae Hänkeanae.* vol. 1. Prag. 1825. fol. Obf. in Jacquini collect. 2. et in Abh. der böhmifchen Gefellfch. 1786.

*Hagen.* Car. Gothofr. HAGEN, prof. Regiomontanus: *Tentamen hiftoriae lichenum.* Regiom. 1782. 4. *Preufsens Pflanzen.* Th. 1. 2. Königsb. 1818. 8.

*Häll.* Gul. HALL: Obf. in Transact. foc. Edinb. 8.

— Alb. AB HALLER, prof. Gottingenfis, dein praefectus pagi Bern. (nat. 1708 † 1777): *Hiftoria ftirpium Helvetiae indigenarum,* tom. 1—3. Bern. 1768. fol. *Opufcula botanica.* Gott. 1749. 8. Obf. in comment. Gotting. et in commerc. liter. Noric.

*Hall. fil.* Alb. AB HALLER, prioris filius, fenator Bern. (nat. 1758 † 1823): Obf. in Römeri Archiv. 1.

*Hamilt.* Franc. HAMILTON, olim *Buchanan*, med. Dr. et ad tempus praefectus horti Calcuttenfis, omnem Indiam orientalem cum Nepala perfcrutatus eft. Obf. in Afiatic refearches et Transact. of Linn. foc. Multas plantas largitus eft Smithio Donio, Hookero etc.

*Hartm.* C. J. HARTMANN: *Handbok uti Scandinaviens flora.* Stockh 1820. 8.

*Haw.* Adrian. Hardy HAWORTH: *Obfervations on the genus Mesembrianthemum.* Lond. 1794. 8. *Mifcellanea naturalia.* Lond. 1803 8. *Synopfis plantarum fucculentarum.* Lond. 1812. 8. *Supplementum.* Lond. 1819. 8.

*Hayn.* Frid. Gottl. HAYNE, prof. Berolinensis: *Getreue Abbildungen und Zergliederungen deutscher Gewächse*. Berl. 1798. 2. 4. *Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse*. B. 1—10. Berl. 1805—1826. 4.

*Hedw.* Jo. HEDWIG, prof. Lipsiensis (nat. 1730 † 1799): *Fundamentum historiae naturalis muscorum frondosorum*. P. 1. 2. Lips. 1782. 4. *Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum*. Lips. 1798. 4. *Descriptio et adumbratio muscorum frondosorum*. vol. 1—4. Lips. 1787—1797. fol. *Species muscorum frondosorum*, ed. Schwägrichen. Lips. 1801. 4.

*R. Hedw.* Romanus HEDWIG, prioris filius (nat. 1772 † 1806): Obs. in Weber's et Mohr's Archiv. 1.

*Heist.* Laur. HEISTER, prof. Helmstadiensis (nat. 1683 † 1758): *Descriptio Brunsvigiae*. Brunsv. 1753. fol.

*Hellen.* Car. Nicol. HELLENIUS, prof. Aboënsis: *Diss. de Hippuride*. Abo. 1786. 4. recus. in Usteri Delect. opusc. Obs. in act. acad. holm. 1788.

*Henck.* Leo Comes HENCKEL a Donnersmark, a consil. regim. Merseburgi: *Adumbrationes plantarum in horto halensi*. Hal. 1805. 4. *Enumeratio plantarum circa Regiomontum crescentium*. Regiom. 1817. 8.

*Herb.* Gul. HERBERT, clericus in Spofforth Angliae († 1825): *Appendix to the botanical magazin*. 1821. 8. Obs. in eodem promtuario.

*Herbich.* Fr. HERBICH, medicus militaris austriacus: Obs. in Regensb. bot. Zeitung 1823. 1824.

*Hergt.* Frider. HERGT, medicus Pösneck in Saxonia Coburg. in Hoppe's Taschenb. 1807.

*Herit.* Car. Lud. L'HÉRITIER de Brutelle (nat. 1746 † 1800): *Virgilia* s. l. et a. *Stirpes novae aut minus cognitae*, fasc. 1—6. Paris 1784. 1785. fol. *Geraniologia* 1787. 1788. fol. *Sertum anglicum* 1788. fol. *Cornus* 1788. fol.

*Herm.* Paul. HERMANN, diu in Ceilona vixit, dein prof. Leidensis (nat. 1640 † 1695): *Catalogus horti lugduno-batavi*. LB. 1687. 8. *Paradisus batavus*. LB. 1705. 4. *Museum ceilanicum*. 1726. 8.

*Heyn.* Benj. HEYNE, diu in India orientali vixit († 1819): Observationes ejus plerasque divulgarunt Roxburghius, Careyus et Rothius (nov. spec.).

*Hilar.* Aug. S. HILAIRE, acad. Paris. socius, Brasiliam et terram Guaraniticam perscrutatus est: *Plantes usuelles des Brasiliens*, fasc. 1—6. Paris 1824. 1825. 4. *Flora Brasiliae meridionalis*, fasc. 1—4. Paris 1824—1826. 4. Obs. in Mém. du mus. et in Ann. des scienc. nat.

*Hill.* Jo. HILL, medicus Londinensis († 1775): *The vegetable system*, vol. 1—26. Lond. 1759—1775. fol.

*Hilsenb.* Car. Theod. HILSENBERG, Erfurtensis, pro Siebero plantas in Mascarenis legit, obiit in Madagascaria 1824.

*Hökert.* .. HÖKERT: Diss. de Ammi. Abo. 1810. 4.

*Hoffm.* Georg. Franc. HOFFMANN, prof. Gottingensis, dein Mosquensis (nat. 1760 † 1826): *Enumeratio lichenum*, fasc. 1. Erl. 1784. 4. *Historia salicum iconibus illustrata*. vol. 1. 2. Lips. 1785. 1791. fol. *Vegetabilia cryptogama*, fasc. 1. 2. 1787. 1790. 4. *Plantae lichenosae*, vol. 1—3. Lips. 1789—1801. fol. *Deutschlands Flora* (Cryptogamie). Erl. 1795. 12. *Deutschlands Flora*, ed. 2. vol. 1. 2. Erl. 1800. 1804. 12. *Genera Umbelliferarum*.

Mosqu. 1816. 8. Obf. in commentt. Gotting., in mém. de la soc. d'hift. nat. de Mafcou etc.

*Hofman-Bang.* N. HOFMAN-BANG, dominus praediorum in Selandia: *De ufu confervarum*. Havn. 1818. 8. Hornemanno et Lyngbyo plantas a fe inventas largitus eft.

*Hofmannsegg.* Jo. Centur. Comes AB HOFMANNSEGG, Dresdenfis, vitam et facultates rei herbariae augendae rara magnanimitate dicavit, diu (1797—1801) in Lufitania degit, Sieberum in Brafiliam mifit, munificentia regia fplendidiffimum opus: *Flore portugaife*, tab. 1—85. 1809—1814. fol. inftruxit atque ornavit. Ingentem copiam plantarum ab ipfo Willdenovius habuit.

*Holl.* Frid. HOLL, pharmacopola, induftrius plantarum collector.

*Holmfk.* Theod. eques HOLMSKIOLD, dominus praediorum in Selandia (nat. 1732 † 1794): *Beata ruris otia, fungis danicis impenfa.* Havn. 1790. fol.

*Hook.* Gul. Jackfon HOOKER, prof. Glasguenfis: *Jungermanniarum icones*, fafc. 1—20. Lond. 1813. fol. Floram londinenfem Curtifii ab anno 1816 inde denuo edidit. *Mufcologia britannica.* Lond. 1818. 8. *Mufci exotici*, vol. 1. 2. Lond. 1818. 1820. 8. *Flora fcotica.* Edinb. 1821. 8. *Exotic flora*, vol. 1—3. Edinb. 1823—1826. 8. Obf. in Edinb. philof. journ.

*Hopk.* Thom. HOPKIRK: *Flora Glottiana.* Glasg. 1813. 8.

*Hopp.* Dav. Henr. HOPPE, Ratisbonenfis, egregius plantarum collector: *Botanifches Tafchenbuch* 1790—1807. Regensb. 8. Obf. in Regensb. botan. Zeitung, in Denkw. der bot. Gefellfch. zu Regensburg, in Sturm's Flora.

*Hornem.* Janus Wilken HORNEMANN, prof. Havnienfis. Florae danicae vol. 8—10. illuftravit. *Hortus regius botanicus Havnienfis.* vol. 1. 2. Havn. 1813. 1815. 8. *Förfög til en oeconomifk Plantelaere.* Kiobenh. 1821. 8. Obf. in Tidfkrift for Naturvidenfk.

*Hornfch.* Frid. HORNSCHUCH, prof. Gryphiae: *Diff. de Voitia et Syftylio.* Erl. 1818. 4. *Bryologia germanica* (focio Nees). vol. 1. Norimb. 1823. 8. Obf. in Horis phyf. berol., in nov. act. nat. cur. et in Regensb. bot. Zeitung.

*Hoft.* Nic. Thom. HOST, archiater palatinus Auftr.: *Synopfis plantarum in Auftria fponte crefcentium.* Vindob. 1797. 8. *Icones et defcriptiones graminum auftriacorum.* vol. 1—4. Vienn. 1801—1814. fol.

*Houft.* Gul. HOUSTOUN, diu in nova Hifpania vixit († 1733): *Reliquiae Houftounianae*, ed. Banks. Lond. 1781. 4.

*Houtt.* Mart. HOUTTUYN, medicus Amftelodamenfis: *Linné's vollftändiges Pflanzenfyftem.* Th. 1—14. Nürnb. 1777—1788. 8. Obf. in Verhand. van het Maatfch. te Harlem, 21. en van het Genootfch. te Vliffingen, 10.

*Hudf.* Gul. HUDSON, pharmacopola Londinenfis († 1793): *Flora anglica*, ed. 2. Lond. 1778. 8.

*Humb.* Alex. AB HUMBOLDT, perilluftris doctiffimusque peregrinator, acutiffimus naturae interpres: *Florae fribergenfis fpecimen.* Berol 1793. 4. Cum focio Aimé Bonpland: *Plantes équinoxiales*, vol. 1. 2. Paris 1808—1816. fol. *Melaftomées* 1809—1816. Adjutore Kunthio: *Nova genera plantarum*, vol. 1—7. Paris 1815—1825. fol. *Mimofes et autres plantes légumineufes.* Paris 1819. fol.

*Hunter.* Gul. Hunter, medicus in Ind. orient.: Obſ. in Aſiatic reſearch. 9. et in Transact. ſoc. Linn.

*Jack.* Gul. Jack, diu in India oriental. vixit: Obſ. in Transact. ſoc. Linn., in Malayan miſcell. et in Roxb. fl. ind. 2.

*Jackſ.* Georg. Jackson: Obſ. in Transact. ſoc. Linn. et in Andrews botan. repoſit.

*Jacqu.* Nic. Joſ. a Jacquin, prof. Vindobonenſis (nat. 1727 † 1820): *Enumeratio ſtirpium in agro Vindobonenſi.* Vienn. 1762. 8. *Selectarum ſtirpium americanarum hiſtoria.* Vienn. 1763. fol. *Obſervationes botanicae.* P. 1—4. Vienn. 1764—1771. fol. *Hortus botanicus vindobonenſis.* P. 1—3. Vienn. 1770—1776. fol. *Flora auſtriaca,* tom. 1—5. Vienn. 1773—1778. fol. *Miſcellanea auſtriaca,* vol. 1. 2. Vienn. 1778. 1781. 4. *Icones plantarum rariorum,* vol. 1—3. Vienn. 1781—1793. fol. *Collectanea ad botanicam, chemiam et hiſtoriam naturalem ſpectantia,* vol. 1—5. Vienn. 1786—1796. 4. *Oxalis.* Vienn. 1794. 4. *Hortus ſchönbrunnenſis,* vol. 1—4. Vienn. 1797—1804. fol. *Fragmenta botanica,* Vienn. 1800—1809. fol. *Stapeliae cultae.* Vienn. 1806—1815. fol.

*Jacqu. f.* Joſ. Franc. a Jacquin, prioris filius, prof. Vindobonenſis: *Eclogae botanicae,* vol. 1. Vienn. 1816. fol.

*Jan.* Georg. Jan, prof. Parmenſis. *Flora Italiae ſuperioris* cent. 1—10. Sunt plantae ſiccatae. (1818.) Herbarium portatile. 1820. 8.

*Jaum.* in Duhamel ed. nov.

*Jon.* Gul. Jones, judex ſummus in Bengalia († 1794): Obſ. in Aſiatic reſearch. 2.

*Iſert.* Paul. Erdm. Isert: *Reiſe nach Guinea.* Kopenh. 1790. 8. Plantarum guineenſium copiam et Vahlio et Willdenovio largitus eſt.

*Jürg.* G. H. B. Jürgens, actor cauſſarum Jeveranus. Algarum ſiccatarum copiam faſciculis pluribus divulgavit, multas alias mihi donavit.

*Juſſ.* Ant. Laurent. a Jussieu, prof. Pariſienſis: *Genera plantarum, ſecundum ordines naturales diſpoſita.* Paris 1789. 8. Obſ. in Annal. et Mém. du muſ.

*Adr. Juſſ.* Adrianus a Jussieu, prioris filius: *De Euphorbiacearum generibus tentamen.* Paris 1824. 4. Obſ. in Mém. de la ſoc. d'hiſtoire nat. de Paris, 2. et in Ann. des ſcienc. nat. 2.

*J. Juſſ.* Joſephus a Jussieu, Antonii Laurentii patruus, Condaminium comitatus eſt per Americam auſtralem, ubi ſolus remanſit, aerumnis tandem et livore Hiſpanorum atrociaque confectus ſuccubuit. († 1787.) Heres nepos reliquiarum patrui.

*Ives.* Eli Ives, prof. in collegio Yaleano novae Caeſareae: Obſ. in Silliman's amer. journ.

*Kämpf.* Engelb. Kämpfer, medicus, diu in Perſia, India orientali, Java et Japonia vixit, demum archiater comitis Lippii (nat. 1651 † 1716): *Amoenitates exoticae.* Lemgov. 1712. 4. Icones plantarum japonicarum edidit Joſ. Banks. Lond. 1791. fol.

*Kaulf.* Georg. Frider. Kaulfuss, prof. Halenſis: *Enumeratio filicum.* Lipſ. 1824. 8. *Erfahrungen über das Keimen der Charen.* Leipz. 1825. 8. In Sturmii flora muſcorum frondoſorum faſc. 15 et 16. elaboravit et ornavit. Obſ. in Regensb. bot. Zeitung.

*Ker.* Jo. *Bellenden-Gawler*, dein KER: Opera periodica, Botanical magazine et botanical register ad tempus instruxit et illustravit. Obs. in Annals of botany et Journ. of science and the arts.

*Kin.* ... KIN in Philadelphia, plantas a se collectas Elliottio donavit.

*Kit.* Paul. KITAIBEL, prof. Pestinensis (†1818): *Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae*, vol. 1—3. Vindob. 1803—1812. fol. Plurimas plantas ipsi debeo.

*Klein.* ... KLEIN, medicus missionis evangelicae in Tranquebar, Willdenovii amicus, cum quo ingentem plantarum numerum communicavit.

*Knight.* v. *Salisbury.*

*Koch.* Jos. KOCH, prof. Erlangensis: Obs. in nov. act. nat. cur. et in Regensb. bot. Zeit. Cum Mertensio floram germanicam edidit.

*Köl.* Georg. Lud. KÖLER, prof. Moguntinus: *Descriptio graminum in Germania et Gallia sponte nascentium.* Fref. 1802. 8.

*Köll.* Jo. Lud. Christ. KÖLLE: *Spicilegium observationum de Aconito.* Erl. 1788. 8.

*König.* Jo. Gerard. KÖNIG, medicus missionis evangelicae in Tranquebar (nat. 1728 †1785). In Retzii observationibus, im Naturforscher (20, 23.) et in Physiogr. Sällsk. handl. 1. ipsius animadversiones et commentarii exstant. Schrebero inprimis et Retzio plantas largitus erat.

— Car. *Konig* cum Jo. Sims edidit Annals of botany, vol. 1. 2. Lond. 1805. 1806. 8., in quibus plures ejus observationes.

*Krapf.* Car. A KRAPF: *Beschreibung der um Wien wachsenden essbaren Schwämme.* 1. 2. Wien 1782. 4.

*Kunth.* Car. Sigism. KUNTH, Humboldtii adjutor: *Synopsis plantarum aequinoctialium orbis novi.* vol. 1—4. Paris 1822—1825. 8. Obs. in Mém. du mus. et in Ann. des scienc. nat. Vid. et Humb.

*Kunz.* Gustav. KUNZE, prof. Lipsiensis: *Mykologische Hefte*, 1. 2. Leipz. 1817. 1823. 8. Obs. in Regensb. bot. Zeitung. Plantarum cryptogamicarum insignem copiam ipsi debeo.

*Labill.* Jac. Jul. LABILLARDIÈRE, acad. Parisiensis socius, Syriam primum 1787 invisit, dein cum navarcho Entrecasteaux, ad investiganda Lapeyrousii vestigia, in oceanum pacificum missus, novae Hollandiae, Terrae Diemen et novae Caledoniae floram egregie aperuit. *Icones plantarum Syriae rariorum*, dec. 1—5. Paris 1791—1812. 4. *Novae Hollandiae plantarum specimen.* vol. 1. 2. Paris 1804—1806. fol. *Sertum austro-caledonicum.* vol. 1. 2. Paris 1824. 1825. fol. Multas ipsi debeo plantas rarissimas.

*Laestad.* L. L. LAESTADIUS, jam praeco sacer in Suecia, Lapponiam 1821 peragravit; Obs. in act. acad. holm. 1822.

*Lag.* Marian. LAGASCA, prof. Matritensis, jam exul Londini: *Amenidades naturales de las Españas.* Orihuela. 1811. 4. *Elenchus plantarum, quae in horto bot. matritensi colebantur.* Matrit. 1816. 4. Obs. in Herrer. agricultur. ed. nova. Multas et mihi et aliis plantas largitus est.

*Lam.* Jo. Bapt. Monet DE LAMARCK, acad. Paris. sodalis: *Flore françaíse*, vol. 1—3. Paris 1778. 8. *Encyclopédie méthodique. Botanique.* vol. 1—4. Paris 1783—1796. 4. *Journal d'hi-*

*ſtoire naturelle.* vol. 1. 2. Paris 1792. *Illuſtrations des genres.* vol. 1—4. Paris 1791 f. 4. Herbarium ejus ditiſſimum poſſit Röpera, prof. Baſilienſ.

*Lamb.* Aylmer Bourk. LAMBERT, poſſeſſor herbarii locupletiſſimi, in quo et Ruizii Pavoniique et Forſteri et Pallaſii aliorumque reliquiae ſervantur: *Deſcription of the genus Cinchona.* Lond. 1797. 4. *Deſcription of the genus Pinus.* Lond. 1803. fol. nov. ed. 1825 f. Obſ. in Tranſact. ſoc. Linn.

*Lamx.* Jo. Vincent. Felix LAMOUROUX, Aginenſis, Cadomi vixit (nat. 1779 † 1825): *Diſſ. ſur pluſieurs eſpèces de Fucus.* Agen. 1805. 4. *Eſſai ſur les Thalaſſiophytes.* Paris 1813. 4. Ann. du muſ. 20. *Hiſtoire générale des Polypiers.* Paris 1816. 8.

*Lang.* Ad. Fr. LANG, pharmacopola Peſtinenſis, plantas hungaricas ſiccatas distribuit.

*Langsd.* Georg. A LANGSDORFF, Heidelbergenſis, jam orator ruthenicus in Braſilia, Kruſenſternii comes in itinere περιπλουν, redux per Aſiam borealem. Fiſcherus ſiliquam rariorum a Langsdorffio inventarum faſciculum 1809 edidit. Ipſe plantarum innumeram copiam et Fiſchero et Martio aliisque largitus eſt.

*Lapeyr.* Philipp. *Picot*-LAPEYROUSE, metallorum ſylvarumque curator, prof. Toloſanus: *Flore des Pyrénées*, dec. 1—4. Paris 1795—1801. fol., cujus partem facit monographia Saxifragarum. *Hiſtoire abrégée des plantes des Pyrénées.* Toulouſ. 1813. 8. *Supplément à l'hiſtoire*, Toulouſ. 1818. 8.

*Lapierre.* .. LAPIERRE: Obſ. in Journ. de phyſ.

*Laroch.* Franc. LAROCHE: *Eryngiorum hiſtoria.* Paris 1808. fol. Idem textum vol. 6—7. Liliacearum Redoutei curavit.

*Latourr.* Max. Ant. LATOURRETTE, monetarius Lugduni (nat. 1729 † 1793): Obſ. in Journ. de phyſ. tom. 20.

*Laur.* Fr. LAURER, profector Gryphiae: Obſ. in Schlechtendalii Linnaea.

*Lauth.* Thom. LAUTH: Diſſ. de Acere. Argent. 1781. 4.

*Lawr.* .. LAWRANCE, pictrix. *Collection of roſes from nature.* Lond. 1799 f. fol.

*Laxarſ.* J. LAXARSA, Mexicanus: Obſ. cum Candolleo communicata in Ann. des ſcienc. nat. 3.

*Laxm.* Eric. LAXMANN, praeco ſacer in Kolywan Sibir. († 1796): Obſ. in nov. comment. acad. Petrop. 15. 16. 18. et in Pallas neuen nord. Beytr. 3.

*Leandr.* P. LEANDRO do Sacramento, praefectus horti botanici in Rio Janeiro: Nova plantarum genera in act. acad. monach. 7.

*Lechen.* v. *Leſchen.*

*Ledeb.* Car. Frid. LEDEBOUR, prof. Dorpatenſis, Imaum peragravit. Diſſ.: *plantarum domingenſium decadem ſiſtens.* Gryph. 1805. 4. Obſ. in act. acad. petropol. Plantas orientales multas mihi largitus eſt.

*Lee et Kenned.* .. LEE and KENNEDY, horticultores in Hammerſmith prope Londinum, plantas novas plurimas introduxerunt.

*Leers.* Jo. Dan. LEERS, pharmacopola Herborn. (nat. 1727 † 1774): *Flora Herbornenſis*, 1775. 8.

*Lehm.* Jo. Chriſt. Georg. LEHMANN, prof. Hamburgenſis: *Monographia generis Primularum.* Lipſ. 1817. 4. *Generis Nicotianarum hiſtoria.* 1818. 4. *Plantae e familia Aſperifoliarum.* P. 1. 2. Berol. 1818. 4. *Monographia generis Potentillarum.* 1820. 4. *Icones plantarum rariorum*, faſc. 1—4. 1820 f. fol. Obſ. in Berl. mag. 8. Multas ipſi plantas debeo.

*Lejeun.* A. L. S. LEJEUNE, medicus Spadanus: *Flore des environs de Spa.* vol. 1. 2. Liège 1812. 1813. 8.

*Lepech.* Iwan LEPECHIN, acad. Petropolit. sodalis: *Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reichs.* Th. 1-3. Altenb. 1774—1783. 4. Obs. in nov. comment. acad. Petrop. 19. in act. ejusdem acad. 1781. 1785.

*Lepellet.* . . LEPELLETIER: Obs. in Ann. du mus. 8.

*Leschen. Lechen.* . . LESCHENAULT *de la Tour*, Baudini navarchi in περίπλῳ comes, insulas Moluccanas, Javam, Sumatram et Indiam orientalem perscrutatus est; dein praefuit horto botanico Pondicheriensi. Obs. in Mém. du mus.

*Lewis.* Meriwether LEWIS, proconsul Louisianae, cum duce bellico Dan. Clark 1804—1806 iter per Americam borealem ad flumen usque Columbiae suscepit. Plantas collectas Purshio donavit.

*Libert.* Maria Anna LIBERT, virgo rei herbariae gnara, Malmudariensis: Obs. in annal. bruxellens. 6.

*Libosch.* . . LIBOSCHÜTZ: Obs. in mém. de la soc. d'hist. nat. de Moscou, 5.

*Lichtenst.* Henr. LICHTENSTEIN, insignis zoologus, prof. Berolinensis, Africa australi peragrata, egregiam plantarum copiam reportavit, quae Willdenovio cesserunt.

*Lightf.* Jo. LIGHTFOOT, clericus in Nottinghamia (nat. 1735 †1788): *Flora scotica.* vol. 1. 2. Lond. 1777. 8.

*Liljebl.* Sam. LILJEBLAD, prof. Upsaliensis (nat. 1761 †1815): *Utkast til en svensk flora.* Upsal. 1798. 8. Obs. in act. acad. holm. 1793.

*Lindl.* Jo. LINDLEY: *Rosarum monographia.* Lond. 1820. 8. *Collectanea botanica*, fasc. 1—3. Lond. 1823. fol. *Digitalis monographia.* Lond. 1821. fol. Opus periodicum: Botanical register, copiosis ornavit illustrationibus. Obs. in Transact. soc. Linn. et Quarterly journ. of sciences 18.

*Link.* Henr. Frider. LINK, prof. Berolinensis, cum Comite Hoffmannsegg Lusitaniam perlustravit, textum operis splendidissimi: Flore portugaise, elaboravit. Cum Ottone praefecto edidit: *Abbildungen und Beschreibungen seltener Pflanzen im Berl. Garten*, fasc. 1—9. Berl. 1821 f. *Enumeratio plantarum horti berolinensis altera.* vol. 1. 2. Berol. 1821. 1822. 8. Jahrbücher der Gewächskunde, B. 1. Berl. 1820. 8. Obs. in Horis phys. berol. et Berl. mag. 3. 7. Multas mihi plantas largitus est.

*L.* Carol. LINNAEUS, auctor hujus operis, stator rei herbariae nuperioris, prof. Upsaliensis. (Nat. 1707 †1778.) Hoc opus primum prodiit forma longe aliena, magnopere contracta, tanquam pars *Systematis naturae.* LB. 1735. fol. Sequentes editiones sensim uberiores fuerunt, ultima, quam Linnaeus curavit, est duodecima Holm. 1767. 8. Decimam tertiam diverso modo elaboraverunt tum Jo. Fr. Gmelin, tanquam partem Systematis naturae, tum Jo. Andr. Murray. Gott. 1774. Decimam quartam idem 1784. Decimam quintam C. H. Persoon. Gott. 1797. 8.

— — *Species plantarum*, ed. 1. vol. 1. 2. Holm. 1753. 8. Ed. 2. vol. 1. 2. Holm. 1762. 1763. 8. *Mantissa plantarum.* 1. Holm. 1767. 8. 2. 1771. 8.

— — *Genera plantarum*, ed. 1. LB. 1737. 8., ed. 6. Holm. 1767. 8.

— — *Hortus Cliffortianus.* Amstelod. 1737. fol.

C. Linnaeus: *Flora lapponica*. Amstelod. 1737. 8. ed. 2. cur. J. E. Smith. Lond. 1792. 8.

— — *Flora suecica*, ed. 1. Holm. 1745. 8. ed. 2. 1755. 8.

— — *Oelandfka och Gothländfka refa*. Stockh. 1745. 8. *Wäftgöta refa*. Stockh. 1747. 8. *Skånfka refa*. Stockh. 1751. 8.

— — *Flora zeylanica*. Amftel. 1748. 8.

— — *Hortus upfalienfis*. Holm. 1748. 8.

— — *Philofophia botanica*. Vienn. 1755. 8. ed. 4. me curante, Hal. 1809. 8.

— — *Amoenitates academicae*, vol. 1—7. Holm. 1749—1769. 8., vol. 8—10. curante Schrebero. Erl. 1785—1790. 8.

— — Obf. in act. acad. holm., in nov. act. Upfal., in nov. comment. Petropol., in act. acad. Parif.

*L. fil.* Car. Linnaeus, filius, prof. Upfal. (nat. 1741 †1783): *Horti Upfalienfis plantarum rariorum* dec. 1. et 2. Holm. 1762. 1763. fol. fafc. 1. Lipf. 1767. fol. *Supplementum plantarum*. Brunfv. 1781. 8. Ehrhartus huic editioni curam adhibuit, appofitis fuis characteribus et nomenclatura. Sua facere illa ftuduit, quae pater reliquerat. *Nova graminum genera*. Upfal. 1779. 4.

*Lobel.* Matth. Lobelius, Belga, botanicus regius britannicus (nat. 1538 †1616): *Stirpium nova adverfaria*. vol. 1. 2. Lond. 1570. 1605. fol. *Plantarum f. ftirpium hiftoria*. Antverp. 1576. fol. *Icones ftirpium*. Antverp. 1591. 4. *Stirpium illuftrationes*, ed. How. Lond. 1655. 4.

*Loddig.* Conr. Loddiges, horticultor in Hackney prope Londinum: *Botanical cabinet*. vol. 1—7. Lond. 1817 f. 12.

*Löfl.* Petr. Löfling, Hifpaniam et Americam auftralem invifit (nat. 1729 †1756): *Refa til fpanfka länderna*, ed. Linn. Stockh. 1758. 8. interpr. germ. Berl. 1766. 8.

*Loif.* J. L. A. Loiseleur-*Deslongchamps*, Med. Doct.: *Flora gallica*. vol. 1. 2. Paris 1806. 1807. 8. Notices fur les plantes à ajouter à la flore franç. in Journ. de bot. vol. 2.

*Lottermof.* Theoph. Lottermoser, collega gymnafii in Raftenburg, Boruff. orient. Obf. in Beyträgen zur Kunde Preuffens, 6.

*Lour.* Jo. de Loureiro, acad. lufitanicae focius, miffioni catholicae in Cochinchina addictus: *Flora cochinchinenfis*, vol. 1. 2. Olyfipon. 1790. 4. ed. Willdenow. Berol. 1793. 8.

*Lumnitz.* Steph. Lumnitzer: *Flora pofonienfis*. Lipf. 1791. 8.

*Lyngb.* Hans Chrift. Lyngbye, praeco facer prope Ripas Jutiae: *Tentamen hydrophytologiae danicae*. Havn. 1819. 4. Algas plerasque mihi largitus eft.

*Macbrid.* Jac. Macbride, medicus in Carolina, amicus Elliotti, cui magnam impertiit plantarum copiam.

*Maratt.* Jo. Franc. Maratti: *Plantarum Romuleae et Saturniae fpecificae notae*. Rom. 1772. 8.

*Marcgr.* Georg. Marcgrav, pictor, infervit Comiti Mauritio Naffavio, dum Brafiliam occuparet (nat. 1610 †1644): *Hiftoria naturalis Brafiliae*, Pifonis et Marcgravii, ed. J. de Laet. Amft. 1648. fol.

*M. B.* Frider. Marschall a Bieberstein, a confiliis ftatus ruthen. (nat. 1768 †1826): *Befchreibung der Länder am kafpifchen Meer*. Frkf. 1800. 8. *Flora taurico-caucafica*. vol. 1-3. Char-

obv. (1808—1819. 8. *Centuria plantarum rariorum Roſſiae meridionalis.* Charcov. 1810. fol.

*Marſh.* Humph. MARSHALL: *Arbuſtum americanum, or the american grove.* Philadelph. 1785. 8.

*Mart.* Car. Phil. Fr. MARTIUS, prof. Monachienſis, Braſiliae floram (1817—1820) recognovit et illuſtravit: *Flora cryptogamica Erlangenſis.* Norimb. 1817. 8. *Reiſe in Braſilien* (Spixio comite adjuvante). Münch. 1823. 4. *Genera et ſpecies palmarum, quas in itinere per Braſiliam collegit.* Monach. 1823. fol. *Nova genera et ſpecies plantarum braſilienſium*, vol. 1. 2. Monach. 1824—1826. fol. *Specimen materiae medicae braſilienſis.* Monach. 1824. fol. Obſ. in act. acad. Monach., in nov. act. nat. cur. 10—13., in commentar. ſoc. bot. Ratisbon. 2.

*Martens.* Georg. A MARTENS: *Reiſe nach Venedig.* B. 1. 2. Stuttg. 1824. 4.

*Martyn.* Jo. MARTYN, prof. Cantabrigienſis (nat. 1699 † 1768): *Hiſtoria plantarum rariorum* cent. 1. Lond. 1728. fol.

*Maſſ.* Franc. MASSON, hortulanus doctus, diu in Inſulis Canariis, Azoribus, maxime autem in Africa auſtrali degit (nat. 1741 obiit in Canada 1805): *Stapeliae novae.* Lond. 1796. fol.

*Maton.* Gul. Georg. MATON, M. D.: Obſerv. in Transact. ſoc. Linn.

*Maur.* Ernest. MAURI: *Romanarum plantarum* cent. 1—13. Rom. 1817—1820. 8.

*Mayer.* Jo. MAYER, medicus Pragenſis: Obſ. in Abh. der böhmiſchen Geſellſchaft 1785—1787, im Naturforſcher, 17. et in Samml. phyſicaliſcher Aufſätze, 2.

*Medic.* Frider. Caſim. MEDICUS, praefectus horti Schwetzingenſis (nat. 1736 † 1809): *Botaniſche Beobachtungen.* Th. 1. 2. Mannh. 1783. 1784. 8. *Ueber einige künſtliche Geſchlechter aus der Malven-Familie.* Mannh. 1787. 8. Obſ. in Uſteri Annal.

*Meerb.* Nic. MEERBURG, cuſtos horti botanici Leidenſis: *Plantarum ſelectarum icones pictae.* LB. 1798. fol.

*Meiſſn.* Gul. MEISSNER, pharmacopola Halenſis, ſedulus plantarum cryptogamicarum ſcrutator, Jungermannias novas mecum communicavit.

*Menz.* Archibald. MENZIES, Vancoverii comes in itinere ad Americae borealis oras occidentales. Egregiae meſſis, quam fecit, participes fuerunt Smithius, Lambertus et alii. Obſ. in Transact. ſoc. Linn.

*Mérat.* X. V. MERAT: *Nouvelle flore des environs de Paris.* 1813. 8.

*Mertens.* Franc. Car. MERTENS, mercatorum ſcholae praefectus Bremae, algarum ſcientia clarus. Cum Kochio: J. C. Röhling's Deutſchlands Flora, ed. nov. Frkf. Th. 1. 2. 1823. 1826. 8. Obſ. in Mém. du muſ. 5.

*Meyen.* Franc. Jul. Ferd. MEYEN, M. D.: Obſ. in Schlechtendalii Linnaea.

*Meyer.* Ern. H. F. MEYER, prof. Regiomontanus: *Synopſis Juncorum rite cognitorum.* Gott. 1822. 8.

— Georg. Frid. Gul. MEYER, phyſiographus Hannoveranus: *Primitiae florae Eſſequeboënſis.* Gott. 1818. 4. *Die Entwickelung u. Fortpflanzung der Flechten.* Gott. 1825. 8. Lichenum ſcientia excellens, plures novas ſpecies mihi largitus eſt.

*Mx.* Andr. MICHAUX, Perſiam, Americam borealem, inſulas Maſcarenas et Madagaſcariam inviſit (nat. 1746 † 1802): *Flora boreali-americana.* (ed. Cl. Richard.) tom. 1. 2. Paris 1803. 8. *Hiſtoire des chênes de l'Amérique.* Paris 1801. fol.

*Mx.* Filius Andr. Franc. MICHAUX: *Histoire des arbres forestiers de l'Amérique septentrionale.* vol. 1—3. Paris 1810—13. 4.

*Michel.* Petr. Ant. MICHELLI, praefectus horti Florentini (nat. 1679 †1737): *Nova plantarum genera.* Flor. 1729. fol.

*Mik.* Jo. Christ. MIKAN, prof. Pragensis, Brasiliam invisit: *Delectus florae et faunae brasiliensis.* fasc. 1—4. Prag. 1822 f. fol. Gramina brasiliensia Trinio dedit.

*Mill.* Phil. MILLER, praefectus horti Chelseani (nat. 1691 †1771): *Gardeners dictionary*, ed. 1. Lond. 1731. fol. ed. 8. 1797. fol. *Figures of plants, described in the gardeners dictionary.* vol. 1. 2. Lond. 1760. fol.

*Mirb.* C. F. *Brisseau*-MIRBEL, acad. Paris. socius: Obs. in Mém. du mus., Ann. des scienc. nat. et in Bulletin de la soc. philomath.

*Mitch.* Jo. MITCHELL, medicus in Virginia: Genera recens condita in Act. nat. cur. 8.

*Mocin.* ..MOCINO, botanicus Mexicanus (†Barcinone 1819). Iconibus ab ipso, Sesseo et Cervantesio curatis, nondum editis, usus est Candolleus.

*Möhr.* Paul. Henr. MÖHRING, medicus Jeveranus (nat. 1710 †1792): Obs. in act. nat. cur. 6. 7. 8. et in commerc. lit. Noric.

*Mönch.* Conr. MÖNCH, prof. Marburgensis (nat. 1744 †1805): *Enumeratio plantarum indigenarum Hassiae.* Gott. 1777. 8. *Methodus plantas horti botanici describendi.* Marb. 1794. 8.

*Mohr.* Dan. Matth. Henr. MOHR, prof. Kiloniensis: *Observationes botanicae.* Kil. 1803. 8. Cum Fr. Webero: Naturhistorische Reise durch Schweden, Beyträge zur Naturkunde, Archiv für die systematische Naturgeschichte, Dillwyn's Conferven, Deutschlands kryptogamische Gewächse.

*Molin.* Jo. Ignat. MOLINA, missioni catholicae in Chili addictus: *Saggio sulla storia naturale del Chili*, ed. altera. Bologn. 1810. 4.

*Monnard.* J. P. MONNARD, rector scholae Neodunensis in Helvetia: Obs. in Ann. des scienc. nat. 7.

*Montin.* Lars MONTIN, medicus Suecus (nat. 1723 †1785): Obs. in act. acad. holm., in nov. act. soc. Upsal., in Physiogr. sälskap. et in Götheborgska vetensk. samhällets handl.

*Morett.* Jos. MORETTI, prof. Ticinensis: *Memorie ed osservazioni intorno a diversi oggetti risguardanti le scienze naturali.* Pavia 1820. 8. Obs. in Biblioteca italiana et in Brugnatelli giornale di fisica.

*Moricand.* Steph. MORICAND: *Flora veneta.* Genev. 1820. 8.

*Moris.* . MORIS, Calaritanus, Sardoae florae sedulus scrutator. Plantarum ab ipso collectarum participem me fecit Balbisius.

*Moris.* Robert. MORISON, primum horti Blesensis praefectus, dein prof. Oxoniensis (nat. 1620 †1683): *Historia plantarum universalis*, vol. 1—3. Oxon. 1715. fol.

*Mougeot.* v. Nestler.

*Mühlenb.* Henr. MÜHLENBERG, praeco sacer Lancastriae in Pensylvania (†1815): *Catalogus plantarum Americae septentrionalis.* Lancast. 1813. 8. *Descriptio uberior graminum.* Philadelph. 1817. 8. Obs. in neuen Schriften der Berl. Gesellsch. naturf. Freunde, 4. Et Willdenovio et mihi et Hedwigio ingentem plantarum numerum largitus est.

*Müll.* Ott. Frid. MÜLLER, prof. Havniensis (nat. 1730 †1784): *Flora danicae* vol. 4 et 5. ejus cura prodierunt. *Flora Fridrichs-*

*dalibus.* Argent. 1767. 8. *Kleine Schriften aus der Naturhistorie.* Dessau 1782. 8. Obs. in nov. act. petropolit. 3., in act. acad. holm., in nov. act. nat. cur., im Naturforscher, et in Schriften der Berl. Gesellsch. naturf. Freunde, 4.

***Murr.*** Jo. Andr. Murray, prof. Gottingensis (nat. 1740 † 1791): *Linnaei systema vegetabilium* ed. 13. Gott. 1774. ed. 14. 1784. 8. Obs. in nov. comment. Gott. 3—8. et in Commentat. soc. Gott. 1—9.

***Mussin.*** Apoll. Comes Mussin-Puschkin († 1806), Caucasi regionumque finitimarum peragrator, cum Willdenovio multas communicavit stirpes.

***Mut.*** Jos. Coelestin. Mutis, in metropoli Columbiae, Bogota vitam degit (nat. 1734 † 1809). *Plurimas* plantas ad Linnaeum misit, multas Humboldtio dedit. Floram bogotensem, opus XLV annorum, ineditam reliquit, quam curaturi sunt filius Symphor. Mutis et Jos. de Caldas. Specimina inferuerunt in opus periodicum: El semanario del nuevo reyno de Granada 1813. 4.

***Neck.*** Natal. Jos. a Necker, botanicus electoris Palatinatus (nat. 1730 † 1793): *Elementa botanica.* Neowedi ad Rhen. 1790. 8.

***Nectoux.*** H. Nectoux, comes Napoleonis in expeditione aegyptiaca: *Voyage dans la haute Egypte.* Paris 1808. 8.

***N. E.*** Neue Entdeckungen v. *Spreng.*

***Née.*** Ludov. Née, Malaspinae in itinere περικοσμίῳ comes, immensum plantarum numerum congessit, quo usus est Cavanilles in iconibus et anal. de cienc. natur.

***Nees.*** Car. Gothofr. Nees ab Esenbeck, prof. Bonnensis: *Das System der Pilze und Schwämme.* Nürnb. 1817. 4. *Synopsis Asterum herbaceorum.* Erl. 1818. 4. *Horae physicae berolinenses.* Bonn. 1820. fol. *De Cinnamomo commentatio.* Bonn. 1823. 4. Cum Hornschuchio edidit Bryologiam germanicam, adjuvit Weiheum in Rubis germanicis edendis, Sieberi gramina e nova Hollandia nuncupavit. Obs. in nov. act. nat. cur., in comment. soc. bot. Ratisbon., et in Regensb. bot. Zeitung.

— Theoph. Frid. Nees, prioris frater, prof. Bonnensis, cum fratre Boltonii tom. 4. interpretatus est ac auxit. Obs. in nov. act. nat. cur. et in Kunze's mykol. Heften.

***Nestl.*** C. G. Nestler, prof. Argentinensis: *Monographia de Potentilla.* Paris 1816. 4. Cum Mougeoto stirpes cryptogamas Vogeso-rhenanas siccatas, vol. 1—6. 1810—1820. edidit.

***Neuwied.*** Maxim. Princeps Wied-Neuwied (nat. 1782), Brasiliam peragravit. Plerasque stirpes a se inventas et Schradero et Neesio dedit, quorum ille eas in annalibus literariis Gottingensibus divulgavit, hic, adjuvante Martio, in novis actis nat. cur. descripsit ac delineavit.

***Nitzsch.*** Christ. Ludov. Nitzsch, prof. Halensis: *Beytrag zur Infusorien-Kunde oder Naturbeschreibung der Cercarien und Bacillarien.* Hall. 1817. 8.

***Nocc.*** Dominic. Nocca, prof. Ticinensis: *Ticinensis horti plantae selectae.* Ticin. 1800. fol. Cum Balbisio edidit *floram ticinensem*, vol. 1. 2. Ticin. 1816. 1821. 4. Obs. in Usteri Ann. 5.

***Nois.*** Ludov. Noisette, horticultor prope Parisios: plures novas stirpes introduxit.

***Nor.*** Ferdin. de Noroña, Hispanus, insulas Philippinas, Javam, Madagascariam et Mascarenas perscrutatus est: obiit in ins.

Franciae 1787. Obf. in Verh. van het Batav. Genootfch. 5. Gazas ejus fortitus eft Labillardière.

*Nutt.* Thom. NUTTALL, prof. Philadelph.: *The genera of North-American plants.* vol. 1. 2. Philadelph. 1818. 8. Obf. in Journ. of the acad. of Philadelph. et in Silliman's americ. journ.

*Oed.* Georg. Chrift. AB OEDER, praetor et praefecturae Oldenburg. redemtor (nat. 1728 †1791): *Florae danicae* volumina tria priora edidit.

*Oliv.* Gul. Anton. OLIVIER, medicus, Perfiam peragravit (nat. 1756 †1814): *Voyages dans l'empire Othoman, l'Égypte et la Perfe,* vol. 1—3. Paris 1801. 8.

*Olivi.* Jof. OLIVI: *Zoologia adriatica.* Baffano 1792. 4.

*Ort.* Cafim. Gomez DE ORTEGA, prof. Matritenfis: *Continuacion de la flora española,* tom. 5. 6. Madr. 1784. 4. *Novarum aut rariorum plantarum horti Matritenfis* dec. 1-8. Matrit. 1800 f. 4.

*Osb.* Petrus OSBEK, praepofitus ecclefiarum in Suecia, Chinam invifit (nat. 1723 †1805): *Dagbok öfver en oftindifk refa.* Stockh. 1757. 8. Obf. in act. acad. holm. 1762. 1765. 1769 f.

*Ott.* Frid. OTTO, praefectus horti botanici Berolinenfis, cum Linkio edidit icones et defcriptiones plantarum. Obf. in Verhandel. der Gartenbau-Gefellfchaft. Ingentem plantarum copiam ipfi debeo.

— J. G. OTTO, praeco facer Kaufungae in Saxonia: *Verfuch einer Anordnung der Agaricorum.* Leipz. 1816. 8.

*Otth.* . . OTTH, Candollei adjutor in elaborando prodromo.

*Paiv.* Imman. Joach. Henr. A PAIVA, medicus Olyfiponenfis: *Memorias de hiftoria natural* etc. Lisbon. 1790. 4.

*P. B.* A. M. F. J. PALISOT DE BEAUVOIS, acad. Parif. focius, Guineam invifit, diu in Hifpaniola et America boreali degit (†1820): *Flore d'Oware et de Benin,* fafc. 1—6. Paris 1805—1810. fol. *Effai d'une nouvelle agroftographie.* Paris 1812. 8. Mufcologie ou traité fur les mouffes in Mém. de la foc. Linnéenne de Paris, 1.

*Pall.* Petr. Sim. PALLAS, acad. Petropolit. focius, magnus peregrinator (nat. 1740 †1810): *Reifen durch verfchiedene Provinzen des ruffifchen Reichs.* Th. 1—3. Petersb. 1771—1776. 4. *Flora roffica,* vol. 1. 2. Petrop. 1784. 1788. fol. *Neue nordifche Beyträge,* Th. 1—7. Petersb. 1781—1796. 8. *Species Aftragalorum defcriptae et iconibus illuftratae.* Lipf. 1800. fol. *Illuftrationes plantarum minus cognitarum.* Lipf. 1803. fol.

*Panz.* Georg. Wolfg. PANZER, medicus Herspruck in Franconia: *Obfervationum botanicarum fpecimen.* Norimb. 1781. 8. *Ideen zu einer künftigen Revifion der Gräfer.* München 1813. 4. In Sturmii flora plura capita elaboravit.

*Parkinf.* Jo. PARKINSON, botanicus regius Britann.: *Paradifi in fole paradifus terreftris.* Lond. 1629. fol. *Theatrum botanicum.* 1640. fol.

*Patrin.* Eugen. Ludov. Melch. PATRIN, Imaum 1781 perfcrutatus eft. Obf. in Pallas nordifchen Beytr. Plantae ab ipfo collectae tum Pallafio tum mufeo Parifienfi cefferunt.

*Perpent.* Helena PERPENTI, femina Comenfis: Obf. in Biblioteca italiana 1817.

*Perf.* Chrift. Henr. PERSOON: *Obfervationes mycologicae,* vol. 1. 2. Lipf. 1796. 1798. 8. *Commentatio de fungis clavaeformibus.*

Lipſ. 1797. 8. *Tentamen diſpoſitionis fungorum.* Lipſ. 1797. 8. Linnaeani ſyſtematis editionem 15. jam diximus. *Icones et deſcriptiones fungorum minus cognitorum.* faſc. 1. 2. Lipſ. 1799. 1800. 4. *Synopſis methodica fungorum.* Gott. 1801. 8. *Icones pictae fungorum rariorum*, faſc. 1. 2. Paris 1803. 4. *Synopſis plantarum* ſ. *Enchiridion botanicum*, vol. 1. 2. Paris 1805. 1807. 12. *Abhandlung über die eſsbaren Schwämme*, überſetzt von Dierbach. Heidelb. 1822. 8. *Mycologia europaea*, vol. 1. 2. Erlang. 1822. 1824. 8. Obſ. in Uſteri Annal., in Journ. de botanique et in Wetterauer Annal.

*Petagn.* Vincent. PETAGNA: *Inſtitutiones botanicae*, vol. 1-5. Neapol. 1785—1787. 8.

*Pill.* et *Mitterp.* Matth. PILLER et Ludov. MITTERPACHER de Mitterburg, prof. Peſtinenſis (nat. 1734 †1814): *Iter per Poſeganam, Sclavoniae provinciam.* Budae. 1783. 4.

*Pio.* Jo. Bapt. PIO: *De Viola ſpecimen.* Taurin. 1813. 4.

*Piſ.* Gul. PISO, medicus heroïs Mauritii Comitis Naſſavii, Braſiliam invadentis: *De Indiae utriusque re naturali et medica.* Amſt. 1658. fol.

*Plukn.* Leon. PLUKNET, botanicus regius Britann.: *Almageſtum botanicum.* Lond. 1696. 4. *Mantiſſa* 1700. *Amaltheum* 1705. 4.

*Plum.* Car. PLUMIER, e Minimorum ordine, botanicus regius gallicus, Indiam occidentalem ſedulo et ſcienter perſcrutatus eſt (nat. 1666 †1704): *Nova plantarum genera.* Paris 1703. 4. *Traité des fougères de l'Amérique.* Paris 1705. fol. *Plantarum americanarum* faſc. 1—10., ed. Jo. Burmann. Amſt. 1755—1760. fol.

*Pöppig.* Eduard. PÖPPIG, Lipſienſis, Cubam adiit. Plantae ſiccatae venales.

*Pohl.* Jo. Imman. POHL: *Verſuch einer Flora Böhmens.* Th. 1. 2. Prag 1810. 1814. 8. *Des Freyherrn von Hochberg botaniſcher Garten zu Hluboſch.* Prag. 1812. 8. Obſ. in Hoppe's Taſchenb. 1807.

*Poir.* J. L. M. POIRET, Numidiam peragravit: *Voyage en Barbarie.* Paris 1789. Encyclopaediam botanicam a vol. 5. inde et ſupplementa digeſſit.

*Poit.* . . POITEAU, doctus plantarum cultor, diu in Hiſpaniola commoratus eſt. Plantas rariſſimas cum aliis communicavit. Obſ. in Annal. et Mém. du muſ.

*Pollich.* Jo. Ad. POLLICH, medicus Caeſareae Lutrae (†1780): *Hiſtoria plantarum in Palatinatu electorali ſponte creſcentium.* tom. 1—3. Mannh. 1776. 1777. 8.

*Pollin.* Cyrus POLLINI, prof. ad tempus Veronenſis: *Viaggio al lago di Garda.* Verona 1816. 8. *Sulle alghe viventi nelle terme Euganee.* Milano 1817. 8. *Flora veronenſis*, vol. 1—3. Veron. 1822—1824. 8. Multas mecum plantas communicavit.

*Portenſchl.* Franc. a PORTENSCHLAG-*Ledermeyer*, JCtus Viennenſis (nat. 1772 †1821), ſedulus plantarum collector: *Enumeratio plantarum in Dalmatia lectarum.* Vindob. 1824. 8. Amici poſuerunt hoc monumentum: plantae a Rochelio delineatae.

*Pourr.* . . POURRET, abbas et canonicus S. Jacobi in Gallaecia Hiſpaniae: *Chloris narbonenſis* inferta actis academiae Toloſanae 3. Plantarum ingentem copiam Willdenovio largitus eſt.

*Presl.* Car. Boriwogo PRESL, cuſtos muſei bohemici Prag., Siciliam inviſit, cum fratre J. Swatopluco edidit *Floram cechicam.*

Prag. 1819. 8. Seorsim: *Cyperaceae et gramineae siculae*. Prag. 1820. 8. *Deliciae pragenses*. Prag. 1822. 8. *Reliquiae Hänkeanae*, vol. 1. Prag. 1825. fol. *Flora sicula*. Prag. 1826. 8.

*Pursh.* Frider. PURSH, qui ipse se Sibiria natum dictitabat, regiones Americae borealis pervestigavit (+1820): *Flora Americae septentrionalis*. vol. 1. 2. Lond. 1814. 8.

*Pyl.* Bachelot DE LA PYLAIE: Obs. in Journ. de bot. 4. 5.

*Rad.* Justus RADIUS, medicus Lipsiensis: *De Pyrola et Chimophila specimen*. Lips. 1821. 4.

*Radd.* Joseph. RADDI, Florentinus, Brasiliam obiit. Obs. in Atti di Siena, 9., memorie di Modena 18. 19. et opuscoli scientif. di Bologna. 3. 4. *Jungermanniografia etrusca*. Modena 1818. 4.

*Rafin.* Car. RAFINESQUE-*Schmalz*, diu in Sicilia commoratus est, jam prof. Lexington, Amer. bor.: *Caratteri di alcuni nuovi generi e nuove specie di animali e piante di Sicilia*. Palerm. 1810. 8. *Specchio delle scienze*. P. 1. Palerm. 1814. 8. *Florula Ludoviciana*. New-York. 1817. 8. (e C. C. Robin voyages 1807.) Obs. in Annal. bruxell. et in Silliman's americ. Journ.

*Ram.* Ludov. Franc. RAMOND, olim prof. ad Aquas Convenarum (Bagnères), dein praefectus Arverniae, Pyrenaeos montes obiit: *Voyages au Mont-perdu*. Paris 1801. 8. Obs. in Bullet. de la soc. philomath.

*Rau.* Ambros. RAU, prof. Wirceburgensis: *Enumeratio Rosarum* circa Wirceburgum crescentium. Norimb. 1816. 8.

*Rebent.* Jo. Frider. REBENTISCH, praefectus seminarii chirurgici Berolin.: *Prodromus florae neomarchicae*. Berol. 1804. 8. *Index plantarum circum Berolinum sponte nascentium*. Berol. 1805. 8.

*Red.* P. J. REDOUTÉ, eximius plantarum pictor Paris.: *Les Liliacées*, vol. 1-8. Paris 1802-1816. fol. *Les Roses*. Paris 1817 f. fol. Splendidissimum utrumque opus.

*Reich.* Jo. Jac. REICHARD, medicus Francofurti ad Moenum (nat. 1743 +1789): *Systema plantarum*, P. 1—4. Frcf. 1779. 1780. 8. *Flora moeno-francofurtana*, tom. 1. 2. Frcf. 1772. 1778. 8. Obs. in Schrift. naturf. Freunde zu Berlin, 1.

*Reichenb.* Ludov. REICHENBACH, prof. Dresdensis: *Monographia generis Aconiti et Delphinii*. Lips. 1820. fol. *Icones et descriptiones plantarum*, vol. 1. Lips. 1822. 4. *Iconographia botanica*, vol. 1—4. Lips. 1823—1826. 4. *Hortus botanicus*, cent. 1. Lips. 1824. 4. Fasciculos 42. 43. 45. florae Sturmianae elaboravit. Obs. in Regensb. bot. Zeit. Multas plantas ipsi debeo.

*Reinw.* G. C. REINWARDT, prof. Leidensis, diu in Java vixit: Obs. in Verhand. van het bataav. Genootsch. 9. et in Blum. catal. Buitenzorg.

*Relh.* Rich. RELHAN, clericus: *Flora cantabrigiensis*. 1785. 8. *Supplem.* 1—3. 1786—1793. 8.

*Requien.* . . REQUIEN, Avenionensis: Enumeratio plantarum in Valle-clausa crescentium, in Guérin description de Vaucluse. Avign. 1813. 12. Obs. in Ann. des scienc. natur. 5. Multas cum Candolleo plantas communicavit.

*Retz.* And. Jo. RETZIUS, prof. Lundinensis (nat. 1744 +1821): *Fasciculus* 1—6. *observationum botanicarum*. Lips. 1779—1791. fol. *Florae Scandinaviae prodromus*, ed. 2. Lips. 1795. 8. Obs. in act. acad. holm. et in Physiogr. sällskap. handl.

*Reyn.* L. REYNIER, medicus Laufannenfis (†1824): Obf. in Journ. de phyf., Mém. de la foc. de Laufanne, Mém. pour l'hift. nat. de la Suiffe, in Höpfner's Mag. für die Naturk. Helvetiens.

*Rheed.* Henr. Adr. *van* RHEEDE *tot Drakenfteen*, proconful Malabar.: *Hortus malabaricus*, P. 1—12. Amftelod. 1678—1703. fol.

*Rich.* Ludov. Claud. RICHARD, acad. Parif. focius, diu in Guiana vixit, eximius plantarum ferutator. (nat. 1754 †1821.) Obf. in Perfoonii enchiridio, in Journ. de phyf., in Ann. et Mém. du muf., in Melaftomeis Humboldtianis. Innumeras plantas aliis largitus eft.

— Achill. RICHARD, prioris filius, prof. Parif.: *Botanique médicale.* 1. 2. Paris 1823. 8. Obf. in Ann. bruxell. 4. et in Ann. des fcienc. nat.

*Richardf.* Jo. RICHARDSON, Franklini comes in itinere ad polum arcticum. Floram earum regionum adumbravit in Franklin's voyage to the fhores of the polar fea. Lond. 1823. 4.

*Riff.* A. RISSO: *Hiftoire naturelle des orangers.* (focio Poiteau) vol. 1. 2. Paris 1820. 4. Obf. in Ann. du muf. 20.

*Riv.* Aug. Quirin. RIVINUS, prof. Lipfienfis (nat. 1652 †1725): *Introductio generalis in rem herbariam.* 1690—1699. fol.

*Robf.* Ed. ROBSON: Obf. in Transact. foc. Linn. 3.

*Rochel.* Ant. ROCHEL, cuftos horti Peftinenfis, dudum chirurgus in Rownye Hungar: plantarum carpathicarum induftrius ferutator, quarum multas mihi mifit. *Pflanzen-Umriffe aus dem füdlichen Karpath des Bannats.* 1820.

*Rodrigu.* Jof. RODRIGUEZ apud Lagafc. elench. hort. Matrit.

*Röhl.* Jo. Chrift. RÖHLING, infpector Maffenheim: *Deutfchlands Flora.* Th. 1—3. Frkf. 1812—1814. 8.

*Röm.* Jo. Jac. RÖMER, prof. Turicenfis (†1819): *Archiv für die Botanik.* Th. 1—3. Lipf. 1796—1803. 4. *Linnaei fyftema vegetabilium*, vol. 1—6. (Cl. I—V., focio Schultefio.) Stuttg. 1817—1820. 8.

*Rohde.* Mich. ROHDE, Bremenfis, egregius collector et obfervator. Obf. in Schrader's Journ. Multas mihi plantas mifit.

*Roland.* Dan. ROLANDER: Obf. in act. acad. holm. 1756.

*Rofc.* Gul. ROSCOE, civis Liverpoolienfis, eruditiffimus vir. Scitamineas primum in Transact. foc. Linn. 8. dein in opere fplendido, quod etiamnum continuatur, egregie illuftravit. Plantas ipfi debeo plures.

*Roftcov.* Frid. Gul. Theoph. ROSTCOVIUS, medicus Stettinenfis: *Diff. de Junco.* Hal. 1801. 8. *Flora fedinenfis.* Stettin. 1824. 8. Plerasque plantas ab ipfo inventas mihi largitus eft.

*Roth.* Alb. Gul. ROTH, archiater popularis principatus Bremenfis: *Beyträge zur Botanik.* Th. 1. 2. Bremen 1782. 1783. 8. *Tentamen florae germanicae*, P. 1—3. Lipf. 1788—1800. 8. *Catalecta botanica*, fafc. 1—3. Lipf. 1797—1806. 8. *Neue Beyträge zur Botanik.* Frankf. 1802. 8. *Botanifche Bemerkungen.* Leipz. 1807. 8. *Novae plantarum fpecies, praefertim Indiae orientalis.* Halberftad. 1821. 8.

*Rottb.* Chrift. Friis ROTTBÖLL, prof. Havnienfis (nat. 1727 †1797): *Defcriptionum et iconum liber.* Havn. 1773. fol. *Defcriptiones plantarum rariorum.* Havn. 1776. 4. Obf. in Collect. foc. med. Havn. 2., in Kiöbenh. Selfk. Skrift. 10., in Danfke Videnfk. Selfk. nye Skrift. 2.

*Rottl.* . . ROTTLER, missioni evangelicae in India orientali, Vepery, addictus. Obs. in neuen Schriften der Berl. Gesellsch. naturf. Freunde, 4. Vahlio, Willdenovio et mihi multas misit plantas.

*Roxb.* Gul. ROXBURGH, medicus Anglus in India orient.: *Plants of the coast of Coromandel.* vol. 1—3. Lond. 1795—1816. *Alphabetical list of the plants of S. Helena:* ad Beatson's tracts relative to the island of S. Helena. Lond. 1816. 4. *Flora indica,* ed. Wallich et Carey. Calcutta. vol. 1. 2. 1821. 1824. 8. Obs. in *Asiatic researches,* vol. 11. Plantarum copiam et Willdenovio et mihi donavit.

*Rudg.* Ed. RUDGE: *Plantarum Guianae rariorum icones et descriptiones.* Lond. 1806. fol. Obs. in Transact. soc. Linn. 8. 10.

*Rud.* Jo. Fr. RUDOLPH, acad. Petropolit. socius (nat. 1744 † 1809). Obs. in act. acad. Petropolit. Egregiam plantarum orientalium collectionem ab eo accepi.

*Rudolph.* Car. Asm. RUDOLPHI, prof. anatomiae Berolinensis, olim rei herbariae scientia insignis, multas mihi plantas rariores largitus est. Obs. in Schrader's Journ.

*R. et P.* Hippol. RUIZ et Jos. PAVON, Hispani, comite Dombeyo omnem regionum Americae australis dudum Hispaniae subditarum ambitum obierunt. *Florae peruvianae et chilensis prodromus.* Matr. 1794. fol. *Flora peruviana et chilensis,* vol. 1—3. Matr. 1798 f. fol.

*R. et Sch.* v. Röm. et Schult.

*Rumph.* Georg. Everard. RUMPHIUS, mercator, proconsul batavus in insula Amboina (nat. 1637 † 1706): *Herbarium amboinense,* ed. Burmann. vol. 1—7. Amst. 1741—1751. fol.

*Russel.* Alex. RUSSEL, medicus Halepensis († 1768): *Naturgeschichte von Aleppo,* übers. B. 1. 2. Göttingen 1798. 8.

*Sabin.* Jos. SABINE, societati horticult. britannicae ab epistolis: Obs. in Transact. soc. horticult. et in Botan. register.

*Sadler.* Jos. SADLER, Pestinensis: *Diss. sistens descriptionem plantarum epiphyllospermarum Hungariae.* Pestin. 1820. 8.

*Salisb.* Rich. Ant. SALISBURY: *Icones stirpium rariorum.* Lond. 1791. fol. *Prodromus stirpium in horto ad Chapel-Allerton.* Lond. 1796. 8. *Paradisus londinensis,* vol. 1. 2. Lond. 1805—1808. 4. Ψευδωνύμως dicitur, *Knightii* nomine, commentarium de *Proteeis* edidisse, quem, nusquam venalem, mutuo ab Haworthio accepi. Obs. in Annals of botany, et in Transact. of horticult. society.

*Salm.* Josephus, Princeps SALM-*Dyk* (nat. 1773): *Verzeichniss des Geschlechts Aloë* s. l. et a. Multas praesertim succulentas, plantas mihi largitus est.

*Salzm.* Phil. SALZMANN, sedulus plantarum per Galliam australem, Corsicam et Hispaniam indagator. *Enumeratio plantarum rariorum, quas collegit.* Monspel. 1818. 8.

*Sant.* Georg. SANTI: *Viaggi per la Toscana.* vol. 1—3. Pisa 1795—1806. 8.

*Sav.* Cajetanus SAVI, prof. Pisanus: *Flora pisana.* tom. 1. 2. Pisa 1798. 8. *Botanicon etruscum.* tom. 1—4. Pisa 1808—1825. 8. *Observationes in varias Trifolii species.* Flor. 1810. 4.

*Savign.* . . SAVIGNY nonnulla capita in Encycl. botan. vol. 4. ela-

*Schäff.* Iac. Christ. SCHÄFFER, praeco sacer Ratisbonensis (nat. 1718 † 1790): *Fungorum, qui in Palatinatu et Bavaria circa Ratisbonam nascuntur, icones.* tom. 1—4. Ratisb. 1762—1770. 4.

*Schärer.* Lud. Imman. SCHÄRER, praeco sacer Bern.: *Lichenum helveticorum spicilegium.* Bern. 1823—1826. 4. Obs. in Musée helvet. 1.

*Schangin.* Petr. SCHANGIN, metallorum inspector in Barnaul Sibir. (nat. 1741 † 1816.) Pallasio plantarum sibiricarum et mongolicarum copiam misit. Observ. in Pallas neuen nord. Beytr. 6.

*Scherer.* Jo. Andr. SCHERER: Obs. in Jacquin coll. 1.

*Schimper.* Car. SCHIMPER, Heidelbergensis: Obs. in Regensb. botan. Zeit. 1825.

*Schk.* Christ. SCHKUHR, artifex mechanicus Wittebergensis (nat. 1740 † 1811): *Botanisches Handbuch.* Th. 1—3. Wittenb. 1791—1803. 8. *Beschreibung und Abbildung der Riedgräser.* Wittenb. 1801. 1806. 8. *Vier und zwanzigste Klasse des Linné'schen Pflanzensystems.* B. 1. Wittenb. 1809. 4.

*Schlechtend.* Dieter. A SCHLECHTENDAL, dicasterii provincialis praeses Paderborn. Obs. in Berl. Mag. 7. 8. Supplementum ad Willdenovii enumerationem posthumum edidit.

— Dieter. A SCHLECHTENDAL, prioris filius, custos herbarii regii berolinensis: *Animadversiones in Ranunculeas Candollii,* fasc. 1. 2. Berol. 1819. 1820. 4. *Flora berolinensis,* vol. 1. 2. Berol. 1823. 1824. 8. *Adumbrationes plantarum,* fasc. 1—3. Berol. 1825. 1826. 8. *Linnaea,* vol. 1. Berol. 1826. 8. Officiosae ejus humanitati debeo gratus plantarum in herbario regio servatarum usum.

*Schleich.* J. C. SCHLEICHER, plantarum collector et venditor, Bex ad lacum Lemanum: *Catalogus plantarum in Helvetia sponte nascentium,* ed. 4. 1821. 8.

*Schmidel.* Casim. Christ. SCHMIDEL, prof. Erlangensis (nat. 1718 † 1793): *Icones et analyses plantarum.* Norimb. 1782. fol. *Dissertationes botanici argumenti.* Erlang. 1783. 4.

*Schmidt.* Franc. SCHMIDT, hortulanus: *Oestreichs allgemeine Baumzucht.* Th. 1. 2. Wien 1792. 1794. fol.

— Franc. Wilib. SCHMIDT, prof. Pragensis († 1796): *Flora boëmica,* cent. 1—4. Prag. 1793. 1794. fol. Obs. in Mayer's physik. Aufsätzen 1., in neuen Abh. der böhmischen Gesellsch. 2., in Römer's Archiv, 1.

— Jo. Car. SCHMIDT, scholae Fellenbergianae in Hofwyl prope Bernam collega, cum Kunzio edidit: Deutschlands Schwämme in getrockneten Exemplaren (1816—1818). Obs. egregias de Phacidio et de disponendis Sphaeriis, quas sequutus sum in hoc opere, in Kunze's mykolog. Heften, 1. 2.

*Schneevoogt.* G. Voorhelm SCHNEEVOOGT: *Icones plantarum rariorum.* fasc. 1. 2. Harlem. 1793. fol.

*Scholl.* Frid. Ad. SCHOLLER, paedagogus fratrum Moravicorum Barby (nat. 1718 † 1785): *Flora barbiensis.* Lips. 1775. 8. *Supplementum florae.* 1787. 8.

*Schott.* Henr. SCHOTT, inspector horti botanici Vindobonensis († 1819). Egregiam plantarum copiam congessit cumque aliis communicavit.

— Henr. SCHOTT, prioris filius, hortulanus, Brasiliam adiit. Obs. in Wiener medic. Jahrb. 6. et in appendice ad hoc opus.

*Schousb.* P. C. A. SCHOUSBOE, mercaturae Danorum procurator in Mauritania: *Beobachtungen über das Gewächsreich in Marocco.* Aus dem Dänischen von J. A. Marcussen. Leipz. 1800. 8.

*Schouw.* Joach. Frid. SCHOUW, prof. Havniensis: Italiam et Siciliam 1817—1819 peragravit, mihi et algas et alias plantas largitus est. Versuch einer allgemeinen Pflanzen-Geographie. Berl. 1823. 8.

*Schrad.* Henr. Adolph. SCHRADER, prof. Gottingensis: *Spicilegium florae germanicae.* Hannov. 1794. 8. *Systematische Sammlung kryptogamischer Gewächse.* 1. 2. Gött. 1796. 1797. 8. *Sertum Hannoveranum*, fasc. 1—3. Gott. 1795—1797. fol. *Journal für die Botanik*, B. 1—5. Gött. 1799—1801. 8. *Neues Journal für die Botanik*, B. 1—4. Gött. 1806—1810. 8. *Commentatio de Veronicis spicatis.* Gott. 1803. 8. *Flora germanica*, vol. 1. (Cl. I—III.) Gott. 1806. 8. *Hortus gottingensis*, fasc. 1. 2. 1809. 1813. fol. *Monographia generis Verbasci.* fasc. 1. 2. Gott. 1813. 1823. 4. Obs. in Gött. gel. Anzeigen.

*Schrank.* Franc. de Paula SCHRANK, acad. Monachiensis socius: *Bayersche Flora.* 1. 2. München 1789. 8. *Primitiae florae Salisburgensis.* Frcf. 1792. 8. *Reise nach den südlichen Gebirgen von Bayern.* Münch. 1793. 8. *Plantae rariores horti Monacensis*, fasc. 1. 2. Monach. 1817. fol. Obs. in Usteri Annal., im Naturforscher, in act. acad. Monach., in Denkwürd. der bot. Gesellsch. in Regensb., in Regensb. bot. Zeit.

*Schreb.* Jo. Christ. Dan. SCHREBER, prof. Erlangensis (nat. 1739 †1810): *Icones plantarum minus cognitarum*, dec. 1. Hal. 1766. fol. *Beschreibung der Gräser.* Th. 1—3. Leipz. 1769—1810. fol. *Spicilegium florae Lips.* 1771. 8. *De Phasco observationes.* Lips. 1772. 4. *Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species.* Lips. 1774. 4. *Genera plantarum*, vol. 1. 2. Frcf. 1789. 1791. 8. Obs. in nov. act. nat. cur. 3. 4. in nov. act. Upsal. 1.

*Schubert.* C. SCHUBERT in Ficini flora Dresd. 2.

*Schübl.* Gust. SCHÜBLER, prof. Tubingensis: *Diss. sistens descriptiones cerealium cultorum.* Tubing. 1818. 4.

*Schult.* Jo. Aug. SCHULTES, prof. Landshut. in Bavaria: *Oestreichs Flora.* B. 1. 2. Wien 1794. 8. *Observationes botanicae.* Oenipont. 1809. 8. Cum Römero edidit Systema vegetabilium.

*Schultz.* Car. Frid. SCHULTZ, medicus Neobrandenburgi: *Prodromus florae Stargardiensis.* Berol. 1806. 8. *Supplementum* 1. Neobrandenb. 1819. 8. Obs. in nov. act. nat. cur.

*Schum.* Christ. Frid. SCHUMACHER, prof. Havniensis: *Enumeratio plantarum in partibus Saelandiae septentrionalis et orientalis.* P. 1. 2. Havn. 1801. 1803. 8. Obs. in Naturh. Selsk. Skrift. 1. 3.

*Schumm.* a SCHUMMEL, collector Silesius vid. *Günther.*

*Schwab.* Henr. SCHWABE, pharmacopola Dessaviensis, acutissimus plantarum, praesertim algarum, indagator.

*Schwägr.* Frid. SCHWÄGRICHEN, prof. Lipsiensis, eximius muscorum frondosorum scrutator. *Supplementum 1. et 2. ad J. Hedwig species muscorum frondosorum.* Lips. 1811—1826. 4. *Historiae muscorum hepaticorum prodromus.* Lips. 1814. 8. Muscos rariores multos ipsi debeo.

*Schweigg.* Aug. Frid. SCHWEIGGER, prof. Regiomontanus (in Sicilia trucidatus 1821): *Flora erlangensis* (cum Franc. Körte).

Erl. 1811. 8. Obſ. in Königsb. Archiv für Naturwiſſ. 1. Plurimas eximio viro plantas debeo. Multis ille bonis flebilis occidit!

*Schwein.* Lud. Dav. a Schweinitz, miſſioni fratrum Moravicorum in Bethlehem Penſylvaniae addictus, ſocio J. B. *ab Albertini Conſpectus fungorum in agro Niskienſi creſcentium.* Lipſ. 1805. 8. Caricum americanarum monographia. 1822. Obſ. in Ann. of the Lyceum of New-York, 1., in Silliman's americ. Journ. et in act. nat. ſcrutat. Lipſ. 1.

*Sebaſt.* Anton. Sebastiani, prof. Romanus: *Florae Romanae prodromus.* Rom. 1818. 8.

*Second.* . Secondat: *Obſervations de phyſique et d'hiſtoire naturelle.* Paris 1750. 8.

*Segu.* Franc. Seguier, Nemauſenſis, Scipionis Maffei hoſpes: *Plantae veronenſes,* tom. 1—3. Veron. 1745—1754. 8.

*Ser.* Nic. Car. Seringe, Bernae dudum, jam Genevae vivit: *Eſſai d'une monographie des ſaules de la Suiſſe.* Bern. 1815. 8. *Mélanges botaniques.* vol. 1. Bern. 1818. 8. *Muſée helvétique d'hiſt. naturelle,* vol. 1. Genev. 1823. 4. In Candollei prodromo plura capita elaboravit.

*Seſſ.* . Sessé, botanicus mexicanus, cujus icones et deſcriptiones plantarum mexicanarum *Mocino* mexicanus, Monspelii exul, cum Candolleo communicavit.

*Seſt.* Dominic. Sestini, abbas, celeberrimus numiſmatum ſcrutator. *Viaggio da Buchareſt a Coſtantinopoli.* 1794. 8. Quas in hoc itinere per Moeſiam inferiorem et Thraciam invenerat plantas, eum Willdenovio communicavit, qui, quod Galacz (oppidum ad Danubium) aſcriptum erat, Galatiam interpretatus eſt, falſam patriam.

*Sibth.* Jo. Sibthorp, prof. Oxonienſis († 1796), Graeciam omnem Aſiamque minorem bis obiit. *Flora Oxonienſis.* Oxon. 1794. 8. *Flora graeca,* ſplendidiſſimum opus, Smithio curante ab anno 1806 inde prodit.

*Sieb.* Franc. Gul. Sieber, Pragenſis, inſignis peregrinator, ingentes theſauros regionum variarum acceſſuque difficillimarum aperuit. Braſiliam primum, Comitis Hofmannseggii juſſu, adiit, dein Auſtriam omnem, Italiamque peragravit, tum et Cretam et Aegyptum ſcienter obiit, tandem novam Hollandiam inviſit. Ipſius ſumtibus et Hilſenbergius Maſcarenas et Kohautus Martinicam et Senegambiam adierunt. *Reiſe nach der Inſel Kreta.* Th. 1. 2. Leipz. 1823. 8.

*Siegesb.* Jo. Georg. Siegesbek, prof. Petropolitanum, Anandriam nuncupaſſe conſtat e Linn. amoen. 1. p. 248.

*Sims.* Jac. Sims, poſt Curtiſii obitum opus: Botanical magazine, inſtruxit.

— Jo. Sims, M. D. cum Konigio: *Annals of botany,* 1. 2. Lond. 1805. 1806. 8.

*Sm.* Jo. Ed. Smith, M. D., digniſſimus Linnaei heres: *Plantarum icones hactenus ineditae.* faſc. 1—3. Lond. 1789—1791. fol. *Icones pictae plantarum rariorum.* Lond. 1790—1793. fol. *Spicilegium botanicum,* 1. 2. Lond. 1791. 1792. fol. *Engliſh botany* (Sowerbio icones inſtruente). vol. 1—36. Lond. 1790—1814. 8. *Sketch of a tour on the continent,* vol. 1—3. Lond. 1793. 8. *Tracts relating to natural hiſtory.* Lond. 1798. 8. *Flora britannica,* vol. 1—3. Lond. 1800. 8. *Exotic botany,* faſc. 1—8. Lond. 1804—1806. 8. *Florae graecae prodromus.* vol. 1. 2.

Lond. 1806. 1813. 8. *The english flora*, vol. 1—3. Lond. 1824. 1825. In Transact. soc. Linn., in Reesii Cyclopaedia et in actis taurinensibus innumeras descripsit plantas novas aut raras. Plures etiam mihi largitus est.

*Chr. Sm.* Christ. SMITH (nat. 1781 † 1816), prof. Christianiae designatus, comes Buchii in insulis Canariis et Tuckeii ad Africam tropicam occidentalem. Et Buchius et R. Brownius divulgarunt, quas invenit plantas. (R. Brown's observ. on the herbarium collected by Chr. Smith in the vicinity of the Congo. Lond. 1818. 4.)

*Soland.* Dan. Car. SOLANDER, Banksii comes in celeberrimo itinere περιχοσμίῳ, dein bibliothecarius musei britannici (nat. 17[illegible] † 1786). Ἀνεκδότοις usi sunt Jon. Dryander et R. Brownius.

*Sonner.* Petr. SONNERAT, illustris navigator, rei herbariae scientia clarus († 1781): *Voyage à la nouvelle Guinée.* Paris 1776. 4. *Voyages aux Indes orientales et à la Chine.* Paris 1782. 4.

*Sowerb.* Jac. SOWERBY, pictor rei herbariae gnarus († 1822): *English fungi or mushrooms.* N. 1—29. Lond. 1799. fol. In opere Smithiano: English botany, icones fecit.

*Sparrm.* Andr. SPARRMAN, Ekebergii et Forsteri in itineribus comes, dein in Africa australi commoratus, tandem acad. holm. addictus (nat. 1747 † 1820). *Resa til Goda - hopps - udden.* Stockh. 1783. 8. Obs. in act. acad. holm. et in nov. act. soc. Upsal.

*Spin.* Marchio SPIN, chiliarchus militum Sardin. *Le jardin de S. Sebastien.* Turin. 1818. 8.

* *Auctor.* *Florae halensis tentamen novum.* Hal. 1806. 8. *Mantissa* 1. *florae halensis cum cent. novarum plantarum.* 1807. 8. *Observationes botanicae in floram halensem.* 1811. 8. *Plantarum minus cognitarum pug.* 1. *et* 2. Hal. 1813. 1815. 8. *Plantarum umbelliferarum prodromus.* Hal. 1813. 8. *Species Umbelliferarum minus cognitae.* Hal. 1818. 4. *Novi proventus hortorum halensis et berolinensis.* Hal. 1818. 8. *Anleitung zur Kenntniss der Gewächse.* Th. 1—3. ed. 1. Hall. 1802—1804. 8. ed. 2. 1817. 1818. 8. *N. E. Neue Entdeckungen im ganzen Umfang der Pflanzenkunde.* Th. 1—3. Leipz. 1820—1822. 8. In Römeri et Schultesii systemate vegetabilium Umbelliferas (vol. 6.) digessit. Obs. in act. acad. Holm. et Petropolit., nov. act. nat. cur., Transact. soc. Linn., Bulletin de la soc. philomath., Mém. de la soc. d'hist. nat. de Moscou, Schrader's Journ., Berlin. Magaz., Wetter. Annalen, Denkwürd. der bot. Gesellschaft in Regensb.

*Stackh.* Jo. STACKHOUSE: *Nereïs britannica*, ed. 2. Oxon. 1816. 4.

*Stark.* . STARKE, praeco sacer Tschirnae Silesiae: Obs. in Schrader's Journ. Plantas multas, praesertim cryptogamicas, cum aliis communicavit. Obs. in Schrader's Journ. 1799.

*Stechm.* Jo. Paul. STECHMANN: *Diss. de Artemisiis.* Gott. 1775. 4.

*Steph.* Frid. STEPHAN, prof. Mosquensis († 1817): *Enumeratio stirpium agri Mosquensis.* Mosqu. 1792. 8. *Icones plantarum Mosquensium*, dec. 1. 2. Mosqu. 1796. fol. Obs. in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Mosc. 1.

*Sternb.* Casp. Comes A STERNBERG, e proceribus Bohemiae: *Botanische Wanderung in den Böhmer Wald.* Regensb. 1806. 8. *Reisen durch Tyrol in die östreichischen Provinzen Italiens.* Regensb. [illegible]. *Revisio Saxifragarum iconibus illustrata.* [illegible]

*Turn.* Dawſon TURNER: *A ſynopſis of the britiſh Fuci.* Lond. 1802. 12. *Muſcologiae hibernicae ſpicilegium.* Yarmouth. 1804. 8. *Fuci,* or coloured figures and deſcriptions etc. vol. 1—4. 1807. fol.

*Turp.* P. J. F. TURPIN, ingenioſus et doctus plantarum pictor. Cum Poiteo: *Flore des environs de Paris.* faſc. 1—7. 1808 f. Cum eodem Duhamelii novam curavit editionem. Obſerv. in Ann. et Mém. du muſ.

*Turr.* Ant. TURRA: *Florae italicae prodromus.* Vicent. 1780. 8.

*Tuſſ.* F. R. DE TUSSAC: *Flore des Antilles,* vol. 1—3. Paris 1808 —1826. fol.

*Ucr.* R. Bernard. UCRIA, demonſtrator plantarum Panorm.: *Hortus regius Panormitanus.* Panorm. 1819. 4. Obſ. in Römer Archiv, 1.

*Urv.* Jo. Dumont D'URVILLE, primum comes navarchi Gauttier 1819 et 1820 inſulas maris aegei et oras ponti euxini inviſit, dein 1822—1825 itinere *περικοσμίῳ* inclaruit. Enumeratio plantarum in Mém. de la ſoc. Linn. de Paris, 1.. Sur la flore des Malouines in Ann. des ſcienc. nat. 6.

*Vahl.* Martin. VAHL, prof. Havnienſis, Europam auſtralem ipſamque Numidiam obierat (nat. 1749 † 1804): *Symbolae botanicae,* P. 1—3. Havn. 1790—1794. fol. *Eclogae americanae,* fol. 1. 2. Havn. 1796. 1798. fol. *Icones illuſtrationi plantarum in eclogis inſervientes,* dec. 1—3. Havn. 1798. 1799. fol. Florae danicae vol. 6. et 7. inſtruxit. *Enumeratio plantarum,* vol. 1. 2. Havn. 1804. 1805. 8. Obſ. in Naturhiſt. Selſk. Skrivt. 1. 2.

*Vaill.* Sebaſt. VAILLANT, prof. Pariſienſis (nat. 1669 † 1721): *Botanicon pariſienſe.* Leid. 1727. fol. Obſ. in act. acad. Pariſ. 1718—1722.

*Vand.* Domin. VANDELLI, Italus, prof. Conimbricenſis, diu in Braſilia degit: *Diſſ. de Aponi thermis.* Patav. 1758. 4. *Faſciculus plantarum.* Olyſip. 1771. 4. *Diccionario dos terminos technicos de hiſtoria natural.* Coimbr. 1788. 4. Recuſ. in Römer. ſcriptor. de plantis luſitan., hiſpan. et braſil.

*Vauch.* Jo. Petr. VAUCHER, verbi divini miniſter Genevenſis: *Hiſtoire des Conferves d'eau douce.* Genèv. 1803. 4. Obſ. in Mém. du muſ. et in mém. de la ſoc. phyſ. de Genève.

*Vell.* Thom. VELLEY, chiliarchus britann. († 1806): *Coloured figures of marine plants.* Bathon. 1795. fol. Obſ. in Transact. ſoc. Linn.

*Vent.* Steph. Petr. VENTENAT, prof. Pariſienſis (nat. 1757 † 1808): *Deſcription des plantes nouvelles, cultivées dans le jardin de M. Cels.* Paris 1800. fol. *Monographie du genre Tilleul.* Paris 1802. 4. *Jardin de la Malmaiſon,* vol. 1. 2. Paris 1803. 1805. fol. *Choix de plantes.* faſ. 1—10. Paris 1803—1808. 4. *Decas generum novorum.* Paris 1808. 4.

*Veſt.* Laur. DE VEST, prof. Graiaci in Styria. Obſ. in Regensb. bot. Zeit. Cum Römero et Schulteſio plantas communicavit.

*Vib.* Eric. VIBORG, prof. Havnienſis (nat. 1759 † 1822): *Abh. von der Gerſte.* Kopenh. 1802. 4. Obſ. in nov. act. havn. 1.

*Vigu.* loco Vign. L. G. A. VIGUIER: *Hiſtoire naturelle des Pavots et des Argemones.* Montpell. 1814. 4.

*Vill.* D. VILLARS, primum medicus Gratianopol., dein prof. Argentinenſis († 1814): *Hiſtoire des plantes du Dauphiné,* vol. 1-4. Grenoble 1786—1789. 8. *Précis d'un voyage botanique.* Straſb. 1812. 8.

*Vitm.* Fulgent. VITMANN: *Summa plantarum, quae hactenus innotuerunt*, vol. 1—6. Mediol. 1789—1792. 8.

*Viv.* Domin. VIVIANI, prof. Genuensis: *Annali di botanica*, 1. 2. Genova 1802. 1804. 8. *Florae italicae fragmenta*. Gen. 1808. 4. *Florae libycae specimen*. Gen. 1824. fol. *Florae corsicae prodromus, cum appendice*. Genuae 1824. 1825. 4.

*Vog.* Bened. Christ. VOGEL, prof. Altorfinus: *Plantarum rariorum icones Trewianas illustravit*. Norimb. 1779. fol.

*Voit.* I. G. VOIT, medicus Svinfurtensis: *Historia muscorum frondosorum in ducatu herbipolitano crescentium*. Norimb. 1812. 8. Icones Sturmii in florae sect. 2. fasc. 11—14. illustravit.

*Volckam.* Jo. Georg. VOLCKAMER, medicus Norimbergensis (nat. 1616 † 1693): *Flora norimbergensis*. Norimb. 1700. 4.

*Wahlb.* Petr. Fridex. WAHLBERG: *Flora gothoburgensis*. Upsal. 1820. 8.

*Wahlenb.* Georg. WAHLENBERG, prof. Upsaliensis: *Flora lapponica*. Berol. 1812. 8. *De vegetatione helvetica*. Turic. 1813. 8. *Flora Carpathorum*. Gott. 1814. 8. *Flora upsaliensis*. Upsal. 1820. 8. *Flora suecica*. P. 1. 2. Stockh. 1824. 1826. 8. Operis Svensk botanik tom. 9. redegit. Obs. in act. acad. holm.

*Waiz.* Frid. WAIZ, tabularii praefectus Altenburg. Rosarum collector.

*Wall.* Nathan. WALLICH, horti botanici Calcutt. praefectus: *Tentamen florae nepalensis illustratae*. Calcutt. et Seramp. 1824. fol. Obs. in Roxburghii flor. ind., in Asiatic research., in Transact. soc. Linn. et in Tidskrift for Naturvidenskab.

*Wallm.* . . WALLMODEN: Obs. in Liljeblad's svensk flora.

*Wallr.* Frid. WALLROTH, medicus Northusanus: *Annus botanicus*. Hal. 1815. 8. *Schedulae criticae*. Hal. 1822. 8. Obs. in Verhand. der berl. Gesellsch. naturf. Freunde, 1.

*Walt.* Thom. WALTER: *Flora Caroliniana*. Lond. 1788. 8.

*Wangenh.* Frid. Ad. Jul. A WANGENHEIM, sylvarum curator: *Beschreibung einiger nordamericanischen Holzarten*. Gött. 1781. 8. Obs. in Beobacht. der berl. Gesellsch. naturf. Freunde.

*Web.* Fr. WEBER, prof. Kiloniensis (nat. 1781 † 1823). Cum Mohrio: *Naturhistorische Reise durch einen Theil Schwedens*. Gött. 1804. 8. *Deutschlands kryptogamische Gewächse*. Kiel 1807. 12. *Archiv für die systematische Naturgeschichte*. 1. Leipz. 1804. 8. *Beyträge zur Naturkunde*, B. 1. Kiel 1805. 8. *Grossbritanniens Conferven*, nach Dillwyn bearbeitet, Heft 1—4. Gött. 1803—1805. 8. . . Seorsim: *Historiae muscorum hepaticorum prodromus*. Kil. 1815. 8.

— Georg. Henr. WEBER, prof. Kiloniensis, prioris pater: *Spicilegium florae gottingensis*. Goth. 1778. 8. Cf. Wiggers.

*Weig.* Christ. Ehrenfr. A WEIGEL, prof. Gryphiae: *Flora pomerano-rugica*. Berol. 1769. 8. *Observationes botanicae*. Gryph. 1772. 4.

*Weih.* Aug. WEIHE, medicus Herford.: *Beschreibung der deutschen Brombeerarten, mit Abbildungen*. Heft 1—4. Bonn 1820 f. fol. Gramina germanica siccata fasciculis 12. edidit.

*Weinm.* J. A. WEINMANN, hortulanus imperatricis viduae Ruthen. in Pawlowsk. Obs. in Regensb. bot. Zeit. 1821 f.

*Weis.* Fr. Gul. WEIS: *Plantae cryptogamicae florae Gottingensis*. Gott. 1770. 8.

*Wendl.* Henr. Ludov. WENDLAND, hortulanus Herrenhusanus: *Commentatio de Acaciis aphyllis.* Hannov. 1820. 4.
— Jo. Christ. WENDLAND, praefectus horti Herrenhusani, prioris pater: Cum Schradero: *Sertum hannoveranum*, fasc. 1—3. Gott. 1795—1797. fol. *Hortus herrenhusanus*, tom. 1—4. Hannov. 1798. 1799. fol. *Botanische Beobachtungen.* Hannov. 1798. 4. *Ericarum icones*, fasc. 1—17. Hannov. 1798—1806. 4. *Sammlung ausländischer und einheimischer Pflanzen.* B. 1. 2. Hannov. 1806—1810. 4.
*West.* Hans WEST: *Beskrivelse over S. Croix.* Kiobenh. 1793. 8.
*Wib.* Aug. Gul. Eberh. Christ. WIBEL: *Primitiae florae Werthemensis.* Jen. 1799. 8.
*Wigg.* Frid. Henr. WIGGERS: *Primitiae florae holsaticae.* Kil. 1780. 8. Verus auctor est G. H. Weber, prof. Kiloniensis, qui et supplementum huius florae 1787. 8. edidit.
*Wikstr.* Jo. Immen. WIKSTRÖM, custos musei acad. Holm.: *Diss. de Daphne.* Upsal. 1817. 4. Obs. in act. acad. holm. Plantas suecicas multas ipsi debeo.
*Wilk.* Sam. Gust. WILCKE: *Flora gryphica.* Gryph. 1765. 8.
*W.* Christ. Lud. WILLDENOW, prof. Berolinensis (nat. 1765 † 1812): *Florae berolinensis prodromus.* Berol. 1787. 8. *Tractatus de Achilleis.* Hal. 1789. 8. *Historia Amaranthorum.* Turic. 1790. fol. *Phytographia s. descriptio plantarum rariorum.* Erl. 1794. fol. *Linnaei species plantarum*, tom. 1—5. Berol. 1797—1818. 8. *Enumeratio plantarum horti berolinensis*, 1. 2. Berol. 1809. 8. *Supplementum* posthumum adidit Schlechtendal. *Berlinische Baumzucht*, ed. 2. Berl. 1811. 8. Obs. in Usteri's Magazin, in neuen Schriften berl. Gesellsch. naturf. Freunde, in Berl. Magazin, in act. acad. berolin., monach., erford.
*Willem.* Petr. Remig. WILLEMET, insulas Mascarenas peragravit, obiit in India orientali 1790 (nat. 1762): *Herbarium Mauritianum*, quod ad Millinum miserat, edidit Usteri in Ann. 18.
— Remig. WILLEMET, prioris pater, medicus Nancianus († 1807): *Flore de l'ancienne Lorraine.* vol. 1—3. Nancy 1805. 8.
*Willich.* Christ. Lud. WILLICH, medicus Clausthal. († 1776.) Observationes botanicae, recusae in Reichard sylloge opusculorum botanicorum. Francof. 1782. 8.
*Wint.* Jo. Jos. WINTERL, prof. Pestinensis († 1789): *Index horti botanici.* Pestini. 1788. 8. (Cum tabulis 25, sed haud absolutus.)
*With.* Gul. WITHERING, medicus Birmingham. (nat. 1741 † 1799): *A systematical arrangement of british plants*, ed. 5. vol. 1—4. Birmingh. 1812. 8.
*Wohlleb.* Jo. Frid. WOHLLEBEN, M. D.: *Supplementum ad Leysseri floram halensem.* Hal. 1796. 8.
*Woods.* Jos. WOODS Rosas britannicas illustravit in Transact. soc. Linn. 12.
*Woodw.* Thom. Jenkinson WOODWARD: Obs. in Philos. transact. 74. et in Transact. soc. Linn.
*Wormsk.* Martin. WORMSKIOLD, centurionis legatus, Norvegiam 1807, tum Grönlandiam 1812—1815 invisit, dein Kotzebueum in περίπλῳ 1816 comitatus, in Camtschatca biennium commoratus, redux ingentem plantarum numerum reportavit, quas et Hornemannus et Lyngbyus illustrarunt.
*Wrang.* Frid. Ant. A WRANGEL: Obs. in act. acad. holm. 1823.

*Wred.* J. C. L. WREDOW, verbi divini minister Parum Megapol. (nat. 1778 † 1823): *Oekonomisch-technische Flora Mekklenburgs.* Th. 1. 2. Lüneb. 1811. 1812. 8.
*Wright.* Gul. WRIGHT: Obs. in plantas jamaicenses, in Lond. medic. Journ. 8., in Usteri Mag. 4. 7. et in Philos. transact. 67.
*Wulf.* Fr. Xaver. WULFEN, abbas Clagenfurt in Carinthia († 1804). Obs. in Jacquini miscell. et collect., tum et in Römeri Archiv. 3.

*Young.* Thom. YOUNG, medicus: Obs. in Transact. soc. Linn. 3.

*Zanon.* Jac. ZANONI, prof. Bononiensis (nat. 1615 † 1682): *Istoria botanica*, ed. Monti. Bonon. 1742. fol.
*Zanted.* Aug. ZANTEDESCHI, medicus in Bovegno Brixian.: Obs. in comment. acad. Brixianae, 1813 — 1814. 1818. et in Brugnatelli diario physico.
*Zea.* . . ZEA, prof. Matrit.: Obs. in act. acad. Matrit. 1806.
*Zuccagn.* Attil. ZUCCAGNI, praefectus horti botan. Florent.: *Centuria* 1. *observationum botanicarum.* Flor. 1806. 4. Recus. in Römeri collectan. Turic. 1809. 4.
*Zuccar.* J. G. ZUCCARINI, prof. Monachiensis: Obs. in act. acad. Monach.

# INDEX GENERUM.

Nomina literis obliquis expreſſa ſynonyma ſunt.


## A.

Abelia R. Br. 225. 259.
Ablania Aubl. 210.
Abroma Jacqu. 295.
*Abronia* Hook. 65.
Acacia W. 261-262.
*Acacia* W. et al. 165.
Acaena 19. 556.
Acalypha 515.
Acer 150.
Achillea 505.
Achyranthes 102-102. 541.
*Achyranthes* L. et Coll. 102. 106.
*Achyronia* * 271. 287.
Aconitum 211.
*Acronodia* Blum. 145. 149.
Acroſtichum 520.
*Acroſtichum* Thuar. 520.
Acrozus * 145. 149.
*Adenanthera* Kunth. 165.
*Adenocalyx* Berter. 169.
Adenocarpus Cand. 275.
Adenogramma Reichenb. 541.
*Adenophora* Fiſch. 77.
*Adina* Salisb. 80.
Adonis 217-218.
Adriana Gaudich. 516-517.
*Aegiceras* Gärtn. 254.
Aeſchynanthus Jack. 225. 258.
*Aeſchynomene* Ort. et Jack. 275. 294.
Aetheilema R. Br. 256.
Afzelia Sm. 170.
Agaricus 552-555.
*Agati* Rheed. 284.
Aglaia Lour. 85. 246. 250.
Agrimonia 190.
Agroſtis 51. 557.
Aïdelus * 11. 17.
Aira 52.
Aiuga 226.
Aïzoon 195.
Alamania Laxarſ. 506. 509.
Alchemilla 45.
Alchornea Sw. 251.
Alectorolophus M. B. 252.
*Alegria* Seſſ. 201. 205. 296.
*Aleurites* W. 262.
Aliſma 144.
Allium 152.
Alopecurus 50.
Alphitomorpha Wallr. 552.
Alpinia 8.
Alſodea Thuar. 99.
Alſtonia R. Br. 65.
Alſtrömeria 155.
*Alternanthera* Don. et Kunth. 103. 106. 107.
Alyſſum 259.
Alyxia Banks 109.
*Amajoua* Aubl. 159. 542.
Amarantus 122.
Amaria Seb. Mut. 247. 254.
Amaryllis 152-155.
*Amaryllis* Lindl. et Sims. 155.
Amerimnum P. Br. 268.
Amicia Kunth. 264. 294.
Ammannia 45.
*Ammobium* R. Br. 500.
*Amomum* Kön. 7.
*Ampelopſis* Blum. 90.
Amphilochia Mart. 4. 10.
Amphinomia Cand. 247. 255.
Amphirrhox * 51. 99.
*Amphymenium* Kunth. 268.
Amyris 148-149.
Anacardium 156.
Anagallis 559.
Anagyris 170.
Anatherum P. B. 55.
*Anchietea Hilar.* 51. 98.

Anchuſa 55. 559.
*Anchuſa* Stev. 559.
*Anciſtrum* Thuar. 19.
Andira Leſchen. 269.
Androcymbium W. 141. 142.
Andromeda 159.
Andropogon 22. 55. 557.
*Andropogon* Humb. et al. 557.
Androſace 57.
*Aneilema* Hook. et Don. 25.
Anemone 220-221.
Angelica 121.
Angelonia Humb. 255.
Anguillaria R. Br. 142.
*Anguillaria* * 141. 142.
Aniſomeles R. Br. 226.
Aniſopogon R. Br. 556.
*Anneſorrhiza* Schlecht. 118.
Anona 216.
*Anona* Radd. et Spr. 214.
Anthericum 155.
Antheſteria 557.
Anthoſpermum 558.
Anthyllis 266.
Aotus Sm. 175.
Apargia Scop. 505.
*Apatelia* Cand. 210. 211. 295.
Aphanamixis Blum. 246. 251.
*Aphananthe* Link. 122.
*Aphanoſtemma* Hilar. 219.
Aphelandra R. Br. 256.
*Aplophylla* Adr. Juſſ. 165.
*Aquilicia* Gärtn. 70.
Arabis 242.
Aralia 125.
*Araucaria* R. Br. 515.
*Arbutus* Forſt. et Mill. 158. 545.
Archytea Mart. 295. 296.
Arctotis 504.
Ardiſia Sw. 67-68.
Arenaria 181-182.
*Arenaria* Fiſch. 184.
Argophyllum Forſt. 100.
Argoſtemma Wallich. 50. 81-82.
Ariſtida 51.
Ariſtolochia 510.
Armeria W. 127.
Arnica 302.
Aromadendron Blum. 202. 217.
Artemiſia 500.
*Arthroſtemma* Don. 161.
Arum 511. 547.
Aſaphes * 222. 252.
Aſcium Schreb. 207.
Aſclepias 110. 541.
Aſpalathus 267-268.
*Aſpalathus* Burm. et Don. 171. 271.
Aſparagus 156.
Aſperula 59.
Aſpidiſtra Ker. 152.
Aſpidium Sw. 520.
Aſpidoſperma Mart. 49. 58.
Aſtephanus R. Br. 112.
Aſter 501.
*Aſteriſcium* Chamiſſ. 116.
Aſterocephalus Vaill. 58.
Aſtilbe Don. 145. 155.
Aſtragalus 288.
Aſtranthus Lour. 145.
*Aſtrolobium* Desv. 294.
Athamanta 119-120.
*Athamanta* Don. 119.
*Auguſta* Leandr. 501.
Avena 55.
*Aylmeria* Mart. 102. 105.


## B.


*Baccharis* Trevir. 501.
*Bactyrilobium* Schrad. 166.
Bäckea 149.
Baeobotrys Forſt. 83-84.
Ballota 227.
*Balſamina* Hook. 99.
Balſamita Desf. 500.
*Banffya* Baumg. 53. 114. 179.
Bangia Lyngb. 552.
Bankſia L. fil. 47.
Baphia Afz. 158. 175.
Baptiſia Vent. 171.
*Barbiera* Cand. 282.
Barbula Hedw. 325.
*Bartlingia* Reichenb. 60. 79.
Bartramia Hedw. 525.
Bartſia 258.
*Bartſia* Mx. et L. 252.
Baſſia Kön. 189.
Bauera Andr. 209.
Bauhinia 166.
Beaumontia Wallich. 49. 65.
Begonia 211-215.
Bellium 303.
*Ben-tiru-tali* Rheed. 62.
Berberis 158.
Bergia 184.
*Berula* Koch. 120.
Besleria 258.
Betonica 227.
Beureria Jacqu. 66.
Bidens 299.
Bignonia 257.
Biſcutella 259.


Rh 2

*Conium* Berg. 118.
Connarus L. Cand. 254.
*Connarus* L. et al. 255.
Conobea Aubl. 252.
*Conohoria* Hilar. 99.
*Conoria* Kunth. 99.
Conospermum Sm. 46.
Convallaria 156.
Convolvulus 60-62.
*Convolvulus* Wallich. 65.
Conyza 501.
*Cookia* Blum. 161. 162.
Copaifera 176-177.
*Copaiva* Jacqu. 177.
Corallophyllum Kunth. 145. 147.
Cordia 66.
Cordyla Lour. 247. 262.
Cornus 44.
*Correia* Vand. 162.
Corrigiola 124.
Corydalis Dillen. 264.
Corynandra Schrad. 201. 204.
*Corynella* Cand. 263. 280.
Corynitis * 265. 280.
Costus 7-8.
Cotyledon 188.
*Coulteria* Kunth. 169.
Couma Aubl. 49. 58.
*Couraturi* Aubl. 208.
*Coursetia* Cand. 283.
Coutoubea Aubl. 538.
Cowania Don. 192. 197.
Crambe 546.
*Craniolaria* Nees. et Mart. 258.
*Crataegus* Link. 196.
Crenias * 246. 247.
Crepis 504.
*Crepis* Gusson. et Forsk. 504. 505.
Crinum 153-154.
*Critamus* Koch. et Bess. 119. 120.
Crocus 23.
Crotalaria 275-277.
*Crotalaria* Cand. et al. 266. 267. 286.
Croton 262.
*Croton* L. 514.
Crozophora Neck. 514.
Crumenaria Mart. 51. 102.
Cryptandra Sm. 65.
Cryptolobus * 272.
Cubaea Scop. 170.
Cucullaria Schreb. 4. 9.
*Cuncea* Hamilt. 40.
Cunila 16.
*Cunila* Hook. et W. 224. 226.
Cupania 149.
Cuphea P. Br. 190.
Curatella 209.
Curculigo Gärtn. 154.
Curcuma 7.
*Curtia* Schlechtend. 60.
Cuscuta 114.
*Cuspa* Humb. 99.
*Cyamopsis* Cand. 280.
*Cyanotis* Don. 158.
Cyathea Sw. 520.
*Cyathodes* Chamiss. 67.
*Cybbanthera* Hamilt. 254.
Cyclopia Vent. 171.
*Cydonia* Hamilt. 196.
Cylista Ait. 269.
*Cymation* * 130. 141. 142. 145.
Cymbidium Sw. 507.
Cymbopogon * 557.
*Cyminosma* Gärtn. et Cand. 148.
Cynanchum 110.
Cynoglossum 55.
Cynomorium 556.
*Cynosurus* Hort. berol. 56.
Cyperus 28-29.
Cypripedium 510.
Cyrtandra Forst. 14-15.
Cyrtanthus Ait. 154.
Cyrtocarpa Kunth. 157 161.
Cyrtopodium R. Br. 508.
Cytinus 145. 246.
Cytisus 272.
*Cytisus* Lois. 279.

D.

Dalbergia L. fil. 268-269.
*Dalbergia* Pers. et Hook. 170. 275.
Dalea 294-295.
Danthonia Cand. 54.
Daphne 152. 545.
*Daphne* Radd. 152.
*Darlingtonia* Cand. 262.
*Daubentonia* Cand. 275.
Daucus 119.
Davilla Vand. 201. 209.
Daviesia Sm. 174.
*Daviesia* Sieb. et Sm. 172. 175.
Dawsonia R. Br. 521.
Deguelia Aubl. 269.
*Dejanira* Schlechtend. 41.
Delilia * 505.
Delima 208.
Delphinium 211.
Dendrobium Sw. 509.
*Dendrobium* Hook. 510.
*Depazea* Fr. 552.

*Deschampsia* R. Br. 52.
Desmanthus W. 165.
Desmochaeta Cand. 105.
*Desmochaeta* Cand. 102.
*Desmodium* Cand. et Lindl. 290-295.
Detarium Juss. 158. 177.
Deyeuxia Clarion. 50.
*Deyeuxia* * 556.
Dianthus 179.
*Dicerma* Cand. 289. 290.
Dichilos Cand. 265. 275.
*Dichonema* Fr. Nees. 552.
Diclidanthera Mart. 546.
Dicliptera Juss. 19.
*Dicliptera* Nees. 257.
*Diclytra* Don. 265.
Dicorypha Thuar. 47.
Dicranum Hedw. 522.
Dictyoloma Adr. Juss. 51. 94.
*Didymocarpus* Jack. et al. 15-15. 223. 258.
Didymochiton Blum. 247. 255.
Didymodon Hedw. 525.
Digitalis 254.
Dillenia 202.
*Dillenia* Roxb. 215.
Dillwynia Sm. 174-175.
*Dillwynia* Sieb. 174.
*Dimereza* Labill. 146. 150.
*Dioclea* Kunth. et Cand. 283
Dioscorea 145.
Diospyros 146-147.
*Diphaca* Lour. 170.
*Diplocomium* Funck. 524.
Diplopetalon * 146. 150.
Diplophractum Desf. 205.
Dipsacus 57-58.
*Disandra* L. 65. 145.
*Discocapnos* Schlechtend. 264.
*Disemma* Labill. 250.
*Disporum* Don. 156.
Ditassa R. Br. 52. 111.
Ditmaria * 4. 8.
Dodecatheon 56.
Dodonaea 152.
*Dolichonemia* Nees. 170.
Dolichos 280.
*Dolichos* L. et al. 270. 281. 282. 283.
Dombeya Cav. 256.
*Dombeya* Lamb. 515.
*Donax* Lour. 6.
Draba 240.
Dracaena 136.
Drimys 215.
Drosera 126.
Drymaria W. 124.
*Dufourea* Hilar. et Nees. 10. 528.
Dulongia Kunth. 55. 114.
Dumasia Cand. 265. 279.
*Dumerilia* Lag. et Cand. 297. 501.
*Dupontia* R. Br. 52.
*Duvalia* Nees. 526.
*Duvaua* Kunth. 148.
*Dysoxylon* Blum. 252.

E.

*Ecastaphyllum* Rich. 268.
Eccremocarpus R. et P. 257.
Echinocarpus Blum. 201. 204.
Echites 64.
*Echites* Roxb. et Labill. 65.
Echium 54.
Edwardsia Salisb. 172.
*Ehrenbergia* Spr. et Mart. 542. 543.
Ehretia 66.
Elaeagnus 47.
Elaeocarpus 189.
*Elaphrium* Kunth. 148-149.
*Eleiotis* Cand. 269.
*Eleocharis* Don. et Nees. 47.
Eleusine Gärtn. 56.
*Elodea* Humb. et Rich. 25.
Elvasia Cand. 145.
Elymus 54.
Embelia Burm. 50. 69.
Empedoclea Hilar. 201. 205.
Encyanthus Lour. 157. 158.
*Enkianthus* Lour. 157.
Entada Adans. 164.
Entelea R. Br. 201. 204.
Epacris Forst. 64.
*Epicharis* Blum. 251.
Epidendrum 309.
Epilobium 151.
Eranthemum R. Br. 19.
*Eria* Lindl. 310.
Erica 146. 542.
Erineum Pers. 535.
*Eriodendron* Blum. et Mart. 259.
Eriostemon Sm. 157. 164.
*Eriostemon* Spr. et al. 164. 189.
*Erisma* Mart. 9.
Ernodea Sw. 40.
Erodium Herit. 249.
*Erucastrum* Presl. 244.
Ervum 546.
Eryngium 115.
Erysimum 242. 245.

Erythraea Rich. 57.
Erythrina 278.
*Erythrina* Roxb. 291.
*Erythrostictus* Schlechtend. 142.
Escallonia Mut. 94.
*Esenbeckia* Kunth. et Blum. 126. 257.
Eucalyptus Herit. 195.
*Eugenia* Mart. et Coll. 195.
Eulophia R. Br. 507.
Euphorbia 511.
Euphrasia 252.
Euphronia Mart. 246. 251.
*Eurotium* Grev. 552.
Eurycoma Jack. 55. 125.
Euthemis Jack. 51. 92.
Eutrema R. Br. 259.
*Evodia* Labill. 45.
Evolvulus 115.
Evonymus 92-95.
Exacum 41. 538.
*Eysenhardtia* Kunth. 268.

F.

Fabiana R. et P. 49. 62.
*Fagelia* Neck. 276.
*Fagraea* Wallich. et al. 71.
Farsetia Turr. 240.
Fedia Mönch. 25.
*Ferula* Tenor. 122.
*Festuca* 56.
Feuillaea 250.
Fimbristylis Vahl. 26.
Flacourtia Commers. 208-209.
Frankenia 141.
*Freylinia* Coll. 66.
Fritillaria 155.
*Frullania* Radd. 524.
Fuchsia 151.
Fumaria 264.
Funaria Hedw. 524.

G.

Galactia P. Br. 282-285.
*Galactia* Pers. 282.
Galega 286.
*Galega* Thunb. et Jacqu. 171. 278.
*Galenia* * 122.
Galeopsis 228.
Galipea Aubl. 55. 91.
Galium 59. 538.
*Galvania* Velloz. 79.
Garcinia 189.
Gardenia 84-85.
Gardneria Wallich. 40.
Gardoquia R. et P. 225.
Gastonia Roxb. 125.
Gaultheria 159. 545.
*Gaultheria* * 160.
*Gay-Lussacia* Schlechtend. 160.
Geeria Blum. 202. 215.
Geissoïs Labill. 158. 177.
Geniostoma Forst. 59.
*Genista* Burm. et al. 171. 266.
Gentiana 52. 112-115.
Geophila Don. 50. 82.
Geranium 255.
*Geranium* Boccon. et Bivon. 249.
Gesnera 258.
*Geum* Pursh. et Langsd. 189. 545.
Gilliesia Lindl. 22. 24.
Gladiolus 25.
Glaucium Tournef. 205.
*Glechoma* Roxb. 225.
Glechon * 222. 227.
Globba 8.
Gloriosa 155.
*Glossocomia* Don. 78.
Glossarrhen Mart. 99.
*Glottidium* Desv. 287.
Gloxinia Herit. 259.
Glycine 269-270.
*Glycine* W. 278.
Glycosmis Corr. 161-162.
Glyphis Ach. 527.
Gnaphalium 300.
Gnidia 152.
Godoya R. et P. 158. 201. 206.
Gomphia Schreb. 162-165.
Gompholobium Sm. 172-175.
*Gompholobium* Bonpl. et Sm. 175.
Gomphrena 104-106.
*Gomphrena* Vahl. et al. 106-108
Gongora R. et P. 505. 507-508
Goniocarpus Thunb. 48.
*Goniocheton* Blum. 252.
Gonolobus Mx. 110.
Gonyanthes Blum. 506. 510.
Goodenia Sm. 76.
Goodia Salisb. 267.
*Goodia* Cand. 272.
Gordonia 260.
Gossypium 257.
Gouania 101-102.
*Goussia* Cand. 114. 181.
*Grahamia* Hook. 297. 299.
Grahamia * 297. 299.
Gratiola 15.
*Gratiola* Rottl. et Sw. 14. 17.

Grevillea R. Br. 46.
Grewia 205.
*Griffinia* Lindl. 155.
Grimmia Hedw. 521.
*Guajacum* L. 254.
Guarea 251.
Guatteria R. et P. 214-215.
Guilandina 165.
Guilleminea Kunth. 52. 105.
Gymnoſtomum Hedw. 521.
*Gynandropſis* Blum. 158.
Gynoſtemma Blum. 240. 251.
Gypſophila 178-179.
*Gyrophora* Kunth. 527.

## H.

*Habranthus* Herb. 155.
*Haemocharis* Mart. 260.
Haemodorum Sm. 24.
*Hänkea* R. et P. 88.
*Hagenbachia* Nees. 24.
Hakea Schrad. 46.
Haleſia 256.
Halimodendron Cand. 265. 280.
Hallia Thunb. 265. 269.
*Hallia* W. 266.
Hamamelis 47.
Hamiltonia W. 109.
*Hamiltonia* Don. et Roxb. 75. 159.
Harpullia Roxb. 51. 92.
Harriſonia Adanſ. 521.
Haſſeltia Kunth. 201. 204.
*Hebanthe* Mart. 103. 104.
*Hecaſtophyllum* Kunth. 268.
Hedera 102.
Hedychium Kön. 6-7.
*Hedycrea* Schreb. 108.
Hedyotis 40.
Hedyſarum 290-295.
*Hedyſarum* L. al. 267. 275. 279.
Helianthemum Tournef. 207.
Heliconia 109.
Helicteres 256.
Heliophila 244.
Heliotropium 53-54.
*Heliotropium* Lehm. 66.
Hellenia W. 8.
Helminthia Juſſ. 505.
*Heloſciadium* Koch. 119. 120.
*Helxine* Requien. 518.
Hemerocallis 155.
*Hemerocallis* Thunb. 154.
Hemianthus Nutt. 11. 17.
Hemiphragma Wallich. 222.
Henckelia * 11. 15. 14.
Heracleum 121.
*Hermannia* L. 255.
Hermas 118.
*Hermeſia* Humb. et Bpl. 148. 165. 191. 252.
Herpeſtes Gärtn. 254.
*Herpeſtes* Purſh. 17.
*Heſperis* Viv. 242. 245.
*Heſſea* Berg. 154.
*Heteromorpha* Schlechtend. 117.
Heurnia R. Br. 52.
Heylandia Cand. 265. 266-267.
Heynea Roxb. 252.
Hibbertia Saliſb. 211.
Hibiſcus 258.
Hieracium 504.
Hierochloë Gmel. 52.
*Hippeaſtrum* Herb. 155.
Hippion * 58. 60. 540.
Hippuris 10.
*Hirſchfeldtia* Presl. 244.
Hirtella 86. 541.
Hollböllia Wallich. 542.
*Holoregmia* Nees. 258.
Holoſteum 57.
Homalium Jack. 210.
Hookeria Sm. 524.
Hoplotheca Nutt. 52. 107.
*Horkelia* Schlechtend. 541.
Hornſchuchia Nees. 151. 144.
Hortia Vand. 61. 91. 94.
Houſtonia 41.
Hovea R. Br. 267.
Hovenia Thunb. 88.
Hoya R. Br. 110.
*Humirium* Mart. 545.
Hunteria Roxb. 50. 69.
*Hura* Kön. 8.
Hutchinſia R. Br. 240.
Hydnocarpus Vahl. 93-94.
Hydnum 554.
Hydrangea 178.
*Hydranthelium* Kunth. 26.
Hydraſtis 202. 220.
Hydrocotyle 116.
Hydrolea 114.
Hygrophila R. Br. 257.
Hymenaea 170.
*Hymenodictyon* Wallich. 78.
Hymenophyllum Sm. 520.
Hymenopogon Wallich. 50. 74.
Hymenoſpron * 264. 285.
*Hymenoſtomum* * 521.
*Hymenothecium* Lag. 52.
Hyperieum 296-297.
Hypnum 524.
*Hypochaus* Fr. 555.

Hypochoeris 505.
Hypoxis 154.
Hyptis Jacqu. 229.
Hyssopus 227.

I.

*Jackia* Wallich. et Blum. 50. 81. 265.
Jacksonia R. Br. 175.
Jambolifera 148.
Jasminum 11-12.
Iberis 240.
Icacina Adr. Juss. 61. 91.
*Ioica* Kunth. 148.
Ilex 48.
*Ilex* Nees. 88. 89.
Illecebrum 105.
*Illecebrum* W. et Spr. 105. 106. 107.
Impatiens 99-100.
Imperatoria 121.
*Incarvillea* Roxb. 257. 258.
Indigofera 284-286.
*Indigofera* Mut. 270.
Inga 261.
*Inga* W. et Cand. 254.
Inula 501.
*Ionidium* Hilar. et Mart. 97. 98.
*Ipomoea* Sims et al. 60-62.
Iresine 103-104.
*Iresine* * 107.
Iris 24.
*Irlbachia* 540.
*Isolepis* Don. et Carmich. 27. 28.
*Isotoma* Lindl. 75.
Itea 94.
Juncus 157-158.
Jungermannia 524-526.
Jungia 501.
Jussieva 152.
Justicia 18-19.
Ixodia R. Br. 500.

K.

Kämpfera 7.
Kennedia Vent. 289.
*Kielmeyera* Mart. 207.
*Kieseria* Nees. 207.
Kölera Pers. 55.
Königia 37.
Kolbea Schlechtend. 130. 142.
*Koniga* R. Br. 239. 240.
Kuhlia Kunth. 201. 208.

L.

Labatia Sw. 42.
Labichea Gaudich. 11. 12.
Lacis Schreb. 146. 210.
Lacistema Sw. 11. 21.
Lagetta Juss. 152.
Lamium 228-229.
*Langsdorffia* Leandr. 125.
*Lanipila* Burch. 505.
Lansium Rumpf. 252.
*Lantana* Link. et Ott. 251.
*Lasiospermum* Trevir. 505.
Lathyrus 283-284.
Laurus 155-156.
*Laurus* Bot. mag. et Nees. 156.
Lavradia Vand. 95.
Lebeckia Thunb. 273.
Lecananthus Jack. 50. 74.
*Lecanora* Radd. 530.
Lecidea Ach. 527.
Lecythis 208.
Leea 70.
Lemanea Bory. 531.
Leonia R. et P. 540.
Leontodon 504.
*Lepia* Presl. 240.
Lepidagathis W. 257.
Lepidium 240.
Lepidosperma Labill. 26.
*Leptocarpus* Nees. et Link. 57. 251.
Leptodermis Wallich. 130. 139.
Leptomeria R. Br. 109.
Leptospermum Forst. 194.
*Leptospermum* Labill. 149.
Lepyrodia R. Br. 56.
Lespedezia Mx. 271.
*Lespedezia* Pers. 267.
Lessertia Cand. 278.
Leucas R. Br. 230.
Leucogramme Meyer. 526. 527.
Leucoïum 152.
*Leucopogon* Sieb. et Mal. misc. 67.
Leycesteria Wallich. 50. 85.
Liatris Gärtn. 298.
Licania Aubl. 62. 108.
*Lichen* Engl. bot. 528.
*Lichtensteinia* Schlechtend. et W. 118. 119. 142. 143.
Ligusticum 120-121.
*Ligusticum* Chamiss. et Spr. 119.
Ligustrum 12.
Lilium 154-155. 542.
Limodorum 506.
*Limodorum* Labill. 509.

Limonia 162.
Linaria * 16. 254.
Lindernia 252.
*Lindleya* Nees. 260.
Linociera Sw. 12.
Linum 127-128.
Liparia 284.
Lippia 251.
*Liriodendron* L. 217.
Lisianthus P. Br. 59. 339-340.
*Lithospermum* Roxb. 66.
Loasa Adans. 208.
Lobelia 75-76.
*Lobularia* Desv. 259.
Löflingia 336.
Logania R. Br. 59.
Lomaria W. 320.
*Lonchocarpus* Kunth. et Cand. 268-269.
Lonicera 82-83.
Lopezia Cav. 8.
Loranthus 139-140.
*Lotus* Lag. et al. 266. 270. 271. 284. 287.
*Lourea* Desv. et Cand. 291. 292.
Lühea W. 295. 296.
Lumnitzera Jacqu. 225.
Lupinus 275.
Lussacia * 160.
Luxemburgia Hilar. 146. 150. 201. 206.
Lychnis 185.
Lychnophora Mart. 297. 299.
Lycopsis 339.
Lycurus Humb. 52.
Lyginia R. Br. 26.
Lysimachia 55-56.
Lysinema R. Br. 64.
Lysionotus Don. 11. 14.
Lysiopoma Humb. 76.
Lythrum 191.

## M.

Maba Forst. 159.
*Machaerium* Kunth. 268.
*Macroceratides* Radd. 281.
Macrocnemum 75.
*Macrocnemum* Roxb. 74.
*Macrodon* W. Arnott. 325.
Macromitrion Brid. 322.
Macroscepis Kunth. 110.
*Macrotropis* Cand. 170.
Maerua Forsk. 208.
*Maesa* Don. 83. 84.
Magnolia 216-217. 345.
*Magonia* Hilar. 150.
*Maju* Molin. 170.
Malcolmia R. Br. 245.
*Malocchia* Sav. 280.
Malpighia 179.
Malva 257. 346.
Manettia Mut. 40.
*Mangifera* Desrouss. et Kunth. 161.
*Manglietia* Blum. 217.
Maranta 5-6.
*Marathrum* Humb. 146. 210.
Marchantia 326.
Marialvea Vand. 345.
Mariscus Vahl. 29.
Marrubium 239-240.
*Martia* Leandr. 286.
Martynia 238.
Maschalocarpus * 321-322.
Massonia 152.
*Mastigophorus* Cassin. 301.
Mataxa * 297. 303.
Matthiola R. Br. 242.
Mauria Kunth. 157. 161.
*Maxillaria* Hook. 307.
*Maytenus* Kunth. 89.
Mazus Lour. 254.
*Mecanopsis* Cand. 203.
*Medicago* Cand. 271.
Meesia Hedw. 324.
Megaclinium Lindl. 306. 309.
Melaleuca 295.
*Melanopsidium* Coll. 159.
*Melanosticta* Cand. 169.
Melanthium 142.
*Melanthium* L. et al. 141. 142.
Melastoma 160.
*Melia* Cand. 252.
Melianthus 225.
Melica 52.
*Melidora* Salisb. 158.
Melilotus Tournef. 271.
Melissa 224.
*Melissa* Arduin. 227.
*Melochia* Hilar. et L. 248.
Melodinus Forst. 109.
Meniscosta Blum. 53. 114.
Menispermum 143.
Mentha 227-228.
Merckia Fisch. 53. 124.
Mesembrianthemum 196.
Mespilus 196.
*Mespilus* Don. 196.
*Metrocynia* Thuar. 254.
Metrodorea Hilar. 51. 94.

Metrosideros Gärtn. 194.
Meum Tournef. 119.
Michelia 202. 217. 546.
Micranthera Choif. 201. 208.
Micromelum Blum. 157. 162.
*Microsemma* Labill. 205.
*Microstachys* Hilar. 515.
Microtea Sw. 122.
Miersia Lindl. 150. 157.
*Müllera* L. 505. 505.
Mimosa 147.
*Mimosa* L. et al. 165. 255. 262.
Mimulus 254.
Mirbelia Sm. 175.
Mitreola Rich. 49. 59.
*Mniopsis* Mart. 248.
Mogiphanes Mart. 52. 107.
*Mogorium* Lam. 12.
*Moldenhawera* Schrad. 170.
*Mollia* Mart. 295. 296.
*Molopospermum* Koch. 121.
Momordica 246.
Monarda 16.
Monenteles Labill. 297. 500.
Monnina R. et P. 265.
Monotropa 162.
Montia 57.
*Moquilea* Mart. 541.
Moraea 24.
*Morina* Don. 252.
Morinda 80.
*Mucuna* Cand. 281.
Murraya 162.
*Murucuja* Perf. 250.
Musa 109.
Mussaenda 75.
Mycoporum Meyer. 526.
Myosotis 54.
*Myriadenus* Desv. 289.
Myrica 47-48.
Myriophyllum 514.
Myristica 252.
Myrodendron Schreb. 545.
*Myroxylon* Kunth. et Lamb. 170.
Myrrhis Morif. 120.
Myrsine 68-69.
*Myrsine* Wallich. 69.
Myrtus 195.

## N.

*Napimoga* Aubl. 210.
Narcissus 152.
Nassavia Commerf. 501.
Nasturtium R. Br. 241.
*Nasturtium* Boccon. 241.
Nauclea 80-81.
*Negretia* Kunth. 281.
Neillia Don. 192.
Nemophila Bart. 55.
Nepenthes 256.
*Nepeta* Trevir. 226.
*Nerija* Roxb. 86.
*Nerium* Roxb. 65.
Neuropeltis Wallich. 52. 115.
Nevrocarpon Desv. 264. 28 287.
*Nicolsonia* Cand. 290.
Nicotiana 62.
Nierembergia R. et P. 62.
Nissolia Jacqu. 268.
Noisettia Humb. 51. 98.
*Noisettia* Hilar. 98.
Nolana 67.
Nonatelia Aubl. 81.
Norantea Kunth. 207.
Notelaea Vent. 12.
Notylia Lindl. 505. 308.
*Novella* Rumph. 257.
*Nuttallia* Hook. 259.
*Nyctanthes* Lour. 12.

## O.

Ocellularia Meyer. 526.
*Ochrosia* Labill. 66.
Ocimum 225-224.
Octomeria R. Br. 510.
Odonia Bertol. 265. 279.
Oenanthe 118-119.
*Oenanthe* Nutt. 121.
Oenothera 150-151.
Olax 25.
Oligosporus Caffin. 297. 500.
Olyra 29.
Omphalobium Gärtn. 157. 24 255.
*Omphalobium* Jacqu. fil. 254.
Oncidium Sw. 308.
Oncoma * 11. 18.
Ononis 266. 546.
Onosma 54.
Ophiopogon Ker. 156.
Ophiorrhiza 49. 50. 75.
*Ophiorrhiza* L. 59.
Ophrys 306.
*Opilia* * 86. 250.
Orchis 306.
Oreas Chamiss. 259. 241
Origanum 227.
*Orlaya* Hoffm. 119.

Ormoſia Jackſ. 178.
Ornithogalum 152.
Ornithogloſſum Saliſb. 142–145.
*Ornithopodium* Burm. 295.
Ornithopus 294.
*Ornitrophe* Labill. 150.
Orobus 285.
*Orophea* Blum. 144.
Orthotrichum Hedw. 525.
*Orthotrichum* Hornſch. 522.
Osbeckia 161.
Oſcillatoria Vauch. 552.
*Oſtericum* Beſſ. 121.
Oſtrya Michel. 510.
*Otoptera* Cand. 275.
Oudneya R. Br. 259. 242.
Oxalis 184–188.
*Oxera* Labill. 11. 18.
Oxylobium Andr. 172.
Oxypetalum R. Br. 52. 111–112.

P.

Pachyrrhizos Rich. 264. 281.
*Pachysandra* Hook. 514.
Paederia 70.
Paeonia 211.
*Palava* Kunth. et al. 210. 211.
*Palicourea* Hilar. 79.
Paliurus Lam. 124.
Panax 114.
*Pancovia* W. 145. 170.
Pancratium 152.
Panicum 35–44.
Papaver 205.
*Papaver* Don. 205.
Pappophorum Schreb. 54.
*Parentucellia* Viv. 225. 238.
Parietaria 518.
Parkia R. Br. 247. 253.
Parkinſonia 170.
Parmelia Ach. 528–530.
Parochetus Hamilt. 265. 279.
Paſpalum 50.
Paſſiflora 249–250. 346.
Paſtinaca 121.
Patrinia Juſſ. 58.
*Pauletia* Kunth. 166.
Paullinia 153.
Pedicularis 233–234.
Pelexia Poit. 506.
*Peltidea* Laur. 551.
Peltigera Hoffm. 551.
Pentapetes 256.
*Pentſtemon* Torr. et Nutt. 235.
*Peperomia* Hook. 20. 21.
Pergularia 110.
Perilla 222. 227.
*Periploca* W. et al. 112.
Pernettia Gaudich. 157. 158.
Perrottetia Kunth. 50. 87.
Perſea Gärtn. 156.
Perſoonia Sm. 45.
Petrea 251.
Peucedanum 121.
*Peucedanum* Mönch. et al. 119. 121.
Peziza 555.
Pfaffia Mart. 52. 105. 106–107.
Phaca 287.
Phaeocarpus Mart. 150.
*Phalangium* Lindl. 156.
Phallus 555.
Phaſeolus 281–282.
*Phaylopſis* Bot. mag. 236.
Phebalium Vent. 157. 164.
Phelline Labill. 57. 42.
Philagonia Blum. 57. 43.
Philotheca Rudg. 255.
*Philoxerus* R. Br. 107.
Phlomis 230.
Phrynium W. 4. 6.
Phycella Lindl. 150. 153.
Phylica 108.
*Phyllerium* Fr. 555.
*Phyllodium* Desv. 289.
Phyſalis 72.
Phyſianthus Mart. 52. 112.
*Phyſidium* Schrad. 255.
Phyſoſtemon Mart. 145. 147.
Phyteuma 76.
*Picris* Delil. 505.
Pictetia Cand. 264. 294.
Pilocarpus Vahl. 126.
*Pimpinella* Don. 119.
*Pineda* R. et P. 210.
Pinus 515.
Piper 20–21.
*Piriqueta* Kunth. 124.
Piſcidia Jacqu. 273.
Piſonia 145.
*Piſonia* W. 18.
Piſtacia 516.
Pitcarnia Herit. 151.
Plantago 42.
*Platychilum* Delaun. 267.
Platygramme Meyer. 527.
*Platylobium* Sieb. et al. 272. 274.
Platypetalum R. Br. 259. 241.
*Platyſpermum* Koch. 119.
Plazia R. et P. 501.

*Plectanthera* Mart. 150. 206.
Plectranthus Herit. 224.
*Plectranthus* Don. 223-224.
*Plesa* Reichenb. 142.
Pleurandra Labill. 191.
Pleuraphis Torr. 22. 52.
Pleuropogon R. Br. 22. 51.
*Pleurothallis* Lindl. et Kunth. 508.
Plocama Ait. 50. 79.
Poa 55.
*Poa* R. Br. 36.
*Pocockia* Ser. 271.
Podaliria Lam. 171.
*Podaliria* Mx. et al. 171. 176. 267.
Podolobium R. Br. 172.
*Podolobium* Cand. 172.
*Podoſaemon* Nees. 50.
*Pohlana* Mart. 125.
*Poiretia* Cand. 295.
Poitea Vent. 284.
*Polaniſia* Blum. 159.
*Polemannia* Berg. 155.
Pollinia * 537.
Polycarpon 57.
Polygala 265.
Polygonum 154-155.
Polypodium 520.
Polypogon Deſf. 50.
*Polyporus* Fr. Nees. et Blum. 555.
Polytrichum 525.
Pomaderris Labill. 89.
Porana Burm. 62.
Porpa Blum. 201. 204.
*Poſoqueria* Wallich. et Roxb. 84.
Potalia Aubl. 543.
Potamogeton 48-49.
Potentilla 198-199. 544.
Pothos 510-511.
Poupartia Commerſ. 158. 188.
Pozoa Lag. 116.
*Prangos* Lindl. 119.
*Pratia* Gaudich. 76.
Prenanthes 504.
Prepuſa Mart. 542.
Preslea Mart. 538-539.
Prieſtleya Cand. 264. 284.
Primula 56-67.
Proſopis 165.
Proſtanthera Labill. 226.
Prunus 192.
Pſeudanthus Sieb. 22. 25.
Pſidium 194.
Pſilobium Jack. 50. 74.
*Pſophocarpus* Neck. 280.
Pſoralea 270-271.
*Pſoralea* Poir. 295.
Pſychotria 78-79.
*Pſychotria* L. 82.
Pſyllocarpus Mart. 57. 58-59.
*Pteris* Thuar. 520.
*Pterisanthes* Blum. 44.
Pterocarpus Löfl. 268.
Pteroneuron Cand. 241.
Pteroſpermum Schreb. 256.
*Pteroſpermum* Blum. 256.
Pueraria Cand. 265. 275.
Pulmonaria 54.
Pultenaea Sm. 173-174.
*Pultenaea* Sieb. 172. 174. 175.
*Pupalia* Mart. 105.
Pycnoſtachys Hook. 222. 227.
Pygeum Gärtn. 192. 195.
Pyrethrum Sm. 505.
Pyrus 196. 545.
*Pyrus* Don. 196.

## Q.

Qualea Aubl. 4. 9-10.
*Qualea* Link. et Spr. 9. 10.
Quaſſia 163.
Quercus 514.

## R.

*Raddia* Bertol. 29.
*Radia* Ach. Rich. 296.
Rafnia Thunb. 274.
*Rafnia* Mart. 269.
*Randia* Roxb. et Don. 74. 84.
Ranunculus 218-220.
Raphanus 239.
*Raputia* Aubl. 91.
Rauwolfia 109.
*Redowskia* Chamiſſ. et Schlechtend. 240.
*Requienia* Cand. 267.
Reſtio 26.
*Reſtio* Nees. et R. Br. 26. 56.
*Retinaria* Gärtn. 102.
*Rex amaroris* Rumph. 141.
Rhabdia Mart. 540.
*Rhacodium* Rebent. 554.
Rhamnus 86.
*Rhamnus* Burm. 87.
Rheum 156.
Rhexia 160-161.
Rhinanthus M. B. 252.

*Rhinocarpus* Berter. 156.
*Rhodiola* Don. 188.
Rhododendron 160.
Rhodonema Martens. 331. 332.
Rhus 125.
*Rhus* Burm. 255.
*Rhynchosia* Cand. 270.
Rhynchospora Vahl. 26.
Ribes 100 - 101.
Richardia 159.
*Riedlea* Cand. et Blum. 248.
*Riveria* Kunth. 269.
Rivina 45.
Robergia Schreb. 188.
*Robergia* W. 254.
Robinia 279.
*Robinia* Poir. et al. 149. 176. 205. 268. 274. 279. 280. 293. 294.
*Röperia* Adr. Juss. 164.
Rollinia Hilar. 202. 214.
Rondeletia 74 - 75.
Rosa 199 - 200.
*Rosea* Mart. 105.
*Rourea* Kunth. et Aubl. 188. 254.
Rubia 59.
Rubus 197. 343 - 344.
Rudolphia W. 278.
Ruellia 256.
Rumex 144.
Ruppia 49.
*Russula* Pers. 333.
Ruta 163 - 164.

## S.

Sabbatia Adans. 58.
*Sabbatia* * 58. 60.
Sabia Colebr. 91.
Sabinea Cand. 265. 279.
Saccharum 53.
Sagittaria 214.
Salix 20.
Salomonia Lour. 4. 246. 248.
Salvia 17.
*Sampacu* Rumph. 217.
Samyda 176.
Sanicula 116.
*Saponaria* Schlechtend. 178.
*Sarcanthus* Lindl. 306.
Sarcocarpon Blum. 202. 217.
Sarcophyllum Thunb. 274.
Sarcopyramis Wallich. 342 - 343.
Sarmienta R. et P. 336.
Sauravia W. 202. 210 - 211.
Sauvagesia 95.
*Sauvagesia* Hilar. 95.
Saxifraga 178.
Scabiosa Vaill. 58.
*Scabiosa* Viv. et al. 58.
Scaevola 81.
Scandix 120.
*Schelveria* Nees. 255.
*Schizaea* Chamiss. 180.
*Schima* Reinw. 260.
Schinus 179.
*Schinus* Orteg. 148.
Schizaea Sm. 320.
Schizanthus R. et P. 14.
Schizochiton * 246. 251.
Schlechtendalia * 295. 296.
Schmidelia Schreb. 150.
*Schnellia* Radd. 166.
Schöpfia Schreb. 78.
Schotia Jacqu. 157. 247. 254.
*Schubertia* Mart. 110.
*Schübleria* Mart. 340.
*Schultesia* Mart. 338.
*Schweiggeria* Spr. et Hilar. [illegible]
Schwenckia 15.
Schwenkfeldia Sw. 85.
Scilla 155.
Scirpus 27 - 28.
*Sciuris* Schreb. et al. 12. 14. [illegible]
Scleria Berg. 315.
Sclerodontium Schwägr. [illegible]
*Sclerostylis* Blum. 161. 162.
Scopolia Sm. 91.
Scorzonera 347.
Scutellaria 225 - 226.
Sebaea R. Br. 41. 338.
*Sebastiania* Bertol. 304.
Sedum 188.
Selinum 121.
*Selinum* Schum. et Bess. 128. [illegible]
Sempervivum 191.
Senecio 302. 346.
Seriana Blum. 155.
*Sertürnera* Mart. 106. 107.
Sesbania Poir. 284.
*Sesbania* Kunth. 285.
Seseli 118.
*Seseli* Koch. 119.
Sesleria Scop. 54.
Setaria P. B. 53.
Sibbaldia 341.
Sibthorpia 49. 65. 225. [illegible]
Sida 259.
Sideroxylon 70.
Sieversia W. 199. 344.
*Silaus* Bess. 118.
Silene 182 - 185.

*Simaba* Don. 165.
*Simaruba* Hilar. 165.
Sinapis 244.
*Sinapis* Presl. 245.
Sinningia Nees. 225. 258.
Sison 118.
Sisymbrium 245.
*Sisymbrium* Monnard. 242.
Sium 120.
Smilax 157.
*Sodada* Delil. et Forsk. 145. 147. 204.
Solanum 71-72.
Solea * 97-98.
*Solulus* Rumph. 170.
Sonerila Roxb. 22. 25.
Sophora 170.
*Sophora* Burch. et al. 171. 172. 176. 262.
Sopubia Hamilt. 222. 255.
Soulamea Lam. 150. 141. 265.
Spartina Schreb. 51.
Spartium 166.
Spathodea P. B. 237.
*Spathularia* Hilar. 99.
*Spergula* L. 182. 185.
Spermacoce 40.
Spermadictyon Roxb. 75.
Sphaeria Hall. 552.
Sphaerocarya Wallich. 51. 101.
Sphaerophoron Pers. 551.
*Sphaerophysa* Cand. 278.
Sphaerostema Blum. 247. 261.
Spigelia 58-59. 559.
Spiraea 195.
Spixia Leandr. 317.
Stachys 229.
Stachytarpheta Vahl. 16.
Stackhousia Labill. 124.
*Stalagmites* Murr. 189.
Staphylea 124.
Statice 126-127.
Stelis Sw. 508.
Stemodia 255.
Stenarrhena Don. 222. 225.
*Stenomesson* Herb. 152.
*Stephania* W. et Cand. 159.
Sterculia 256.
Steriphoma * 150. 159.
Sticta Schreb. 550-551.
Stipa 50-51.
*Stipa* Nees et Müll. 55. 557.
Stizolobium P. Br. 281.
*Stizolobium* * 281.
Streptopus Mx. 156.
Strumaria Jacqu. 154.
Strychnos 71.
Stylocoryna Cav. 50. 85.
Stylophorus Nutt. 203.
Stylosanthes Sw. 289.
Styphelia Labill. 67.
Succisa Vaill. 58.
Sutherlandia R. Br. 278.
Swartzia W. 202-205.
Swertia 115.
Symphyonema R. Br. 46.
Symphytum 55.
Syndesmis Wallich. 51. 92.
Syrrhopodon Schwägr. 521.

## T.

Tabernaemontana 65.
Talasium * 22. 50.
*Talauma* Hilar. et Blum. 216 217.
Tamonea Aubl. 251.
*Tamus* Herit. 145.
*Tanacetum* L. 500.
*Taverniera* Cand. 290.
Tephrosia Pers. 274-275.
*Ternströmia* Don. 206. 219.
*Testudinaria* Burch. 145.
Tetracera 213.
Tetragonia 196.
Tetranthera Jacqu. 156.
Tetratheca Sm. 147.
Teucrium 226.
*Teucrium* Poir. et Sieb. 19. 226
Thalictrum 221.
Thapsia 122.
Thelephora Ehrh. 554.
Thenardia Kunth. 65.
*Theodora* Medic. 254.
*Theophrasta* Hortul. et Spr. 94 540.
Thermia Nutt. 171.
*Thermopsis* Don. et Cand. 171.
Thesium 108-109.
Thespesia Corr. 257.
Thlaspi 240.
Thouinia Poit. 150.
Thrincia Roth. 505.
Thuia 515.
Thunbergia 257.
Thymus 224-225.
Thysselium Riv. 119.
Tiarella 178.
*Tigridia* Herb. 24.
*Tillaea* Sieb. 48.
Tillandsia 151.
Tofieldia Hudf. 142.

Tordylium 541.
Torenia 254.
Torilis Gärtn. 119.
Tournefortia 66.
Trachymene Rudg. 116-117.
Tradescantia 158.
Tragopogon 504.
*Tremalodon* * 522.
Tribrachia Lindl. 506. 509.
Tribulus 545.
Trichilia 247. 252.
*Trichilia* Blum. 252.
Trichospermum Blum. 202. 210.
*Trichosporum* Don. 258.
Trichostomum Hedw. 522-525.
Tricratus Herit. 55.
Trifolium 271-272.
Triglochin 142.
Triosteum 82.
Triphasia Lour. 141.
*Triraphis* R. Br. 54.
Tristicha Thuar. 4. 10.
Triticum 557.
Triu tta 190.
Trixi . Br. 500.
Troll 220.
*Tron dorffia* Mart. 105. 104.
*Tulip* . 142.
Turn a 124.
Turr la Pers. 295.
Typh 515.

## U.

Udora Nutt. 25.
*Uncaria* Roxb. et al. 80. 81.
Uncinia Pers. 515.
*Uniola* Torr. 56.
Unona 215-216.
*Urceolaria* Feuill. 556.
Urena 257-258.
Urochloa P. B. 55.
Uropetalum Ker. 155.
*Urophyllum* Wallich. 85.
Urtica 515.
Utricularia (l. Urceol.) 16. 254. 556.
Uvaria 216.
Uvularia 156.

## V.

Vaccinium 147.
*Vaccinium* * 160.
Valeriana 22-25.
*Valeriana* Brot. 25.
*Valerianella* Loisl. 25.
Vallaris R. Br. 65.
Vanda R. Br. 506.
Vandellia P. Br. 254.
Vangueria Juss. 85.
*Vareca* Roxb. 95-94.
*Varennea* Cand. 268.
*Vascoa* Cand. 274.
Vaucheria Cand. 552.
Vellosia Vand. 296.
*Vellosia* Mart. 137.
*Venana* Lam. 94.
Verbascum 65.
Verbena 250.
Verbesina 503.
Vernonia Schreb. 298.
*Vernonia* * 299.
Veronica 17.
*Viborquia* Ort. 268.
Viburnum 122.
Vicia 284.
*Vigna* Sav. 280.
*Vilfa* Trin. 557.
*Vilmorinia* Cand. 282.
Vinca 65.
Viola 96-97.
*Viola* W. 76.
Virgilia Lam. 171.
Viscum 47.
Visenia Houtt. 248.
Vitis 89-90.
Vitmannia Vahl. 145.
*Viviania* Radd. 326.
*Vochysia* Mart. 9.
Vrolikia * 222.

## W.

*Wahlenbergia* Don. 78.
Wallenia Sw. 41.
Waltheria 248-249.
*Warneria* Mill. 220.
Webera Schreb. 85.
Weinmannia 152-155.
Weisia Hedw. 521. 522.
Westringia Sm. 226.
*Wikströmia* Schrad. 260.
Willichia Mut. 26.
Willughbeia Scop. 71.
*Wittelsbachia* Mart. 206.
Wormia Rottb. 202. 215.
Wrightia R. Br. 65.
Wulfenia Sm. 16.
Wurmbea Thunb. 145.

## X.

Xanthium 514.
Xanthosia Rudg. 114.

Xanthoxylon 125.
Xerophyta Juff. 157.
Xylocarpus Schreb. 147.
*Xyloma* Perf. 352.
Xylopia 215.

Y.

Yucca 152.

Z.

*Zapania* Mart. 231.
*Zeyheria* Mart. 257.
*Zephyranthes* Sims. et Lindl. 151 155.
Zigadenus Mx. 142.
Zingiber Gärtn. 7.
Zizyphus Tournef. 86-87.
*Zizyphus* Wallich. 86.
Zonaria Ag. 351.
Zornia Mx. 289.
Zuccarinia * 50. 81.
Zwingera Schreb. 165.
Zygnema Ag. 351.
Zygophyllum 164.

# APPENDIX.

## HENRICI SCHOTT
## FASCICULUS PLANTARUM BRASILIENSIUM.

Henricus Schott, hortulanus Vindobonensis, e Brasilia, quam 1817 et 1818 invisit, ingentem plantarum copiam reportavit. Earum fasciculum, ut curis posterioribus insererem, additis characteribus ad me missum cum sero acceperim, nolui tamen deesse juveni et doctrina et rei herbariae scientia instructo, quando praesertim cognovi ex ipsis exemplaribus, nova plura adesse, quae alios fugisse scrutatores viderentur. Itaque summa omnia feci, ut et hae symbolae, sueto ordine digestae, quamprimum in lucem prodirent.

### CL. I.

1. *Brosimum microcarpon* Schott. nullo modo a Br. *Alicastro* Sw. diversum reor. Namque differentia ipsa a Schottio indicata „ramulorum petiolorumque hirtorum," ut exemplaria missa docuerunt, in cultis evanescit. Notandum tamen, hanc speciem, Jamaicae alioquin peculiarem, et Brasiliae incolam esse.
2. *Brosimum discolor* Schott. Br. foliis ovato-ellipticis acutis supra nitidis subtus glaucis, ramulis pubescentibus, fructibus succuleatis. Egregia et optime distincta species.

### CL. IV.

3. *Rhopala multiflora* Schott. Rh. foliis lanceolatis utrinque attenuatis reticulato-venosis, racemis terminalibus compositis calycibusque flavido-tomentosis, staminibus basilaribus. Rh. polystachyae Humb. affinis (vol. 1. p. 482.) sed omnino diversa.

### CL. V.

4. *Cordia frondosa* Schott. C. foliis ovatis acuminatis integerrimis supra punctato-stellatis subtus albido-tomentosis, floribus paniculato-corymbosis, calycibus truncatis sulcatis tomentosis. Finitima C. rotundifoliae R. et P. (vol. 1. p. 649.)
5. *Solanum violaefolium* Schott. S. caule herbaceo radicante, foliis geminis inaequalibus utrinque hirsutis, altero cordato subrotundo, altero reniformi, pedunculis solitariis axillaribus, calycibus 10fidis. Pertinet ad seriem vol. 1. p. 686. pone S. sylvaticum Dun.

## 6. Alseïs Schott.

(*Ἀλσηΐδες*, nymphae lucorum, Apollon. Rhod.)

Cal. ſuperus 5partitus. Cor. cyathiformis, limbo 5lobo, fauce barbata. Stamina ad baſin usque corollae libera exſerta. Stigma 2partitum. Germen 2loculare multi-ovulatum.

[Genus Macrocnemo proximum: id vero et calyce obſolete dentato et corolla infundibuliformi et ſtaminum inſertione ad faucem differt. Machaonia Humb., quam ſedulo comparavi, habitu ſimilis, differt eadem ſtaminum inſertione, praecipue vero fructu 2ſpermo.]

A. *floribunda* Schott. Arbor mediocris, foliis oblongis acuminatis utrinque piloſiuſculis, ſpicis ramoſis terminalibus, floribus parvis ochroleucis.

7. *Pſychotriam ſtenophyllam* Schott. a Pſ. *noxia* Hilar. cur. poſt. p. 78. diſtinguere nequeo. Adeſt etiam jam Pſ. ſtenophylla * vol. 1. p. 744.

8. 9. *Hirtellas* duas, *tomentellam* et *anguſtifoliam* Schott. jam ſupra p. 341. recenſui.

10. *Hirtella indecora* Schott. eſt H. *paniculata* Lam. vol. 1. p. 766.

11. *Büttneria laevigata* Schott. eſt B. *Gayana* Hilar. cur. poſt. p. 93.

## 12. Dimorphandra Schott.

Cal. urceolatus 5fidus. Petala 5 patentiſſima ſtaminifera. Stamina abortientia totidem petaloidea ſpathulata, unguiculis linearibus. Lomentum lignoſum polyſpermum latice balſameo farctum.

[Genus ad Proſopin quadammodo accedens, ſed ſtaminibus abortientibus ſatis diverſum. Locum habet vol. 1. p. 794. poſt Humboldtiam.]

D. *exaltata* Schott. Arbor procera, foliis 2pinnatis, foliolis oblongis ſupra nitidis ſubtus hirſutis, ſpicis paniculatis terminalibus, floribus luteis.

13. *Hydrolea elatior* Schott. H. glabra, foliis lineari-lanceolatis, floribus lateralibus terminalibusque cymoſis. Proxima H. corymboſa differt foliis lanceolatis, calycibus hiſpidis. vol. 1. p. 865.

14. *Aſtronium concinnum* Schott. A. foliis pinnatis glabris, foliolis 3jugis oblique ovato-oblongis acuminatis integerrimis, paniculis ♀ nutantibus. In corolla ♀ ſtaminodia 5 erecta, antheris ſterilibus baſi 2partitis.

15. *Aſtronium fraxinifolium* Schott. A. foliis pinnatis hirſutiuſculis, foliolis 6-8jugis lanceolatis acuminatis ſerratis, paniculis ♀ erectis. In corolla ♂ nectarium 10lobum, in ♀ ſtaminodia 5 erecta, antheris ſterilibus minutis.

### CL. VI.

## 16. Myrrhinium Schott.

Cal. ſuperne 4fidus. Cor. 4petala. Filamenta ſubulata, in aeſtivatione verſus petalum 2plicata. Antherae oblongae. Bacca calyce coronata 3-4locularis, loculis polyſpermis.

[Myrteis accenſet cl. auctor: mihi ſatis finita et ab omnibus tom. 2. p. 11. enumeratis diverſa videtur.]

M. *atropurpureum* Schott. Frutex orgyalis, foliis oppoſitis ellipticis coriaceis glabris punctatis ſubtus ferrugineis, floribus cymoſis 2bracteatis atropurpureis. Stamina longiſſima. Semina ſubreniformia. Embryo inſigniter curvatus.

## CL. VII.

17. *Petrocaryam braſilienſem* Schott. a P. montana W. (Parinari Aubl.) diſtinguere nequeo. Stamina enim minus exſerta haud tanti videntur, ut, cum alia omnia congruant, ſpecies nova iis ſtabiliatur.

## CL. VIII.

18. *Seriana ſtans* Schott. S. erecta, foliis impari-pinnatis glabris ſupra nitidis, foliolis oblique lanceolatis inaequaliter ſerratis, paniculae terminalis ramis flavido-tomentoſis, alis ſamararum apice confluentibus.

19. *Coccoloba peltata* Schott. C. ſcandens, foliis coriaceis peltatis ſubrotundo-ovatis acutis laevibus, racemis florum erectis.

20. *Coccoloba parvifolia* Schott. C. foliis coriaceis obovato-ellipticis utrinque attenuatis glabris, racemis florum ſpicatis erectis.

21. *Haloragis tetrandra* Schott. H. herbacea ſimplex, foliis ſpathulato-linearibus ſubintegerrimis, floribus aggregatis ſubſeſſilibus minutiſſimis tetrandris.

## CL. IX.

22. *Perſea floribunda* Schott. eſt P. *Boſo* * vol. 2. p. 269.

23. *Perſea anguſtifolia* Schott. videtur P. *pſychotrioides* * ib.

24. *Perſea incana* Schott. P. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis incano-tomentoſis, venis prominentibus, paniculis folio brevioribus, calycibus tomentoſis.

25. *Perſea puberula* Schott. P. foliis lanceolatis acuminatis ſupra nitidis ſubtus pubeſcentibus, venis prominentibus, paniculis folia ſubaequantibus, calycibus tomentoſis. P. *lineata* * vol. 2. p. 270. proxima.

26. *Perſea lancifolia* Schott. P. foliis lanceolatis utrinque attenuatis glaberrimis nitidis ſubtus glaucis, venis immerſis, racemis axillaribus folio brevioribus, calycibus pubeſcentibus.

27. *Perſea indecora* Schott. P. foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabris nitidis, venis prominentibus, racemis axillaribus terminalibusque folio brevioribus, calycibus glabris.

28. † *Cryptocarya hirſuta* Schott. Cr. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſubtus ramulisque hirſutis, paniculis axillaribus terminalibusque.

## CL. X.

29. *Styrax macrophyllus* Schott. eſt St. *tomentoſus* Humb.

30. *Styrax glabratus* Schott. St. foliis ovato-lanceolatis utrinque attenuatis glabris, venis coloratis, pedunculis subracemosis calycibusque albido-tomentosis.

## 31. Acosmium Schott.

Cal. campanulatus 4-5fidus. Petala 5 patentissima. Stamina imo calyci inserta. Germen elongatum forte in legumen abit.

[Est *Sweetia* * vol. 2. p. 171., quam e manco exemplari rite enucleare nequivi. Nomen meum, ut prius, retinendum esse videtur.]

*lentiscifolium* Schott. (Sweetia fruticosa * melius *lentiscifolia* *.) Arbor alta foliis impari-pinnatis, foliolis elliptico-lanceolatis venulosis utrinque nitidis, ramis racemiferis aphyllis, floribus flavis.

## 32. Exostyles Schott.

Cal. clavatus, laciniis 3 tandem revolutis. Petala 5 subaequalia imbricato-conniventia calyci medio inserta. Stamina subaequalia, filamentis basi dilatatis, antheris sagittatis cuspidatis. Stylus elongatus simplex. Legumen crassum polyspermum.

*venusta* Schott. Arbor ramis villosis, foliis impari-pinnatis, foliolis ovatis utrinque pilosiusculis, pedunculis subracemosis bracteatis, floribus roseis.

## 33. †Caulotretus Rich. ?Schnellia Radd.

Cal. subcampanulatus 5dentatus. Pet. 5 calycis fundo inserta unguiculata subaequalia. Stam. 10, alterna minora. Legumen membranaceum medio sub-1spermum, non dehiscens.

*smilacinus* Schott. Frutex scandens, ramis cirriferis, foliis indivisis ovatis acuminatis 5nerviis glabris, racemis spicatis elongatis.

## 34. Melanoxylon Schott.

Calycis sepala 5 basi concreta. Pet. 5 subaequalia. Stamina hirsuta, antheris longitudinaliter dehiscentibus. Legumen compressum falcatum. Semina arillo in alam producto transverse leguminum cavitates implente.

*Brauna* Schott. Arbor altissima ligno fusco-atro, foliis imparipinnatis subtus hirsutis, foliolis oblongo-lanceolatis, racemis paniculatis ferrugineo-tomentosis.

35. *Combretum gracile* Schott. C. foliis oppositis oblongis utrinque attenuatis integerrimis glaberrimis nitidis, racemis laxis compositis pendulis, staminibus calycem urceolatum subaequantibus, petalis spathulato-linearibus.

## CL. XII.

36. *Prunus brasiliensis* Schott. est Pr. *sphaerocarpa* Sw.

37. †*Chrysobalanus ovalifolius* Schott. Chr. foliis coriaceis subcordato-ellipticis obtuse apiculatis subtus argenteo-

tomentoſis, floribus hermaphroditis, ſtaminibus glabris.

38. † *Chryſobalanus macrophyllus* Schott. Chr. foliis cordato-oblongis obtuſis elongatis coriaceis *ſupra nitidis ſubtus* albo-tomentoſis, venis parallelis prominentibus, floribus hermaphroditis.

In utraque ſpecie praeter ſtamina fertilia ſeptena adſunt ſterilia minuta.

39. *Mollinediae braſilienſis* nomine miſit Schottius *Citroſmam*, quam *Schottianam* nuncupo, foliis ovato-oblongis verſus apicem ſerratis ſubtus hirſutis, pedunculis elongatis, fructibus tomentoſis. Mollinediam R. et P. haud ſatis notam, ad Citroſmam pertinere reor.

CL. XIII.

40. *Swartzia micropetala* Schott. eſt Sw. myrtifolia Sm. cur. poſt. p. 202.

41. *Swartzia elegans* Schott. Sw. foliis pinnatis 3jugis, petiolo marginato, foliolis ovato-lanceolatis acutis ſubretuſis nitidis, racemis axillaribus paucifloris, petalo cordato-ſubrotundo unguiculato inſigni.

## 42. Ascra Schott.

[*Ἄσκρα, δρῦς ἄκαρπος* Heſych.]

Cal. inferus 3ſepalus. Cor. 3petala. Filamenta capillaria. Stylus brevis perſiſtens. Germen 1loculare, placentis tribus parietalibus, ovulis plurimis. *Guttiferis* accenſenda.

*braſilienſis* Schott. Arbor mediocris, foliis alternis ovatis utrinque attenuatis obſolete dentatis 5plinerviis glabris, paniculis thyrſoideis pubeſcentibus, floribus flavidis.

## 43. †Othlis Schott.

[*Ὄθλεις Geopon. 2, 4. forte corrupte.*]

Cal. 5ſepalus 2bracteatus perſiſtens, ſepalis bracteisque imbricatis concavis. Pet. 5 decidua. Antherae elongatae lineares continuae, loculis lateralibus tenuiſſimis. Capſ. ſub-1ſperma. Sem. arillatum. *Dillenieis* forte adnumeranda.

O. *caſtaneaefolia* Schott. Frutex ſarmentoſus, foliis alternis ſurſum confertis oblongis ſerratis glabriuſculis, floribus lateralibus ſeſſilibus.

[Delima guianenſis Rich. vol. 2. p. 597. eſt proxima.]

44. *Begonia hiſpida* Schott. B. ſuffruticoſa hiſpida, foliis ſemicordatis hinc acuminatis inaequaliter denticulatis, panicula multiflora, fructuum ala tertia maxima rotundata.

45. *Begonia vitifolia* Schott. *B. ſuffruticoſa hiſpida, foliis inaequaliter* reniformibus angulato-lobatis ſerratis, floribus hirſutis.

[Magnopere dubia, quando B. reniformis Dryandr. nimis eſt propinqua.]

46. *Begonia platanifolia* Schott. B. ſuffruticoſa, foliis inaequaliter reniformibus multifidis ſerrulatis hiſpidiuſculis ſubtus purpuraſcentibus, laciniis acutis ſerrulatis.

47. *Begonia lobata* Schott. B. suffruticosa incano-tomentosa, foliis inaequaliter reniformibus obtuse lobatis denticulatis, fructuum ala tertia maxima lineari-elliptica horizontali.

48. *Begonia tomentosa* Schott. B. suffruticosa, foliis inaequaliter reniformibus subtus ferrugineo-tomentosis denticulatis, fructuum alis binis obtusis, tertia maxima acuta.

49. *Begonia parvifolia* Schott. B. fruticosa glabra, foliis semicordatis ovato-lanceolatis acuminatis undulato-denticulatis glaucescentibus, fructuum ala tertia elliptica maxima.

50. *Begonia undulata* Schott. B. fruticosa glaberrima, foliis subsemicordato-lanceolatis acuminatis repando-undulatis, fructuum alis subaequalibus rotundatis.

[B. pulchella Radd. proxima, sed folia dentato-serrata.]

51. *Begonia besleriaefolia* Schott. B. fruticosa scandens ramosissima, foliis subsemicordato-oblongis acuminatis integerrimis supra glabris subtus hirsutis, fructuum alis binis obsoletis, tertia maxima rotundata.

52. *Begonia populifolia* Schott. est B. *scandens* Sw. Adest jam B. populifolia Kunth. cur. post. p. 212. aliena.

53. *Begonia depauperata* Schott. B. acaulis subbifolia, foliis subcordato-oblongis acuminatis inaequaliter serratis glabris supra albo-maculatis subtus purpurascentibus, floribus ♂ subternis 2petalis, filamentis in columnulam elongatam concretis.

54. *Begonia concinna* Schott. B. acaulis, foliis peltatis oblique ellipticis acuminatis integerrimis utrinque pilosis, florum ♂ petalis exterioribus orbiculatis, fructuum alis binis subparallelis rotundatis, tertia maxima obtusa.

55. *Begonia peltifolia* Schott. B. acaulis, foliis peltatis oblique ovatis acutis integerrimis supra glabris subtus ferrugineo-tomentosis, fructuum alis binis rotundatis, tertia maxima obtusa.

## 56. DASYNEMA Schott.

Cal. 4-6-8sepalus. Cor. 0. Stamina hirsuta receptaculo hispido inserta. Antherae longitudinaliter dehiscentes. Styli 3, 4. Caps. setosa 4valvis 1sperma. Semen arillatum.

[*Dillenieis* omnino accensenda. Ab Ablania et Tetracera differt et antherarum fabrica et stylis et fructu.]

D. *hirsutum* Schott. D. foliis breviter petiolatis obovato-lanceolatis acuminatis subtus villosis, calycibus 4sepalis, antheris muticis.

57. D. *pubescens* Schott. D. foliis longe petiolatis oblongis acutiusculis subtus pubescentibus, calycibus 6-8sepalis, antheris apice appendiculatis.

58. *Laplacea inaequilatera* Schott. L. foliis inaequilateris spathulato-lanceolatis hinc serratis illinc integerrimis, floribus 6petalis. Est Haemocharis semiserrata Mart. Gordonia cur. post. p. 260.

## CL. XIV.

9. *Ruellia pulchella* Schott. eſt R. foetida Humb.
0. *Ruellia ſpecioſa* Schott. R. ſuffruticoſa, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis utrinque hiſpidiuſculis, ſpicis axillaribus laxis, bracteis foliaceis maximis, *ſepalis* linearibus longiſſimis.
1. *Chaſmiae ochroleucae* nomine miſit *Bignoniam*, quam *candicantem* Richardi habeo, etiamſi haec haud idoneo modo definita ſit. Folia enim inferiora ſunt ternata, ſuperiora binata, foliola ovata ſeu ſubrotundo-elliptica obtuſa ſubtus tomentoſa, flores paniculati minuti.

## CL. XVI.

2. *Myriſtica Bicuhyba* Schott. M. foliis alternis diſtichis lineari-lanceolatis ſubtus glaucis, floribus glomerato-racemoſis pedicellatis 3andris.

## CL. XVII.

3. *Trigonia parviflora* Schott. Tr. foliis ellipticis utrinque integerrimis ſubtus floccoſis demum glabratis, paniculis racemoſis axillaribus.

## CL. XIX.

4. *Carpholobum ſeſſiliflorum* Schott. dicit *Conyzam lucidam* * vol. 1. p. 509. Eſſe receptaculum paleoſum, quod ſecus mihi in conſpectum venit. Squamae enim anthodii aliquot interiores videntur quidem receptaculum obſidere, ſed ſupereſt ſpatiolum centrale nudum. Si receptaculum vere eſſet paleaceum, Caſſiniae R. Br. ſpeciem dixeris, cui vero repugnaret habitus et patria. Accedit, quod altera ſpecies
56. *Carpholobus umbellulatus* Schott. ne veſtigium quidem palearum in receptaculo oſtendat. Eſt nimirum *Eupatorium umbellulatum* *, collocandum vol. 3. p. 412. poſt E. discolor *, et ſic definiendum: E. foliis alternis oblongis acutis integerrimis ſupra nitidis ſubtus incano-tomentoſis, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris, ſquamis anthodii appreſſis fuſcis.

## CL. XXI.

66. *Ficus longifolia* Schott. F. foliis utrinque glabris oblongo-linearibus acuminatis coriaceis nitidis breviſſime petiolatis. Collocanda vol. 3. p. 781. poſt F. americanam Aubl.
67. *Ficus adhatodaefolia* Schott. F. foliis utrinque glabris ovato-lanceolatis acuminatis ſub-3nerviis, receptaculis pedunculatis ſolitariis. Quanquam F. nervoſa Roth. vol. 3. p. 781. nimis ſit propinqua, haud arbitror tamen eamdem eſſe.
68. *Ficus cluſiaefolia* Schott. F. foliis utrinque glabris coriaceis obovatis obtuſiſſimis, venis parallelis ſubimmerſis. F. griſea Vahl. l. c. nimis affinis.
39. *Ficus ceſtrifolia* Schott. F. foliis utrinque glabris ſubcordato-lanceolatis acuminatis opacis ſub-3nerviis.

70. *Ficus eximia* Schott. F. foliis utrinque glabris amplis cordato-oblongis acutis submembranaceis glaucescentibus. Collocanda vol. 3. p. 778. post pedunculatam Ait.

71. *Ficus pulchella* Schott. F. foliis subtus scabris lanceolatis acuminatis submembranaceis, venis parallelis approximatis, receptaculis pedunculatis majusculis. Affinis F. Radula W. p. 782., quae vero foliis coriaceis differt.

72. *Ficus hirsuta* Schott. F. foliis utrinque hirsutis oblongis obtusiusculis triplinerviis. Affinis F. clethraefolia W. p. 782.

73. *Ficus holosericea* Schott. F. foliis late cordatis oblongis acutiusculis subundulatis utrinque villosis, ramulis petiolisque fulvo-hirsutis.

74. *Ficus rufa* Schott. F. foliis subcordato-oblongis acutis supra nitidis subtus fulvo-pubescentibus, petiolis fulvo-hirsutis. Utraque affinis F. fulvae * p. 779., sed haec folia habet obtusa, pubem subtus densam tomentoso-hirsutam.

CL. XXII.

75. † PERIDIUM Schott.

Flores dioeci. Cal. 2sepalus. Petalum 1 vesicaeforme hinc rimula hians. Nectaria 0. Stamina circiter 12 polyadelpha, antheris basi fixis 4gonis. ♀ ignot. [Genus propter flores ♀ et fructus ignotos dubium, *Perae*, quam Mutisius (Stockholm. acad. handl. 1784. p. 299.) descripsit, satis affine, nectariorum vero, seu membranularum multifidarum stamina stipantium defectu differens. Tricoccis accensendum omnino videtur.]

P. *obtusifolium* Schott. P. foliis obovato-oblongis obtusis integerrimus supra glabris subtus sparse, floribus aggregatis pedunculatis extus conferte aureo-lepidotis. Gemmae florum plurimae abortiunt, una aut altera perficitur.

76. *Peridium ferrugineum* Schott. P. foliis oblongis utrinque attenuatis supra laevibus nitidis subtus sparse, ramis laxis pedunculisque subsolitariis conferte ferrugineo-lepidotis.

77. *Peridium glabratum* Schott. P. foliis obovato-oblongis obtusiusculis utrinque glabris subtus subrufescentibus, pedunculis subsolitariis calycibusque dense lepidotis.

HALIS, typis expressum Gebauerianis.